

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

MIKONAL

Ovula – 100 mg
(Mikonazol nitrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

1. Çfarë është Mikonal dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Mikonal
3. Si ta përdorni Mikonal
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Mikonal
6. Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË MIKONAL DHE PËRSE PËRDORET

Mikonal përmban si lëndë aktive mikonazol nitrat, i cili është një antimykotik imidazolik me veti të ngjashme me ketokonazolin. Në kushte in vitro ai vepron kundër *Cladosporium*, *Madurella*, llojeve të *Phialophora*, *Pseudallescheria boydii* dhe baktereve gram – pozitive, përfshirë disa stafilokokë dhe streptokokë. Një numër i madh kërpudhash të ndjeshme ndaj mikonazolit mund të frenohen në përqëndrimin prej 2 mikrogramë ose edhe më të vogël për ml. Mikonazoli përthithet pak përmes lëkurës ose membranave mukozë kur ai përdoret lokalisht në trajtë kremi, tretësire ose ovulash vaginale. Mikonal përdoret në infeksionet mykotike vaginale ose vulvovaginale, të shkaktuara kryesisht nga *Candida*. Shenjat e këtij infeksioni përfshijnë kruarje, skuqje dhe sekrecione të bardha. Ovulat shkatërrojnë funget që shkaktojnë këto infeksione dhe disa baktere, të cilat janë gjithashtu prezente.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI MIKONAL

Mos përdorni Mikonal në qoftë se keni mbindjeshmëri të njohur ndaj mikonazolit nitrat ose ndaj antimykotikëve të tjerë derivate të imidazolit, si dhe ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të ovulës. Mikonal nuk duhet të përdoret nga fëmijët.

Tregoni kujdes të veçantë me Mikonal

Ovulat Mikonal nuk duhet t'i përdorni për vetëmjekim në qoftë se keni simptoma të tilla si: dhimbje barku, temperaturë të lartë ose sekrecione vaginale me erë të keqe sepse mund të bëhet fjalë për një gjendje më serioze se një kandidozë vulvovaginale.

Duhet të këshilloheni me mjekun ose me farmacistin tuaj përpara se ta përdorni këtë bar në qoftë se jeni duke përdorur një metodë kontrceptive si “diafragma”, prezervativ ose spermicidë sepse ovulat vaginale mund të dëmtojnë gomën dhe të ndalojnë veprimin e këtij kontracepsioni. Duhet të flisni me mjekun tuaj rreth përdorimit të një tipi tjetër kontracepsioni ndërsa ju jeni duke përdorur këtë bar. Gjatë trajtimit të zonave genitale, preferohet që edhe partneri seksual të bëjë një cikël trajtimi topik për arsye parandalimi. Duhet të jeni të sigurt që të mos infektoni të tjerët; mos i lejoni të tjerët të përdorin peshqirin tuaj. Mikonal mund të shkaktojë një ndjesi djegieje dhe iritimi. Rastet e shfaqjes së iritimit mund të tregojnë një reaksion mbindjeshmërie dhe trajtimi me barin duhet ndërprerë. Përdorimi për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbivendosjen e mikroorganizmave të tjerë jo të ndjeshëm ndaj barit. Me shfaqjen e mbiinfeksioneve Mikonal duhet ndërprerë dhe mund të fillohet një trajtim tjetër i përshtatshëm.

Marrja e barnave të tjera

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Mikonal. Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Mikonal në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit. Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u trajtuar me barna holluese të gjakut (antikoagulantë) të tillë si varfarina ose acenokumaroli. Mikonal, edhe kur përdoret lokalisht, mund të fuqizojë veprimin e tyre. Gjithashtu, duhet treguar kujdes edhe kur mikonazoli merret njëkohësisht me hipoglicemiantë oralë, fenitoinë ose simvastatinë.

Shtatzënia dhe ushqyerja me gj

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të përdorni këtë bar në periudhën e shtatzënisë ose gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijës me gj. Në periudhën e shtatzënisë dhe të ushqyerjes së fëmijës me gj, ovulat vaginale mund të përdoren vetëm në rastet e domosdoshme dhe nën kontrollin e drejtpërdrejtë të mjekut.

3. SI TA PËRDORNI MIKONAL

Gjithmonë përdorni këtë bar ekzakhtësisht si ju ka thënë mjeku juaj. Ju duhet të këshilloheni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni të sigurt.

Nuk duhet të përdoren nga fëmijët.

- Ovulat futen në thellësi të vaginës, më mirë në pozicionin shtrirë në shpinë.
- Përdorni një ovulë çdo darkë për 7 ose 14 ditë ose një ovulë dy herë në ditë për 7 ditë, në qoftë se ju rekomandon mjeku juaj.
 - Simptomat tuaja mund të zhduken shpejt por ju duhet të vazhdoni përdorimin e ovulave për aq kohë sa ju ka rekomanduar mjeku. Në qoftë se e ndaloni trajtimin para se të mbarojë terapia e rekomanduar, simptomat mund të kthehen përsëri.
 - Përdorni ovulat përpara se të shtrihen për të fjetur.

Kjo ju ndihmon se qëndroni në një vend.

- Mos i gëlltisni ovulat.
- Në rast recidivash duhet bërë mbjellje kulture dhe të konfirmohet diagnoza që të rifillohet edhe një herë mjekimi.

Në qoftë se keni përdorur më shumë Mikonal

Në qoftë se keni përdorur më shumë ose keni gëlltitur gabimisht ovula Mikonal, ose në qoftë se fëmijët e kanë gëlltitur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni me mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren. Megjithatë, edhe në raste mbidozimi, tek njerëzit nuk është raportuar asnjë e dhënë e padëshiruar. Marrja e një doze më të madhe se ajo e rekomanduar nga mjeku është normalisht e padëmshme. Megjithatë ju duhet të kontaktoni me mjekun tuaj. Nga gëlltija mund të shfaqen: të përziera, të vjella, diarre, të cilat kërkojnë trajtim simptomatik.

Në qoftë se harroni të përdorni Mikonal

Në qoftë se harroni një dozë, përdorni dozën në vazhdim kur të jetë koha për përdorimin e zakonshëm të saj. Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Mikonal mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Ndonjëherë ato janë serioze, ndonjëherë jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Në fillim të mjekimit mund të shfaqet një ndjesi djegieje, kruarje dhe iritimi vaginal, si dhe krampe pelvike, ekzantema dhe dhimbje koke. Në këto raste është e nevojshme që mjekimi të ndërpritet dhe të fillohet një mjekim tjetër i përshtatshëm. Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI MIKONAL

Mbajeni larg fëmijëve. Mos e përdorni Mikonal pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim. Mos e ruani mbi 25°C. Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmbajnë ovulat Mikonal

Lënda aktive është mikonazol nitrat.
1 ovulë vaginale përmban 100 mg mikonazol nitrat.
Lëndët ndihmëse janë: yndyrma të ngurta.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 10 ovula.

Mbajtësi i Autorizimit për Tregtim dhe Prodhuesi:



PROFARMA sh.a.
Rruga “Skënder Vila”,
Tiranë, Shqipëri.
Tel.: +355 4 23 89 602

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Dhjetor 2023.

