

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për përdoruesin

ALUKOL

Tableta - 500 mg
(Hidroksid alumini)

Lexojeni me kujdes këtë fletudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përqekësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor, që nuk përmendet në këtë fletudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletudhëzues:

- 1.Çfarë është Alukol dhe përse përdoret
- 2.Përpara se të merrni Alukol
- 3.Si ta merrni Alukol
- 4.Efekte anësore të mundshme
- 5.Si ta ruani Alukol
- 6.Informacion i mëtejshëm.

1.ÇFARË ËSHTË ALUKOL DHE PËRSE PËRDORET

Alukol përmban lëndën aktive hidroksid alumini, i cili është një antiacid, që ul hiperaciditetin e lëngut gastrik dhe kështu mënjanon shtrëngimet në stomak të shkaktuara nga hiperaciditeti. Veprimi antiacid fillon shpejt dhe zakonisht zgjat rreth 2 orë. Përveç asnjansësimit të shpejtë e afatgjatë, Alukol frenon edhe veprimin e pepsinës (proteazës), mënjanon veprimin e dëmshëm të acidit të stomakut, i cili vepron si faktor agresiv i barrierës mbrojtëse të mukozës.

Indikohet në:

- mjekimin e hiperaciditetit, ulcerës së stomakut dhe duodenit, ulcerës së shkaktuar nga antiinflamatorët josteroidë, refluks ezofageal, sindromën Zollinger-Ellison, gastrit kronik dhe akut me hiperaciditet, irritim të mukozës së stomakut i shkaktuar nga konsumi i alkoolit, kafesë dhe duhanit.
- Redukton nivelin e lartë të fosfateve në gjak që është e rëndësishme në pacientët me sëmundje veshkash të cilët nuk eliminonjë dot nga organizmi sasinë e fosfatit të hekurit që marrin me dietën.

2.PËRPARA SE TË MERRNI ALUKOL

Mos merrni Alukol në qoftë se:

- jeni alergjik ndaj hidroksidit të aluminit;
- jeni alergjik ndaj ndonjërit prej lëndëve ndihmëse të përmendura në fund të këtij fletudhëzuesi;
- vuani nga porfiria;
- keni nivel të ulët të fosfateve në gjak;
- keni pamjaftueshmëri të rëndë të funksionit të veshkave;
- pacienti është nën moshën 12 vjeç.

Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i merrni tabletat. Shkoni

dhe flisni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna. Nëse shkoni të ndonjë mjek tjetër apo dentist, njoftojeni që jeni duke marrë Alukol.

Tregoni kujdes të veçantë me Alukol

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se:

- jeni alergjik ndaj barnave të tjera, veçanërisht në qoftë se janë në të njëjtën klasë barnash me Alukol;
- jeni duke marrë barna të tjera, në veçanti antibiotikë (si tetraciklina) sepse hidroksidi i aluminit redukton përthithjen e tyre në trupin e njeriut;
- keni në plan të ngeleni shtatzënë gjatë kohës që jeni duke përdorur Alukol.

Në të sëmuret me dietë me pak fosfate, dozat e larta dhe ndonjëherë dozat e zakonshme, mund të shkaktojnë largimin e fosfateve, gjë që shoqërohet me rritjen e përthithjes dhe të jashtëqitjes urinare të kalciumit, çka përbën rrezik për osteomalaci.

Në të sëmuret me pamjaftueshmëri kronike të veshkave që marrin doza relativisht të larta të hidroksidit të aluminit, mund të shfaqet gjithashtu osteomalaci dhe demencë.

Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj, në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna të tjera, edhe ato pa recetë. Hidroksidi i aluminit mund ta ulë biodisponibilitetin e antikolinerjikëve, diazepamit, kinoloneve, diflunisalit, digoksinës, fenotiazinave, glukokortikoidëve, indometacinës, izoniazidit, kinidinës, propranololit, përgatesave të hekurit, tetraciklinës, vitaminave të tretshme në yndyrna dhe fosfateve, prandaj këto barna nuk duhen përdorur asnjëherë së bashku, por pas një intervali të paktën prej dy orësh. Antiacidët mund të ulin përthithjen e levotiroksinës. Mund të keni nevojë të përdorni sasi të ndryshme të këtij bari ose të merrni barna të tjera. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshillojë.

Marrja e Alukol me ushqim dhe pije

Alukol është një bar i cili rekomandohet të merret para ose gjatë ngrënies.

Shtatzënia

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të ngeleni shtatzënë. Si shumica e barnave të këtij lloji, Alukol nuk është mirë të përdoret gjatë shtatzënisë. Mjeku ose farmacisti do të diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së tij gjatë shtatzënisë.

Ushqyerja me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjen me qumësht gjiri. Hidroksidi i aluminit kalon në qumështin e gjirit. Mjeku ose farmacisti do të diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së tij, në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjen me gji apo keni në plan ta bëni këtë.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Tregohuni të kujdesshëm gjatë drejtimit të automjetit ose përdorimit të makinerive derisa të shihni se si Alukol ndikon tek ju edhe pse s'ka të dhëna që Alukol të pengojë aftësitë drejtuese të automjetit.

Informacion i rëndësishëm për disa nga lëndët ndihmëse të Alukol

Ky bar përmban laktozë. Në qoftë se keni intolerancë ndaj disa sheqernave, kontaktoni me mjekun tuaj përpara se të merrni këtë bar.

3.SI TA MERRNI ALUKOL

Ju lutemi të ndiqni këshillat e mjekut për mënyrën e marrjes dhe dozimin e Alukol.

Tabletat të merren me ushqim me një gotë ujë. 0.5 – 1 g (1 – 2 tableta), 4 herë në ditë (para ose gjatë ngrënies, si edhe para gjumit). Megjithatë, mjeku juaj mund t'ju këshillojë të merrni një dozë tjetër në varësi të gjendjes dhe reagimit tuaj ndaj barit.

Mjeku juaj mund t'ju kërkojë të merrni Alukol për një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj për këshillë, në qoftë se nuk jeni i sigurt për sa kohë duhet ta merrni.

Në qoftë se keni marrë më shumë Alukol:

Në qoftë se keni marrë më shumë Alukol se sasia që duhet të merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren.

Në qoftë se keni harruar të merrni Alukol:

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e zakonshme të saj. Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4.EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund të shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Njoftoni mjekun tuaj, në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore të mëposhtme ju shqetëson:

- nauze;
- të vjella;
- konstipacion.

Në qoftë se vëreni efekte anësore, që nuk janë të përmendura në këtë fletudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5.SI TA RUANI ALUKOL

Mbajeni larg fëmijëve. Mos e përdorni Alukol pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim. Mos e ruani mbi 25°C.

6.INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmbajnë tabletat Alukol 500 mg:

Lënda aktive është hidroksid alumini koloidal.

Një tabletë përmban 500 mg hidroksid alumini koloidal.

Lëndët ndihmëse janë: laktozë monohidrat, xhelatinë, vaj mente, glikolat natriumi i amidonit, stearat magnezit.

Përmbajtja e paketimit:

Kuti me 30 tableta.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:

PROFARMA sh.a.,

Rruga "Skënder Vila",
Tiranë, Shqipëri.
Tel.: +355 4 23 89 602

Ky fletudhëzues u rishikua për herë të fundit në Gusht 2023