

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

ERITROMICINE

Tableta - 250 mg
(Eritromicinë estolat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparsa se tē filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë ta lexoni përsër.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund tē kenë tē njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Cfarë është Eritromicine dhe përse përdoret
- Përparsa se tē merrni Eritromicine
- Si ta merrni Eritromicine
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Eritromicine
- Informacion i mëtejshëm.

1. ÇFARË ËSHTË ERITROMICINE DHE PËRSE PËRDORET

Eritromicina është një antibiotik që i përket një grupi barnash të quajtura makrolidë. Këta antibiotikë e kryejnë veprimin duke vrrarë ose duke ndaluar shtimin e baktereve që po shkaktojnë infeksion tek ju.

Eritromicina, ashtu si antibioticët e tjerë, nuk vepron ndaj infeksioneve virale siç është gripi.

Eritromicina përdoret për tē trajtuar infeksione në pjesë të ndryshme të trupit të shkaktuara nga baktere, për shembull:

- alternativë e penicilinës në rastet me mbindjeshmëri ndaj kësaj tē fundit;
- diferi dhe kollë e mirë;
- sëmundje e Legionnaire;
- bronkit akut (infeksion i bronkeve që shkakton kollë);
- pneumoni (infeksion i mushkërive i karakterizuar nga temperaturë, pafuqi, dhimbje koke);
- enterit nga kampilobakteri;
- uretrit jogonokoksik, prostatit kronik;
- sifiliz, akne vulgaris dhe rozace.

Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Eritromicina për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni tē dini pse ju është dhënë Eritromicina.

2. PËRPARA SE TË MERRNI ERITROMICINE

Mos merrni Eritromicine në qoftë se:

- jeni alergik ndaj eritromicinës ose ndaj ndonjë antibiotiku tjetër makrolid p.sh.: azitromicin, klaritromicin ose roksitromicin;
- jeni alergjik ndaj ndonjërit prej përbërësve joaktivë tē përmendor në fund tē këtij fletëudhëzuesi;
- jeni histori për sëmundje gastrointestinale;
- jeni probleme tē rënda me mëlçinë ose me tëmthin;

- jeni probleme me dëgjimin;
- jeni porfiria.

Eritromicina kundërendikohet në pacientët të cilët janë duke marrë astemizol, terfenadinë, cisaprid, pimozid, ergotaminë ose dihidroergotamini. Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i merrni tabletat. Shkonit dhe flisni fillimisht më mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna.

Tregoni kujdes tē veçantë me Eritromicine

- Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se:
- planifikoni një shtatzëni gjatë kohës që jeni duke përdorur Eritromicine;
 - jeni duke ushqyer foshnjën me gji ose po planifikoni tē ushqeni foshnjën me gji;
 - jeni osi keni patur ndonjë problem shëndetësor, në veçanti tē mëposhtmet:
 - funkcion tē dëmtuar hepatik dhe biliar sepse rrith rishku për hepatotoksicit (gjithashtu edhe në qoftë se përdorni barna hepatotoksike);
 - miastenia gravis;
 - aritmji ose predispozitë për zgjatje tē intervalit QT.

Marrja e barnave tē tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna tē tjera, edhe ato pa retetë. Informoni mjekun tuaj në qoftë se jeni duke marrë ndonjë prej këtyre barnave:

- teofiliinë, një bar i përdorur për trajtimin e astmës;
- disa barna për trajtimin e migrenës si ergotamina ose dihidroergotamina (kundërendikohen);
- karbamazepinë, një bar i përdorur për trajtimin e epilepsiës;
- terfenadinë dhe astemizol, barna tē përdorura për trajtimin e alergjive (kundërendikohen);
- varfarinë, një bar që përdoret për parandalimin e trombeve në gjak;
- digoksinë, një bar i përdorur për trajtimin e insuficiencës kardiakë;
- lovastatin, një bar që përdoret për uljen e kolesterolit;
- ciklosporinë, një bar i përdorur për parandalimin e mospranimit të transplantit ose për trajtimin e problemeve të caktuara të sistemit imun;
- cisaprid, një bar i përdorur për trajtimin e problemeve gastrointestinale (kundërendikohen);
- pimozid, një bar antipsikotik (kundërendikohen);
- ketapinë;
- simvastatin;
- vinblastinë;
- mozolastin.

Eritromicina mund tē ndërveprojë edhe me: alfentanil, bromokriptinë, buspiron, klozapinë, kolkicinë, disipiramid, midazolam, sildenafl, takrolimus, sirolimus, valproat, blllokues tē kanaleve tē kalciumit, zopiklon, cilostazol.

Këto barna mund tē ndikohen nga Eritromicina, ose mund tē ndikojnë në mënyrën se si vepron. Mund tē keni nevojë tē përdorni sasi tē ndryshme tē këtij bari ose tē merrni barna tē tjera. Mjeku ose farmacisti juaj do tju këshilloj.

Marrja e Eritromicine me ushqim dhe pije

Ushqimi nuk ndikon në përhithjen e eritromicinës estolat.

Shtatzënia

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzëni ose po planifikoni tē ngeleni shtatzëni. Si shumica e barnave tē këtij Illoji, Eritromicina nuk është mirë tē përdoret gjatë shtatzënisë. Mjeku ose farmacisti do tē diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së saj në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjën me gji apo keni në plan ta bëni këtë.

Ushqimi me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësht gjiri. Eritromicina kalon në qumështin e gjirit. Mjeku ose farmacisti do tē diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së saj në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjën me gji apo keni në plan tē bëni këtë.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Trehgjuni tē kujdesshëm gjatë drejtimit të automjetit ose përdorimit të makinerive derisa tē shihni se si Eritromicina ndikon tek ju. Eritromicina mund tē shkaktojë marramendje ose trulloje në disa pacientë, veçanërisht pas marrjes së dozës së parë.

3. SI TA MERRNI ERITROMICINE

Gjithmonë merrni tabletat Eritromicine vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se ndjeni që efektet e eritromicinës janë shumë tē fortë ose shumë tē dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Tabletat mund tē merren me ose pa ushqim. Këshillojmë që tabletat t'i merrni në tē njëjtën orë çdo ditë.

Doza e rekomanduar për tē rritur dhe fëmijë mbi 8 vjeç: 250 – 500 mg, çdo 6 orë ose 0.5 – 1 g, çdo 12 orë; në infeksionet e rënda mund tē përdoren deri në 4 g në ditë.

Doza e rekomanduar për fëmijët deri në 2 vjeç: 125 mg, çdo 6 orë; 2 – 8 vjeç: 250 mg, çdo 6 orë; në infeksionet e rënda doza dyfishohet.

Në sifilizin e hershëm përdoren 500 mg, 4 herë në ditë, për 14 ditë, kurse në klamidien gjenitale tē pandërikuar dhe në uretritin jogonokoksik jepen 500 mg, 2 herë në ditë, për 14 ditë.

Megjithatë, mjeku juaj mund t'ju këshillojë tē merrni një dozë tjetër në varësi tē gjendjes tuaj dhe reagimit ndaj barit.

Mjeku juaj mund t'ju kërkojë tē merrni Eritromicina për një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj për këshillë në qoftë se nuk jeni tē sigurt për sa kohë duhet ta merrni.

Tabletat Eritromicine duhet tē gjelltinë tē plota me një gotë ujë.

Në qoftë se keni marrë më shumë Eritromicine

Në qoftë se keni marrë më shumë Eritromicine se sasia që duhet tē merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose tē telefononi urgjencën për tē marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet tē ndërmerrin.

Në qoftë se keni harruar tē merrni Eritromicine

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha për marrjen e zakonshme tē saj.

Mos merrni një dozë tē dyfishtë për tē plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund tē shkaktojnë efekte anësore. Ndjonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund tē mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore tē mëposhtme ju shqetëson:

- nauze, tē vjella, diarre (graviteti i këtyre efekteve është i lidhur me dozën);
- marramendje ose trulloje;
- reaksione alergjie – ekzantema, urtikarie;
- humbie e prapësueshmë e dëgjimit pas përdorimit tē dozave tē larta dhe në tē sëmurët e moshuar ose me insuficiencë renale dhe hepatike;
- ikter kolesterolik në qoftë se përdoret më shumë se 14 ditë;
- efekte në zemër (përfshirë dhimbje gjoksi dhe aritmij);
- sindrom Stivens – Xhonson;
- nekrolizë epidermale tokiske.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë tē përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI ERITROMICINE

Mbajeni larg fëmijëve.

Mos e përdorni Eritromicina pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim. Mos e ruani mbi 25°C.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Eritromicine – Tableta 250 mg

Lënda vepruese është eritromicinë estolat. Çdo tabletë përmban 360 mg eritromicinë estolat ekuivalent me 250 mg eritromicinë bazë. Përbërësit e tjerë: amidon, xelatinë, stearat magnezi, talk, glikolat natriumi i amidonit.

Përbajtja e paketimit:

Kuti me 30 tableta.

Kuti me 50 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:

 Sipas recetës së mjekut.

 Përbajtja.  Kujdes.

 Forma e tabletës.

Mbjatësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:

 PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u formuloja për herë tē fundit në Prill 2015.