

**FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:**  
Informacion për pacientin

# NICORDIN

Tableta – 20 mg  
(Nitrendipinë)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpëra se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjérë. Mund t'i dëmtojë atë edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësitet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoffoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Cfarë është Nicordin dhe përsë përdoret?
- Përpëra se të merrni Nicordin
- Si ta merrni Nicordin?
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Nicordin?
- Informacion i mëtejshëm

## 1. ÇFARË ËSHTË NICORDIN DHE PËRSE PËRDORET

Nicordin është një bar për trajtimin e hipertensionit. Lënda aktive nitrendipinë është një antagonist i kalciumit, i tipit të dihidropiridinave.

Nicordin përdoret për trajtimin e hipertensionit esencial (hipertension i cili nuk është i lidhur me sémundjen e një organi të caktuar).

## 2. PËRPËRA SE TË MERRNI NICORDIN

Nicordin nuk mund t'ë merret:

- nëse jeni të mbindjeshëm (alergjikë) ndaj nitrendipinës, antagonistëve të kalciumit t'ë tipit të 1,4-dihidropiridinave, ose ndaj çdo përbërësi tjetër të Nicordin
- nëse keni shok kardiovaskular
- nëse keni ngushtim t'ë avancuar të valvulës së zemrës (stenozë e valvulës së aortës, stenozë e valvulës së subaortës)
- në infarkt akut të miokardit (brenda 4 javëve të para)
- në angina pektoris të paqëndrueshme, si edhe gjatë shtatzënës dhe periudhës së laktacionit.

Tregoni kujdes t'ë veçantë me Nicordin

- nëse nuk trajtohet në mënyrë t'ë mjaftueshme dobësimi i muskujve t'ë zemrës (insuficiencë kardiak e dekompenzuar). Në këtë rast kërkohet një mbikqyrje e kujdeshme nga mjeku.

Fëmijët

Për përdorimin tek fëmijët nuk ka t'ë dhëna t'ë mjaftueshme.

Të moshuar

Një rënie e shpejtë t'ë presionit t'ë gjakut nuk është t'ë dëshiruar tek pacientët e moshuar me presion t'ë lartë gjaku. Dozimi në këtë rast duhet t'ë shoqërohet me kontroll të shpeshta t'ë presionit t'ë gjakut. Shih „Si duhet t'ë përdoret Nicordin?“.

Marrja e Nicordin me barna t'ë tjera

Ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin nëse ju përdorni barna t'ë tjera ose nëse i keni përdorur pak para se të merrni Nicordin, edhe nëse bëhet fjälë për barna t'ë marra pa recetë.

Nicordin ndikon si më poshtë:

## Rritje t'ë veprimit dhe ndosha t'ë efekteve anësore

- Efekti i Nicordin për uljen e presionit t'ë gjakut mund t'ë thiksohet nga kombinimi me barna t'ë tjera që përdoren për uljen e presionit t'ë gjakut.
- Përdorimi i njëkohshëm i Nicordin dhe blokuesve të receptorëve beta kërkon një përkujdesje t'ë veçantë t'ë pacientëve se pse mund t'ë ndodhë një ulje e theksuar e presionit t'ë gjakut; në disa raste mund t'ë ndodhë edhe shfaqa e dobësimit t'ë muskujve t'ë zemrës. Duhet t'ë mënjandhet dhënia e njëkohshme e beta – blokuesve intravenozë dëhe Nicordin.
- Cimetidina mund t'ë gjotë në një rritje t'ë niveleve t'ë

nitrendipinës në plazëm dhe në këtë mënyrë mund t'ë rrissë efektin e saj.

## Dobësim t'ë veprimit

- Nga përvaja me antagonistin e kalciumit nifedipinë, pritet që rifampicina, për shkak t'ë saj induktues t'ë enzimave, t'ë përspejtëjë metabolismin e nitrendipinës. Nëpërmjet kësaj mund t'ë ulet efikasiteti i nitrendipinës. Në rast se merret njëkohësisht rifampicinë, mund t'ë jetë e nevojshme përshtatja e dozës së nitrendipinës, ose edhe një plotësim terapije.

Nicordin ndikon në efektin e këtyre barnave:

- Nëse merret njëkohësisht digoksinë, është e mundur rritja e nivelit plazmatik t'ë saj. Për këtë arsyse duhet patur kujdes për simptomat e mbidozimit të digoksinës dhe nëse duhet, nivelet plazmatike të digoksinës duhen matur. Nëse është e nevojshme, doza e digoksinës duhet t'ë reduktohet.
- Antagonistët e kalciumit mund t'ë forcojnë inotrop negativ t'ë antiaritmikëve (p.sh. amiodaron, kinidinë) dhe t'ë çojnë në arrest sinusal dhe blokimi atrioventrikular.
- Mund t'ë zgjatet efekti i disa muskulorelaksantëve (halogenjuri t'ë pankuronium-it, vekuronium-it).
- Marrja e njëkohshme e prazosinës mund t'ë çojë në një rënje t'ë theksuar t'ë presionit t'ë gjakut.

Marrja e Nicordin me ushqim dhe pije

Lëngu i grejpfrutit pengon degradimin oksidativ të nitrendipinës. Përgjëndrimet më t'ë larta plazmatike që rezultojnë mund t'ë çojnë në ulje më t'ë theksuar t'ë presionit t'ë gjakut.

Shtatzënja dhe ushqimi me gji

Këshillohuni me mjekun apo farmacistin përpëra se të merrni / përdorni çdo bar.

Shtatzënja

Gjatë shtatzënës nuk lejohet t'ë përdoret Nicordin, sepse eksperimentet e bëra tek kafshët kanë treguar që dozat e larta t'ë barit dërmtojnë fetusin. Nuk ka eksperiencë tek njerëzit.

Ushqimi me gji

Nitrendipina, lënda aktive e Nicordin, kalon në sasi t'ë vogla në qumështin e nënës. Meqë nuk ka t'ë dhëna mbi efektet tek fosfrijet, rekombanohet t'ë ndalojet dhënia e gjirit nëse është i domosdoshëm trajtimi me Nicordin.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Trajtimi me këtë bar kërkon kontroll t'ë rregullt tek mjeku.

Meqë reagimet gjatë përdorimit t'ë këtij bari janë t'ë ndryshme dhe individuale, mund t'ë ndodhë që t'ë ndikohet aftësia për t'ë drejtuar automjetin, përdorur makineri, apo për t'ë kryer punë pa një pikëmbështetje t'ë sigurt. Ky ndikim është më i fortë në fillim t'ë terapisë, kur rritet doza dhe kur ndërrohet preparati, si dhe kur përdoret në kombinim me alkolin.

3. SI TA MERRNI NICORDIN?

Merreni Nicordin gjithmonë ashtu si ju rekomanon mjeku. Pyesni mjekun apo farmacistin nëse nuk jeni t'ë sigurtë.

Nëse mjeku nuk e përcaktion ndryshtë, doza e zakonshme është:

Terapija duhet t'ë jetë individuale sipas shkallës së gravititetit t'ë sémundjes. Nëse nuk është përcaktuar ndryshtë në recetë, është e vlefshme doza e mëposhtme:

1-herë në ditë (mëngjes) 1 tabletë Nicordin (20 mg nitrendipinë).

Doza ditore mund t'ë rritet gradualisht deri në 2 herë në ditë nga 1 tabletë Nicordin (40 mg nitrendipinë) kur reduktimi i presionit t'ë gjakut është t'ë pamjaftueshëm.

Doza ditore maksimale është 40 mg nitrendipinë.

Tek pacientët me sémundje kronike t'ë mëlcisë, veçanërisht tek pacientët e moshuar, metabolizmi i barti mund t'ë jetë i ionuar, i cili mund t'ë gjotë në rënie t'ë padëshirueshme t'ë presionit t'ë gjakut. Për këtë, doza këtë pacientë duhet t'ë jetë ½ tablete Nicordin (10 mg nitrendipinë), e shoqëruar me kontroll t'ë shpeshtë t'ë presionit t'ë gjakut. Nëse presioni i gjakut rritet shumë, atëherë kërkohet me domosdoshmëri ndryshimi i bartit.

Mënyra dhe kohëzgjata e përdorimit

Merrni tabletat pa i përtypur, pas ushqimit, dhe shoqërojini me lëngje (një gotë me ujë [200 ml]). Nuk lejohet t'ë shoqërohen me lëng grejpfruti sepse kjo rrit efektin e Nicordin (shih "Marrja e Nicordin me ushqim dhe pije"). Për kohëzgjatjen e përdorimit vendos mjeku i terapisë.

Flisni me mjekun ose farmacistin nëse keni përshtypjen që efekti i Nicordin është shumë i fortë apo shumë i dobët.

Nëse keni marrë më shumë Nicordin sesa duhet

Njoftoni menjëherë mjekun tuaj nëse mendoni se keni marrë mbidoz, me qëllim që ai t'ë vendosë për masat e mëtejshme! Një mbidoz akute shoqërohet me skuje t'ë fortë t'ë lëkurës (afshe), dhimbje koke, rënje t'ë theksuar t'ë presionit t'ë gjakut, rrafje zemrë t'ë përspejtua apo ngadalësuara, turbullim t'ë vetëdijes deri në humbje t'ë thellë t'ë saj.

Nëse keni harruar t'ë merrni Nicordin

Nëse keni harruar t'ë merrni një dozë t'ë tabletës, mos merrni një dozë t'ë dyfishtë. Vazhdoni terapinë vetëm me dozën e rekomanduar.

Nëse ndërprisni marrjen e Nicordin

Një ndërprerje ose ndryshim bari bëhet vetëm me rekombanin e mjekut. Nëse keni pyetje t'ë tjera për përdorimin e barit, pyesni mjekun ose farmacistin.

## 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si çdo bar tjetër, edhe nitrendipina mund t'ë ketë efekte anësore, t'ë cilat mund t'ë mos shfaqen tek secili pacient.

Në vlerësimin e efekteve anësore, janë përdorur këta tregues:

Shumë t'ë shpeshta	Më shumë se 1 pacient nga 10
Të shpeshta	1 deri 10 pacientë nga 100
Të pazakonta	1 deri 10 pacientë nga 1 000
Të rralla	1 deri 10 pacientë nga 10 000
Shumë t'ë rralla	Më pak se 1 pacient nga 10 000
Të panjohura	Frekuencia nuk mund t'ë vlerësohet në bazë të dhënavë që disponohen

Efektet e mundshme anësore

Veçanërisht në fillim t'ë terapisë mund t'ë ndodhë shpesh dhimbje koke dhe skuje t'ë lëkurës së fytyrës ose skuje t'ë lëkurës me ndjesi ngrënohtës (eritemë).

Gjatë javëve t'ë para t'ë trajtimit mund t'ë ketë një volum t'ë rritur t'ë urinës. Herë pas here mund t'ë keni traizira, lodhje, marrje mendsh, çrrugilime gastro-intestinale (të vjella, ndjesi e ngopjes, diarre), dhimbje koke, rënje t'ë theksuara t'ë presionit t'ë gjakut, kruarje në krahë dhe në këmbë (parestezi), shtim t'ë rrafjeve t'ë zemrës (takikardi), palpitacione, si dhe për shkak t'ë zgjerimit të enëve t'ë gjakut, ndodh akumulimi i lëngjeve në pjesën e poshtme t'ë këmbëve.

Herë pas here, veçanërisht në fillim t'ë terapisë, mund t'ë ndodhë shfaqa e angina pektoris, sidomos tek pacientët me angina pektoris mund t'ë ndodhë më shpesh. Gjithashu, është përkruar edhe rasti t'ë infarkti kardiak.

Janë vënë rë shenja nervoziteti ose reaksiione t'ë lëkurës si kruarje (prurit), urtkarie.

Veçanërisht në doza t'ë larta janë vënë rë ne raste t'ë rralla dhimbje muskujsh (mialgji), dridhje t'ë gishtave (tremor), si edhe ndryshim i përkohshëm i perceptimit vizual.

Në raste t'ë veçanta, në trajtimin e zgjatur, mund t'ë ndodhin ndryshime t'ë mishrave t'ë dhëmbëve (hiperplazi e gingivave), t'ë cilat janë t'ë rikthyeshme pas ndërprerjes së barit.

Në disa raste, veçanërisht në pacientët e moshuar që marrin trajtim afatgjatë, është vënë rë ne një zmadhim i gjoksit (gjinikomasti), e cila është e rikthyeshme me ndërprerjen e barit.

Gjatë trajtimit me nitrendipinë (lënda aktive e Nicordin) janë vërehetur në disa raste rritje t'ë enzimave t'ë mëlcisë (fosfataza alkaline/ose SGOT, SGPT), t'ë cilat ishin t'ë rikthyeshme pas ndërprerjes së terapisë.

Informoni mjekun ose farmacistin nëse efektet anësore bëhen serioze dhe nëse vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk është përmendur në këtë fletëudhëzues.

## 5. SI TA RUANI NICORDIN?

Ruajeni barin larg nga fëmijët.

Kushtet e ruajtjes

Mos e ruani mbi 25°C!

Ruajeni në paketimin original dhe ruajeni nga drita!

Tabletetë zhvisheni nga flita vetëm para përdorimit. Ju nuk duhet t'ë përdorni këtë bar pas datës së skadencës t'ë shënuar në kuti dhe në blister. Data e skadencës i referohet ditës së fundit t'ë muajit.

## 6. INFORMACION I MËTEJSHEM

Çfarë përmban Nicordin:

Lënda aktive është nitrendipinë.  
1 tabletë përmban 20 mg nitrendipinë,  
½ tabletë përmban 10 mg nitrendipinë.

Përbërësit e tjerë janë:  
amidon misri, celulozë mikrokristalore, kopovidon, laurilsulfat natriumi, stearat magnezit.


Si paraqitet Nicordin dhe përbajtja e kutisë:

Tabletë me ngjyrë t'ë verdhë t'ë lehtë, e rrumbullakët, e harkuar, me një vijë ndarëse.  
Nicordin është e paketuar në kuti me 30 tabletë.


Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:



Bari nuk mund t'ë merret gjatë shtatzanisë.



Përbajtja. Kujdes.



Forma e tabletës.

Mbjatësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

**PROFARMA Sh.a.**  
Rruga "Myslym Keta"  
Tel./Fax: 00355 4 23 62 800  
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë t'ë fundit në Nëntor 2013.