

**I** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion për pacientin

# NITROSORBIT

Tableta - 10 mg  
(Izosorbid dinitrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efektëve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

1. Çfarë është Nitrosorbit dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Nitrosorbit
3. Si ta merrni Nitrosorbit
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Nitrosorbit
6. Informacion i mëtejshëm

## 1. ÇFARË ËSHTË NITROSORBIT DHE PËRSE PËRDORET

Nitrosorbit përmban lëndën vepruese izosorbid dinitrat. Veprimi farmakologjik themelor i dinitratit të izosorbidit, sikurse i të gjitha nitratreve organike, është lëshimi i muskulaturës së lëmuar vaskulare si rezultat i nxitjes së prodhimit të monofosfatit të guanozinës ciklike intraqelizore. Lëshimi i arteriolave e ul rezistencën vaskulare sistemike dhe presionin arteror.

Nitrosorbit – 10 mg – tableta indikohet në:

- profilaksi dhe mjekim i angina pectoris;
- insuficiencë e ventrikullit të majtë.

Mjeku juaj mund t'ju ketë dhënë Nitrosorbit për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni të dini pse ju është dhënë Nitrosorbit.

## 2. PËRPARA SE TË MERRNI NITROSORBIT

Mos merrni Nitrosorbit në qoftë se:

- keni mbindjeshmëri të njohur ndaj tij dhe nitratreve në përgjithësi ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit;
- jeni në kushte hipotensive dhe hipovolemie;
- keni kardiomiopati obstruktive hipertrofike;
- keni stenoze të aortës;
- keni tamponadë kardiake;
- keni stenoze mitrale;
- keni anemi të rëndë;
- keni glaukomë me kënd të ngushtë;
- keni trauma të kokës dhe hemorragji cerebrale;
- njëkohësisht merrni sildenafil (Viagra), sepse ky i fundit e fuqizon efektin e barit në uljen e presionit të gjakut.

Tregoni kujdes të veçantë me Nitrosorbit

Përdorimi i dinitratit të izosorbidit duhet bërë me kujdes në të sëmuret me glaukomë (kundërkohet në glaukomën me kënd të ngushtë), sepse ai e rrit presionin intraokular.

Kur mjekimi vazhdon për kohë të gjatë, mund të zhvillohet tolerancë, ndërsa kur kombinohet me nitratet e tjera organike, mund të zhvillohet

tolerancë e kryqëzuar. Për të shmangur shfaqjen e tolerancës, mjekimi duhet ndërprerë me intervale.

Nëse lind nevoja të ndërpritet mjekimi me doza të larta dinitrat izosorbidit, është e nevojshme që të bëhet një ulje graduale e dozës sepse ndërprerja e menjëhershme e mjekimit mund të shkaktojë angina pectoris.

Të sëmuret që përdorin nitrata organike njëherësh me vazodilatatorë të tjerë ose antihipertensivë të tjerë, duhen mbikëqyrur me kujdes për mundësinë e efekteve antihipertensive additive.

Përdorimi i njëkohshëm i alkoolit mund të shkaktojë hipotension, për rrjedhojë duhet mënjënuar.

Ky bar duhet përdorur me kujdes në hipotroidizëm, keqshqyerje apo hipotermi.

Ky bar duhet përdorur me kujdes në hipoksemi apo anomali të tjera të ventilimit dhe perfuzionit.

Duhet shmangur përdorimi i barit gjatë shtatzënisë.

Duhet shmangur përdorimi i barit gjatë periudhës së ushqimit me gji.

Marrja e barnave të tjera

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Nitrosorbit.

Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë.

Ekzistojnë një sërë barnash që theksojnë efektin hipotensiv të dinitratit të izosorbidit. Përmenden:

- ACE – inhibitorët;
- alfa-blokuesit;
- aldeseleuin;
- anestezikët e përgjithshëm;
- antagonizistët e receptorëve të angiotenzinës II;
- frenuesit e MAO-s;
- antipsikotikët (fenotiazin);
- anksiolitikët dhe hipnotikët;
- beta-blokuesit;
- kalçiblokuesit;
- klonidina;
- diazoksidi;
- diuretikët;
- levodopa;
- metildopa;
- miorelaksantët (baklofen ose tizanidin);
- alprostadili;
- sildenafili (e thekson ndjeshëm efektin hipotensiv; të shmangët përdorimi i njëkohshëm);
- tadalafili (e thekson ndjeshëm efektin hipotensiv; të shmangët përdorimi i njëkohshëm);
- vardenafili (të shmangët përdorimi i njëkohshëm);
- antihipertensivët vazodilatatorë (hidralazinë, minoksidil, nitroprusid).

Efekti hipotensiv i nitratit antagonizohet nga AIJS, kortikosteroidet, estrogjenët.

Alkooli thekson efektin hipotensiv të dinitratit të izosorbidit.

Kombinimi i nitratit me dihidroergotaminën mund të shkaktojë rritjen e presionit sistolik të gjakut dhe të efekteve anginoze.

Marrja e Nitrosorbit me ushqim dhe pije

Përdorimi i njëkohshëm i dinitratit të izosorbidit dhe alkoolit mund të shkaktojë hipotension e për rrjedhojë duhet mënjënuar.

Shtatzënia

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të ngeleni shtatzënë. Ende nuk është sqaruar siguria e

përdorimit të nitratreve organike në periudhën e shtatzënisë, ndaj ky bar nuk duhet përdorur gjatë kësaj kohe.

Ushqimi me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësht gjini. Ende nuk është sqaruar plotësisht siguria e përdorimit të nitratreve organike në periudhën e të ushqyerit të fëmijëve me gji, ndaj ky bar nuk duhet përdorur gjatë kësaj periudhe.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Për shkak të efektit hipotensiv edhe kur merret në doza terapeutike, ky bar mund të dëmtojë aftësitë për të drejtuar automjetin ose për të punuar me makineri.

Ky efekt theksohet edhe më shumë nëse njëkohësisht konsumohet alkool.

Informacione të rëndësishme për disa nga përbërësit e Nitrosorbit

Ky bar përmban laktozë. Nëse ju është thënë nga mjeku juaj se keni intolerancë ndaj disa sheqernave, flisni me mjekun përpara se të merrni këtë bar.

## 3. SI TA MERRNI NITROSORBIT

Gjithmonë merrni tabletat Nitrosorbit vetëm sipas këshillës së mjekut.

Në qoftë se ndjeni që efektet e tyre janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Dozimi i tabletës është si vijon:

*Në angina pectoris:* 20 – 120 mg në ditë, në doza të ndara;

*në insuficiencën e ventrikullit të majtë:* 40 – 160 mg dhe në rast nevojë deri në 240 mg në ditë, në doza të ndara.

Në qoftë se keni marrë më shumë Nitrosorbit

Në qoftë se keni marrë më shumë Nitrosorbit se sasia që duhet të merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin, ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren.

Në qoftë se harroni të merrni Nitrosorbit

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e zakonshme të saj. Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se ndërprisni marrjen e Nitrosorbit

Në qoftë se lind nevoja të ndërpritet mjekimi me dinitrat izosorbidit, është e nevojshme që të bëhet një ulje graduale e dozës sepse ndërprerja e menjëhershme e mjekimit mund të shkaktojë angina pectoris. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 4. EFFEKTË ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund të shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Përdorimi për kohë të gjatë dhe me doza të larta mund të favorizojë këto efekte:

- dhimbja e kokës që është e zakonshme në fillim të mjekimit, mund të dominohet ose duke ulur dozën ose duke përdorur një analgjek, por dhimbja e kokës zakonisht kalon edhe me vazhdimin e mjekimit;
- marrje mendsh e dobësi kalimtare si dhe shenja të tjera të iskemisë cerebrale, për shkak të hipotensionit postural;
- skuqje e fytyrës;

- takikardi;
- çrregullime gastrointestinale;
- në të sëmuret të ndjeshëm ndaj efektit antihipertensiv të nitratreve mund të shfaqen të përziera, të vjella, asteni, hipotension, djersitje e kolaps, madje edhe kur përdoren dozat e zakonshme terapeutike;
- pas përdorimit afatgjatë të dinitratit të izosorbidit mund të shfaqen ekzantema, kurse dozat e larta të barit mund të shkaktojnë methemoglobinemi.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 5. SI TA RUANI NITROSORBIT

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos e përdorni këtë bar pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!

## 6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Nitrosorbit

Lënda vepruese është izosorbid dinitrat.

Çdo tabletë përmban 10 mg izosorbid dinitrat.

**Përbërësit e tjerë janë:** laktozë monohidrat, celulozë mikrokristalore, talk dhe stearat magnez.

Përmbajtja e paketimit

Kuti me 30 tableta, kuti me 60 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:



Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.



Përmbajtja.



Kujdes.



Forma e tabletës.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



**PROFARMA Sh.a.**  
Rruga "Myslym Keta"  
Tel.: 00355 4 23 89 602  
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Prill 2015.

SPECIFICATION

CROPING AREA 12 x 19 cm

**PAY ATTENTION**, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.