

FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

VALSAN

Tableta të veshura me film - 160 mg
(Valsartan)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpëra se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojtë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptomata si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njotoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Valsan dhe përsë përdoret
- Përpëra se të merrni Valsan
- Si ta merrni Valsan
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Valsan
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË VALSAN DHE PËRSË PËRDORET

Valsan përbën substancën aktive valsartan, i cili është një antagonist i receptorëve të angiotenzinës II. Angiotenzina II, e cila prodhohet nga organizmit, ngushtron enët e gjakut. Kjo gjë shkaktor rritjen e presionit të gjakut. Valsan parandalon ngushtrimin e enëve të gjakut duke blokuar efektin e angiotenzinës II. Kjo gjë riklasxon enët e gjakut dhe ul presionin.

Valsan 160 mg – tabletë e veshur me film përdoret pér:

- trajtimin e pacientëve me presion të lartë të gjakut (hipertension); Presioni i lartë i gjakut rrit ngarkesën e zemrës dhe të arterieve. Nëse nuk trajtohet mund t'i dëmtojtë enët e gjakut të trurit, zemrës dhe veshkave dhe mund të çojë deri në insult, insuficiencë kardiak ose insuficiencë renale. Presioni i lartë i gjakut rrit rishkin e atakeve kardiak. Duke ulur presionin tuaj të gjakut deri në një vlerë normale, ulet rishki i zhvillimit të këtyre çregjallimeve.
- trajtimin e pacientëve që kanë kaluar një atak kardiak (infarkt miokardi) kohët e fundit (12 orë deri në 10 ditë);
- trajtimin e pacientëve me insuficiencë kardiak (insuficiencë kardiak simptomatike), kur trajtimi me barna të tjerë specifike (të njohur si ACE – inhibitorë, të përdorur në trajtimin e insuficiencës kardiak) nuk është i përshtatshëm. Megjithatë, Valsan mund të merret së bashku me ACE - inhibitorët, nëse nuk mund t'i përdoren beta - blokuesit (barna të përdorur në trajtimin e insuficiencës kardiak). Simptomat e insuficiencës kardiakë përfshijnë vështirësi në frymëmarrje dhe djersitje të këmbëve për shkak të grumbullimit të lëngjeve në këto gjymtirë. Kjo shkaktohet kur muskuli kardiak nuk mund t'i pompojë sasinë e gjakut të nevojshme për të furnizuar të gjithë organizmin.

2. PËRPARA SE TË MERRNI VALSAN

Mos merrni Valsan:

- në qoftë se jeni i ndjeshtëm ndaj valsartanit ose ndaj çdo përbërësi tjetër të Valsan;
- nësë keni një dëmtim të rëndë të funksionit hepatik ose nëse vuani nga sëmundje hepatike;
- në qoftë se jeni më shumë se 3 muajshje shtatzënë (është mirë gjithashtu të shëmangni trajtimin me Valsan në muajt e parë të shtatzënisë).

Në qoftë se ndonjë nga këto raste vlen pér ju, mos merrni Valsan.

Tregoni kujdes të veçantë me Valsan

Pyesni mjekun tuaj përpëra se të merrni Valsan:

- nëse keni çregjallim të funksionit të veshkave ose nëse i nënshtroheni diyalizës;
- nëse keni çregjallim të funksionit të mëlçisë;
- nëse jeni në dijeni se keni një ngushtim ose obstruksion të enëve të gjakut të veshkave;
- nëse kohët e fundit keni kryer një transplant të veshkës (keni marrë një veshkë të re);
- nëse vuani nga hiperaldosteronizmi, një çregjallim në të cilin gjendrat adrenale prodhojnë një sasi shumë më të madhe të hormonit të njohur si aldosteron. Nëse kjo vlen pér rastin tuaj, nuk rekamandohet përdorimi i Valsan;
- nëse vuani nga të vjella të rënda ose diarre, sepse kjo mund të çojë në humbje të konsiderueshme të lëngjeve ose kripërave nga organizmi;
- nëse po trajtoheni me diuretikë (të përdorur pér të rritur ekskretimin e lëngjeve nëpërmjet veshkave);
- nëse po merrni diurektikë kalkuryse ose përgatesa me kalium, nëse përdorni kripëra zëvendësuese që përbëjnë kalium ose nëse po përdorni barna të tjerë (si p.sh.: heparina), të cilat risin sasinë e kaliumit në gjak. Mund të jetë e nevojshme të kontrolloni sasinë e kaliumit në gjak në intervallë të rregullta;

- nëse keni probleme me valvulat e zemrës ose muskulini e saj, ose nëse keni shqetësimë të tjerë të rënda të zemrës;
- nëse po trajtoheni pér insuficiencë kardiak ose pas një ataku kardiak, sepse funksionimi i veshkës tuaj mund të përkëqësoshet gjatë trajtit;
- konsultohuni me mjekun nëse jeni (ose mund të mbeteni) shtatzënë. Valsan nuk rekamandohet në fillim të shtatzënisë dhe mund të shkaktojë dëmtimë serioze të fetusit pas tremujorit të parë të shtatzënisë.

Marrja e barnave të tjerë

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjerë mund të ndikojë ose të ndikohet nga Valsan. Megjithatë, ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohë e fundit barna të tjerë, përfshirë ato të marra pa recetë. Mund të jetë e nevojshme të ndryshoni dozën, ose në disa raste të ndaloni marrjen e njërit prej barnave. Kjo vlen si pér barnat që merren me recetë edhe pér ata që merren pa recetë.

Rekomandohet përkujdesje e veçantë nëse merrni ndonjë nga barnat e mëposhtme gjatë trajtimit me Valsan:

- barna të tjerë pér uljen e presionit të gjakut, veçanërisht shkarkuesit (diuretikët), meqenëse këtë të fundit mund të ulin akoma më shumë presionin e gjakut;
- barna që rrisin sasinë e kaliumit në gjak, si përgatesat e kaliumit, kripërat zëvendësuese që përbëjnë kalium ose barnat kalkuryse sic janë disa ilaçë diuretikësh ose disa barna të tjerë që rrisin sasinë e kaliumit në gjak (si p.sh.: heparina);
- disa tipi analgjezikësh të quajtur antiinflamatore (ose barna antiinflamatore josteroide). Këto barna mund të bëjnë që Valsan të jetë më pak efektiv në uljen e presionit të gjakut. Nëse funksioni i veshkave është i dëmtuar, marrja e këtyre barnave në të njëjtën kohë me Valsan mund të shkaktojë përkëqësim të funksionit të veshkave;
- barnat që përbëjnë litium (barna që përdoren pér trajtimin e disa tipeve të sëmundjeve psikiatrike). Nuk duhet të përdorni Valsan dhe litium në të njëjtën kohë, përvise rastevi kur jeni nën një monitorim strikt nga mjeku tuaj. Në këtë rast mjeku duhet të marrë masa paraprake të veçanta (p.sh.: analiza gjakut);
- nëse po trajtoheni pér insuficiencë kardiakë dëmtimë e gjakut që kanë kohët e fundit (12 orë deri në 10 ditë);
- nëse po trajtoheni pér insuficiencë kardiakë përfshijnë vështirësi në frymëmarrje dhe djersitje të këmbëve për shkak të grumbullimit të lëngjeve në këto gjymtirë. Kjo shkaktohet kur muskuli kardiak nuk mund t'i pompojë sasinë e gjakut të nevojshme për të furnizuar të gjithë organizmin.

Fëmijët dhe adoleshentët (nën moshën 18 vjeç)

Përdorimi i Valsan nuk rekamandohet tek fëmijët dhe adoleshentët nën moshën 18 vjeç.

Pacientët e moshuar (mbi 65 vjeç)

Ju mund të merrni gjithashtu Valsan nëse jeni 65 vjeç ose më shumë.

Shtatzënja dhe ushqyerja me gjji
Duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse jeni (ose mund të mbeteni) shtatzënë. Mjeku juaj do t'ju këshillojë të ndërprisni trajtimin me Valsan përpëra se të mbeteni shtatzënë ose sapo të jeni vënë në dijeni se jeni shtatzënë dhe do t'ju këshillojë të merrni një bar tjetër në vend të Valsan. Valsan nuk rekamandohet në muajt e parë të shtatzënisë, dhe nuk duhet marrë pas tremujorit të parë, sepse mund të shkaktojë dëmtimë serioze tek fetusi.

Konsultohuni me mjekun tuaj nëse ushqeni me gjji ose do të filloni të ushqeni me gjji. Valsan nuk rekamandohet pér nérat që ushqejnë me gjji fémijën e tyre dhe mjeku juaj mund ta zëvendësojë këtë bar me një tjetër, veçanërisht nëse fémija juaj është i sapolindur ose ka lindur prematur (më pak se 9 muajshje).

Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj përpëra marrjes së çfarëdolloj bari.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Si shumë barna të tjerë që përdoren pér trajtimin e presionit të lartë të gjakut, Valsan në rastë të rralla mund të shkaktojë marrje mendsh dhe mund të ndikojë në aftësinë pér tu përqëndruar. Përpëra drejtimit të automjetit, përdorimit të makinerive apo kryerjes së aktiviteteve të tjerë që kërkojnë përqëndrim, sigurohuni të dini se si ndikon Valsan tek ju.

3. SI TA MERRNI VALSAN

Gjithmonë merrni Valsan sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Personat me presion të lartë të gjakut shpeshherë nuk i vërejnë shenjat e këtyrë problemi. Shumë prej tyre mund të ndihen krejtësisht normalë. Këtij e bën akoma më të rëndësishme nevojën e vizitatëve tek mjeku edhe kur ndjehen mirë.

Marrja e Valsan me ushqim dhe pije

Valsan mund të merret me ose pa ushqim.

Rekomandime të përgjithshme pér dozinën

Valsan është i disponueshëm në dozën 160 mg.

Pacientët me presion të lartë të gjakut

Doza e zakonshme është 80 mg valsartan, një herë në ditë. Në disa raste mjeku juaj mund të vendosë të rrissë dozën deri në 160 mg ose 320 mg valsartan në ditë ose t'ju përshkruajë një bar tjetër (p.sh.: një diuretik).

Pacientët që kanë kaluar kohë e fundit një atak kardiak

Trajtimi me këtë bar zakonisht fillon 12 orë pas ataku kardiak. Në këtë rast doza filloreste është 20 mg, dy herë në ditë, dhe rritet gradualisht pér disa javë deri në një dozë maksimale prej 160 mg, dy herë në ditë. Në disa raste, mjeku mund t'ju përshkruajë barna të tjerë pér të mjkuar atakun kardiak. Doza përfundimtare e mjkimit tuaj mund të varet nga toleranca juaj individuale. Mjeku juaj do t'vendosë trajtimin e përshtatshëm pér ju.

Pacientët me insuficiencë kardiakë

Doza filloreste e zakonshme është 40 mg, dy herë në ditë, dhe rritet gradualisht pér disa javë, deri në një dozë maksimale prej 160 mg, dy herë në ditë. Në disa raste, mjeku mund t'ju përshkruajë barna të tjerë pér të mjkuar insuficiencë kardiak. Doza përfundimtare e mjkimit tuaj mund të varet nga toleranca juaj individuale. Merrni gjithmonë tabletat e veshura me film Valsan me një gotë ujë. Mund t'ju merrni Valsan me ose pa ushqim.

Në qoftë se keni marrë më shumë Valsan

Në qoftë se keni marrë gabimisht më shumë Valsan se sasia që duhet t'është merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën pér të marrë një mendim pér rrezikun e kësillimit pér veprin që duhet t'ë ndërrerren. Simptomat nga mbiqdumi përfshijnë:

Në qoftë se keni harruar të merrni Valsan

Mos e ndërprisni trajtimin me tabletat pës që kësilluar me mjekun. Nëse ndërprisni trajtimin me Valsan, sëmundja juaj mund të përkëqësoshet. Mësazh marramendje t'ë theksuar, përgjumje dhe t'ë fikët.

Nëse ndalonit trajtimin me Valsan

Mos e ndërprisni trajtimin me tabletat pës që kësilluar me mjekun. Nëse ndërprisni trajtimin me Valsan, sëmundja juaj mund të përkëqësoshet.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si t'ë gjithë barnat e tjerë, valsartani mund t'ë shkaktojë efekte anësore, megjithëse o gjokush i manifeston.

Frekuencia e efekteve anësore të mundshme shfaqet në tabelën e mëposhtme:

Shumë të zakonshme	ndodhin në më shumë se 1 në 10 përdorues
Të zakonshme	ndodhin në më pak se 1 në 100, por më shumë se 1 në 1000 përdorues
Të pazakonta	ndodhin në më pak se 1 në 1000, por më shumë se 1 në 10 000 përdorues
Të rralla	ndodhin në më pak se 1 në 1000, por më shumë se 1 në 10 000 përdorues
Shumë të rralla	ndodhin në më pak se 1 në 10 000, duke përfshirë rastet e izoluarra
Të panjohura	frekuencia nuk mund t'ë vlerësitet nga të dhënat që disponohen

Efekte anësore të rëndësishme

Disa efekte anësore mund t'ë jenë të rënda. Në rast t'ë shfaqjes së simptomave të mëposhtme ju duhet t'ë ndërprisni trajtimin me Valsan dëmtimë e gjakut që kanë menjëherë me mjekun tuaj.

Simptomat janë:

- enjte e fytyrës, gjuhës ose fyti;
- vështirësi në gjelltitje,
- urtikarie;
- vështirësi në frysëmarrje.

Efekte të tjerë anësore të mundshme

Të zakonshme:

- marrje mendsh, marrje mendsh e shkaktuar nga ngritja në këmbë;
- presion i ulët i gjakut me simptomat: marrje mendsh;
- përkësime i funksionit të veshkave (me shenjat e dëmtimit të veshkave).

Të pazakonta:

- reaksion alergjik me simptomat: rash, kruarje, marrje mendsh, enjte të fytyrës, buzëve, gjuhës ose fyti, vështirësi në frysëmarrje;
- humbe e papritur e vetëdijes;
- vertigo;
- përkësime i funksionit renal (shenja të insuficiencës akute renale);
- spazma të muskujve, ritëm kardiak jonormal (shenja të hiperekalemisë);
- marrje frysme, vështirësi në frysëmarrje në pozicion shtrirë, edema të këmbëve (shenja të insuficiencës kardiakës);
- dhimbje koke;
- kollë;
- dhimbje abdominale;
- të përziera;
- diarre;
- lodhje;
- debulesë.

Të panjohura:

- rash, kruarje, së bashku me shenjat ose simptomat e mëposhtme: temperaturë, dhimbje e kyçeve, dhimbje e muskujve, limfonoduj të enjtor dhe/ose simptoma të ngjashme me gripin (shenja të sëmundjes së serumit);
- njollë të kuqe në mavi, temperaturë, kruarje (shenja të inflamacionit) të enëve të gjakut, i quajtur vaskulit;
- hemorragji ose mavjosje e pazakontë (shenja të trombocitopenisë);
- dhimbje muskulare (mialgji);
- temperaturë, dhimbje fyti ose ulcera të gjogës pér shkak të infeksioneve (simptoma të nivelit të ulët t'ë rruazave të bardha të gjakut, e quajtur edhe neutropeni);
- ulje e nivelit të hemoglobinës dhe ulje e përgjindjes së rruazave të kuqe të gjakut (të cilat rastështë mund t'ë pojnjë në anemë);
- rriti e nivelit të kalinumit që gjak (i cili në raste të rënda mund t'ë shkaktojë spazma muskulare dhe ritëm jonormal kardiak);
- rriti e nivelit të kalinumit që gjak (të cilat mund t'ë indikojnë pér dëmtim të mëlçisë) duke përfshirë një rriti të bilirubinis në gjak (e cila në raste të rënda shfaqet me zverdhje të lëkurës dhe t'ye syve);
- rriti e nivelit të azotemisë me prejardhje nga ura dhe rriti e nivelit të kreatininës së serumit (shenjë që t