

**FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:**  
Informacion pér pacientin

# DAZEPAM

## Tableta - 5 mg Tretësirë pér injekzion - 10 mg / 2 ml (Diazepam)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjérë. Mund t'i dëmtojë atë edhe pse mund të kenë njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Diazepam dhe përsë përdoret
- Përparrë se të merrni Diazepam
- Si ta merrni Diazepam
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Diazepam
- Informacion i mëtejshëm

### 1. ÇFARË ËSHTË DIAZEPAM DHE PËRSË PËRDORET

Diazepam është një përgatës benzodiazepinike me veprim të zgjatur. Ai ushton veprim anksiolistik, hipnosedativ (gjumësjellës e qëtësues), miorelaksues dhe antikonvulsiv nëpërmërt receptorëve specifike benzodiazepinike, pjesa dérmuese e të cilëve ndodhen në sistemin limbik, hipotalamus, trurin e vogël dhe në korpus striatum. Këta receptorë dhe receptorët e acidit gama - aminobutirik (GABA) formojnë një njësi anatomike dhe funksionore. Pasi diazepami të jetë lidhur me një receptor, atëherë fuqizohet transmetimi i GABA-s dhe frenimi i sistemit nervor gendor. Pasojat manifestohen me një veprim antikonvulsiv dhe miorelaksues. Veprimi nxitës i neurotransmetuesve serotoninë, noradrenalinë dhe acetilkolinë zvogëlohet pér shkak të rritjes së veprimitarës së GABA dhe pér rrijedhojë fuqizohet veprimi anksiolistik, gjumësjellës dhe qëtësues i diazepamit.

Diazepam përdoret si më poshtë:

Tabletat: Gjendje ankthi, pagumësi, spazma muskulore, sindromi akut i abstinencës nga alkooli.  
Tretësira pér injekzion: Gjendje të rënda ankthi, simptoma të sindromit akut të abstinencës nga alkooli (delirium tremens), status epilepticus, spazma muskulore, tetani, paramjekim në anestezi. Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Diazepam pér një qellim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni të dini pse ju është dhënë Diazepam.

### 2. PËRPARA SE TË MERRNI DIAZEPAM

Diazepam nuk duhet të përdoret:

- nëse jeni alergjik ndaj diazepamit dhe benzodiazepinave në përgjithësi;
- nëse jeni alergjik ndaj ndonjërit prej përbërësve joaktivë të përmendur në fund të këtij fletëudhëzuesi;
- nëse keni episode të rënda të hiperkapnisë kronike;
- në insuficiencë respiratore akute;
- në insuficiencë hepatike të rëndë;
- në sindromën e apnesë së gjumit;
- në psikozenë kronike;
- në gjendje fobike ose obsesive;
- në glaukomë me kënd të ngushtë;
- në Myasthenia gravis;
- në fëmijët më të vegjël se 6 muaj;
- gjatë ushqimit me gji;
- nëse njëkohësisht përdoret ketokonazol dhe itrakonazol (pér shkak të frenimit të citokromit P450 3A).

Diazepam nuk duhet të përdoret i vetmë në trajtimin e depresionit ose ankhit të lidhur me depresionin.

Pér shkak të përbajtjes së alkoolit benzilik, tretësira pér injekzion Diazepam nuk duhet përdorur tek fëmijët nën 3 vjeç. Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos e merni barin. Shkon dhe flisni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna.

### Tregoni kujdes të veçantë me Diazepam

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se:  
• jeni alergjik ndaj barnave të tjera;  
• jeni i moshuar ose i dobësuar fizikisht;  
• keni çregullime hepatike ose renale;  
• keni dobësim muskular;  
• keni çregullime të personalitetit;  
• keni arteriosklerozë në tru;  
• vuani nga insuficiencia kardiorespiratore, sepse mund të ndodhë keqësim i mëtejshëm i frysëmarrjes, por megjithatë duhet theksuar se në disa të sémurë efekti sedativ mund t'i ndihmojë ata, duke pakësuar sforcimin e frysëmarrjes;  
• keni histori të abuzimit me barna ose alkool, pér shkak të riskut të varësise. Shmangni përdorimin afatgjatë të Diazepam dhe ndërprerjen në mënyrë të menjëershme.

### Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna të tjera, edhe ato pa recetë të illa si:  
• deprimuesit e tjërë të sistimet nervor gendor, si: alkooli, qëtësuesit, neuroleptikët, antidepresivët, antihistaminikët, anestezikët e përgjithshëm, gjumësjellësit dhe analgjezikët, sepse fuqizojnë efektin e diazepamit;  
• cimetidina, sepse frenon metabolizmin e diazepamit dha të benzodiazepinave në përgjithësi;  
• omeprazoli, sepse frenon metabolizmin e diazepamit (ritlite e përqëndrrimit plazmatik);  
• ionizazi, sepse ul klirensin e diazepamit;  
• fenitoina, sepse ul nivelet plazmatike të diazepamit;  
• acidi valproik, sepse rrit nivelet plazmatike të diazepamit;  
• rifampicina, sepse shkaktan një rritje të theksuar të metabolizmit dha/ose të fuqizojë efektet e padëshirueshme si të diazepamit;  
• ketoconazoli dhe itrakonazoli (pér shkak të frenimit të citokromit P450 3A). Këto barna mund të ndikohen nga Diazepam ose mund të ndikojnë në mënyrën se si ai vepron, ndaj në përdorimin e njëkohshëm të tyre mund të nevojitet të ndryshoju doza e Diazepam. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshilloj.

### Marrja e Diazepam me ushqim dhe pije

Ushqimi nuk ndikon në përhithjen e diazepamit. Të sémurët që përdorin Diazepam duhet të janë gjithashtu të ndërgjegjshëm rreth konsumimit të njëkohshëm të pijeve alkoolike, sepse një kombinim i tillë mund të fuqizojë efektet e padëshirueshme si të diazepamit, ashtu edhe të alkoolit.

### Shtatzënia

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të ngeleni shtatzënë. Mjeku ose farmacisti do të diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së këtij bari gjatë shtatzënës. Përdorimi i diazepamit gjatë shtatzënës duhet bërë vetëm nëse është i domosdoshëm, edhe në këtë rast me shumë kujdes dhe vetëm pasi t'i janë ballafaqar rreziqet e mundshme pér fëlinus me përfitimet e prishme terapeutike pér nënën.

### Ushqimi me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësit gjiri sepse marrja e Diazepam gjatë kësaj periudhe kundërendikohet. Mjeku ose farmacisti do të diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së këtij bari në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjën me gji apo keni në plan të bëni këtë.

### Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Të sémurët që përdorin Diazepam duhet të paralajmërohen që të mos angazhohen në punë që kërkohet syceltësi të plotë mendore, si: përdorimi i makinerive të rezikshme, apo drejtimi i automjetit.

### Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e Diazepam

Diazepam - Tableta përbënë laktöz. Nëse ju është thënë nga mjeku se keni intolerancë nga disa sheqerna, flisni me mjekun përparrë se të merrni këtë bar.

Diazepam - Tretësirë pér injekzion përbënë:  
• 40 mg / 2 ml alkool benzilik. Alkooli benzilik mund të shkaktojë reaksione tokiske dhe reaksione alergjike, kriesisht në foshnjet dha fëmijët deri në 3 vjeç, ndaj ky bar nuk duhet përdorur në këto mosha. Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj nëse keni probleme me mëlçinë ose veshkat, ose nëse jeni shtatzënë apo ushqeni me gji sepse vëllimët e larta mund të çojnë në tokositë;  
• etanol (alkool). Etanol i është i dëmshëm pér personal që vuajnë nga alkoolizmi. Duhet të merret në konsideratë në gratë shtatzënë ose që ushqejnë fëmijën me gji, fëmijët dhe pacientët me rizik të lartë, si ata me sëmundje të mëlçisë ose epilepsi.

### 3. SI TA MERRNI DIAZEPAM

Gjithmonë merrni Diazepam sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Diazepam janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj. Mjeku juaj mund t'ju kërkojë të merrni Diazepam pér një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj pér këshillë në qoftë se nuk jeni i sigurt pér sa kohë duhet tă merrni.

Tabletat duhet tē gjellitën nga goja me tē paktën një gotë ujë. Ju këshilloheni që tē mos merrni pije alkoolike me këtë bar.

### Tabletat:

Nga goja: Pér tē fituar efektin optimal, doza duhet individualizuar me kujdes. Një pasqyrë praktike pér dozinën e diazepamit që merret nga goja, jetet më poshtë:

Të ritrit:

- Gjendje ankthi: 2 mg, 3 herë në ditë deri në një dozë maksimale prej 15 - 30 mg në ditë, në doza tē ndara.
- Pagumësi: 5 mg - 10 mg përparrë se tē flini.
- Sindromi akut i abstinencës nga alkooli: 10 mg, 3 herë në ditë gjatë 24 orëve tē para dha më pas 5 mg, 3 herë në ditë.
- Spazma muskulore: 2 mg - 15 mg në ditë, në doza tē ndara.

Të moshuarit: 2.5 mg, 1 - 2 herë në ditë.

Fëmijët mbi 6 muaj: 0.1 - 0.3 mg / kg peshë.

### Tretësira pér injekzion:

Me injekzion: Në gjendjet akute doza mund tē përsëritet pas një ore, ndonëse i zakonishtëm konsiderohet një interval 4-0rësh. Në tē sémurët e moshuar dha tē dobësuar dhe kur përdoren edhe qëtësues tē tjérë, duhen përdorur doza më vogla (2 deri 5 mg), si edhe një rritje e ngadalshme e dozës.

Rugjt e injektit: Injeksionet e diazepamit nuk duhet tē përzihen ose tē hollohen me asnjë lloji bari, në tē njëjtën shirring. Në muskul:

Bari injektohet thellë në muskul. Në venë: Bari duhet injektuar me ngadalë në venë, duke përdorur një venë tē madhe dhe duke vazhduar tē paktën 1 minutë pér çdo 5 mg.

Perfusionet: Përbajtja e një ampolë diazepam hollohet me 250 ml tretësirë gluokoze 5% ose 10% apo tretësirë klorur natriumi 0.9% dha përzihet me kujdes.

### Të ritrit:

- Gjendje tē rënda ankthi: 5 - 10 mg në venë ose në muskul; në rast nevoj përsëritet pas 4 orësh.
- Símpota tē sindromit akut tē abstinencës nga alkooli (delirium tremens): 10 - 20 mg në venë ose në muskul; në rast nevoj përsëritet një dozë prej 5 - 10 mg çdo 4 orë.
- Status epilepticus: 0.15 - 0.25 mg/kg peshë, me ngadalë në venë ose në muskul, që përsëritet pas 30 - 60 minutaash ose përdoret në perfuzionim; doza maksimale pér 24 orë është 3 mg/kg peshë.
- Spazma muskulore: 10 - 20 mg në venë ose në muskul, 1 - 2 herë në ditë.
- Tetani: 0.1 - 0.3 mg/kg peshë me ngadalë në venë, me një interval prej 1 deri 4 orësh ose 3 - 4 mg/kg peshë me perfuzionim brenda 24 orësh.
- Paramjekim në anestezi: 10 - 20 mg, 1 orë përparrë pér përdorjet. Pyesni mjekun tuaj se në cilin rast duhet tē përdoret Diazepam - tretësirë pér injekzion tek fëmijët.

Pér injeksionet në venë nuk duhet tē zgjidhen vena shumë tē vogla; duhen ménjanuar në mënyrë absolute injeksionet në arterie ose dale e tretësirës jashtë enës së gjakut.

### Në qoftë se keni marrë më shumë Diazepam

Në qoftë se keni marrë më shumë Diazepam se sasia që duhet tē merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni mjekun tuaj, spitalin, ose tē telefononi urgjencën pér tē marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerren.

Vërasia e mundshme fizike ndaj diazepamit në tē sémurët që marrin dozat e rekomanuara është shumë e vogël.

### Në qoftë se keni harruar tē merrni Diazepam

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha pér marrjen e zakonshme tē saj. Mos merrni një dozë tē dyfishtë pér tē plotësuar dozën e haruar.

### Në qoftë se ndërprisni Diazepam

Diazepam nuk duhet tē ndërpritet në mënyrë të menjëershme, sepse mund t'ju shfaqen efekte tē padëshirueshme.

Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti,

pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

### 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund tē shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve tē mundshme anësore. Mund tē mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore tē mëposhtës:

- më tē zakonshme janë: lodi, këpupje, dobësi muskulore dha ataks;
- më tē rralla janë: konfuzion, konstipacion, depresion, diplopi, dizarri, dhimbje koke, hipotension, depresion respirator, mbajtje dha inkontinencë e urinës, vështirësi në tē folur, dridhje, marrje mendsh, turbullim i tē parit, ndryshime në libido, ndryshime në pështymë, amnezi;
- më raste tō rralla janë vërejtur rritje e transaminazave dha e fosfatazës alkaline, si edhe shfaqja e icerit;
- janë konstatuar reaksione paradoksale, si: eksitim i menjëershëm, ankth, çregullime tē gjumit dha halucione; kur shfaqen këto reaksione, mjekimi me diazepam duhet ndërprerë menjëherë;
- eksitim, dridhje, dha në raste tō rralla konvulsione nga ndërprerja e menjëershëm e mjekimit sepse pas një përdorimi pér një kohë tē gjatë, mund tē shkaktojë fuqizim tē simptomave që kontrollohen prej tij edhe pse varësia e mundshme fizike ndaj diazepamit në tē sémurët që marrin dozat e rekomanuara është shumë e vogël (në këto raste këshillohet ulja shkallë-shkallë e dozës);
- pas injektit tē shpejtë në venë mund tē ndodhë trombozë e venave, flebit, irritim lokal, tē vjella dha më rrallë ndryshime vaskulare.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë tē përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

### 5. SI TA RUANI DIAZEPAM

Mbajtjen larg fëmijëve.

Mos e përdorni Diazepam pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C.

Ruajeni në paketimin original pér ta mbrojtur nga drita.

### 6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Diazepam

Lënda vepruese është diazepam.

Çdo tabletë përbën 5 mg diazepam.

Përbësirët e tjérë janë: laktöz, celulozë mikrokristalore, talk, stearat magnezi.

Çdo ampolë 2 ml përbën 10 mg diazepam (5 mg / ml).

Përbësirët e tjérë janë: propilenglikol, alkool etlik, alkool benzilik, acid klorhidrik (mund tē shtohet pér rregullim pH) dha ujë pér injekzion.

### Përbajtja e paketimit

Tabletat: kuti me 30 tableta.

Tretësira pér injekzion: kuti me 10 ampula 2 ml dha kuti me 100 ampula 2 ml (përdorim spitalor).