

FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

TOPIRAMAT

Tableta tē veshura me film – 25 mg
(Topiramat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se tē filloni

- Ruanjani këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona tē tjerë. Mund t'i dëmtojë atë edhe pse mund tē keni tē njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Topiramat dhe përsë përdoret
- Përparrë se tē merrni Topiramat
- Si tē merrni Topiramat
- Efekte anësore tē mundshme
- Si tē ruani Topiramat
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË TOPIRAMAT DHE PËRSË PËRDORET

- Topiramat përdoret pér tē mjekuar disa lloji krizash tē epilepsisë:
 - kriza tē pjeshtëm (krisat prekin pjesë tē trurit) dhe/ose;
 - kriza tē gjeneralizuar toniko-klonike (këto kriza herë pas here quhen kriza "Grand Mal" dhe prekin tē gjithë trurin; këto kriza kanë një fazë tonike kur pacienti bie pa ndjenja dhë muskujt e tij tendosen papritur dhe një fazë klonike në tē cilën muskujt e pacientit kontraktohen dhe relaksohen shpejt, duke shkaktuar konvulsione).
- Topiramat përdoret i vetëm pér tē mjekuar epilepsinë, në tē rritur dhe adoleshentë mbi moshën 12 vjeç.
- Topiramat përdoret i shqoheruar me barna tē tjerë që mjekojnë epilepsinë në tē rriturit, adoleshentët dhe fëmijët e moshës 6-12 vjeç.
- Topiramat gjithashtu mund tē përdoret dhe pér parandalimin e mërgjnës:
- pér parandalimin e dhimbjeve periodike, tē shpeshta tē kokës që shkaktohen nga migrena, në pacientit e ritrit, kur mjekimet e mëparshme me barna tē tjerë nuk kanë rezultuar tē efektshme. Nuk rekomandohet tē përdoret pér mjekimin e një krize tē vëlme migrene.

2. PËRPARA SE TĒ MERRNI TOPIRAMAT

Mos merrni Topiramat në qoftë se:

- jeni i njëshëm (alerjik) ndaj topiramatit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë tē këtij bari;
- doni tē parandaloni mërgjnët dhe njëkohësisht jeni shtatzënë ose jeni në moshën e riprodhimit dhe nuk përdorni masa kontraceptive tē efektshme duke rritur mundësinë pér tē ngelur shtatzënë.

Tregoni kujdes tē veçantë me Topiramat:

Pysesni mjekun tuaj përparrë se tē merrni Topiramat në qoftë se:

- ju ose ndonjë familjar tjetër i juaj keni ose pasur gurë në vesh (Topiramat mund tē rrissë rezikun e gurëve në veshka; mjeku duhet t'u rekomandojë tē pini më shumë ujë gjatë marrjes së Topiramatit);
- jeni duke bërë hemodializë; në këtë rast doza e barit duhet tē reduktohet;
- keni probleme me veshkat ose mëlinë; në këtë rast mjeku duhet t'u përshkruajë një dozë më të ulët;
- keni pasur mendime pér vëtëvrasje dhe nese në ndonjë moment ju i keni këto mendime, kontaktoni menjëherë mjekun tuaj;
- vuani nga një sëmundje respiratore si astma ose sëmundje kronike obstruktive e mushkërive;
- keni status epileptik (kur truri është në kriza tē vazhdueshme);
- keni diarre;
- s'keni shumë kohë që i jeni nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale;
- ndigni një dijetë tē pasur me yndryna dhe proteina;
- keni vuajt ndonjëherë nga porfiria;
- keni pakësim tē dërsitjes, vëcanërisht tek fëmijët (kjo mund tē shkaktojë rritje tē temperaturës së trupit gjatë ushtrimeve tē ndryshme fizike dhe gjatë ekspozitimit në ambientë të ngrrota; në këtë rast është e nevojshme që tē konsumoni shumë ujë gjatë trajtimit; kjo mund tē reduktojë rishkon e efekteve anësore që shkaktohen nga nxehësia si dhimbje koke dha nauze).

Gjatë marrjes së këtij bari mund tē humbni peshë. Duhet tē flisi me mjekun tuaj dhe gjithashu tē hani më shumë ushqim.

Probleme në sy

Kontaktioni menjëherë mjekun në qoftë se keni njegullim tē shikimit, dhimbje apo skujje tē syve. Këto mund tē jenë shenja pér një rritje tē presionit tē syrit (glaukomë). Kjo mund t'i ndodhë si tē rriturve dhe fëmijëve zakonisht gjatë muajit tē parë tē trajtimit.

Gjithashu kontaktioni menjëherë okulistik ose mjekun tuaj në qoftë se keni ndonjë problem tjetër me sytë.

Marrja e barnave tē tjera

Trajtimi i njëkohshëm me barna tē tjera mund tē ndikojë ose tē ndikohet nga Topiramat. Mos harroni tē informoni mjekun tuaj pér trajtimin me Topiramat në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit. Në veçanti flisi me mjekun tuaj në qoftë se jeni duke marrë ndonjërin prej këtyre barnave:

- barna antiupeptike tē tjera si fenitoin dhe karbamazepinë;
- digoksinë pér insufisjencën kardiakë;
- hidrokortiazid ose triamteren (diuretikë);
- barna pér mjekimin e diabetit si metformin, pioglitazon ose glibenklamid;
- barna pér mjekimin e depresionit si amitriptilinë, imipraminë, moklobemid;
- diazepam (sedativ);
- proguanil (pér tē mjekuar malarien);
- omeprazol (pér mjekimin e ulçerave dhe gjendjeve tē tjera tē shkaktuara nga sekretimi i tepert i acidit klorhidrik në stomak);
- acetazolamidi;
- doza tē larta tē vitaminës C;
- haloperidol (pér sëmundje mendore);
- propranolol (pér tē mjekuar presionin e lartë tē gjakut);
- barna tē cilat tē vënë në gjumë ose tē ulin vigjilencën (këtu përfshirë tankantullët, antidepresivët, dhë gjumësllësit);
- kontraktevët oralë. Mbrojtja juaj me anë tē kontraktevët oralë mund tē jetë më pak e efektshme. Konsultohuni me mjekun tuaj në qoftë se keni ndryshime në ciklin tuaj menstrual.

Marrja e Topiramat me ushqim dhe pije

Tabletat e veshura me film Topiramat mund tē merren me ose pa ushqim. Është e rëndësishme që tabletat tē merren me shumë ujë sidomos kur jeni duke bërë ushtrime fizike ose kur është nxehët.

Duhet tē keni kujdes me sasinë e alkoolit që pini nëse jeni duke marrë Topiramat sepse kombinimi i alkoolit me këtë bar mund tē dëmtojë përqëndrimin tuaj.

Shtatzënia dhe Ushqimi me gji

Kërkoni këshillën e farmacistit ose tē mjekut tuaj në qoftë se mendoni se jeni shtatzënë apo dëshironi tē ngeleni shtatzënë. Mjeku do t'u këshilljo nëse duhet tē vazhdoni tē merrni Topiramat gjatë shtatzënës ose jo.

- Topiramat mund tē rrissë rezikun e problemeve me fëmijën gjatë shtatzënës.
- Flisi me mjekun tuaj në qoftë se jeni duke ushqyer fëmijën me gji. Topiramat mund tē kalojë tē fëmija me anë tē qumështit tē gjirit dhe mjeku juaj mund t'u rekomandojë tē ndërprisni ushqimin me gji.
- Nuk duhet tē përdorni Topiramat nëse jeni në moshë riprodhimi dhe ndërkohë nuk përdorni masa kontrceptive tē efektshme.
- Nuk duhet tē përdorni Topiramat pér parandalimin e krizave tē mërgjnës në qoftë se jeni shtatzënë.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Topiramat mund tē shkaktojë përgjumje, marrje mendsh, turbullime tē shkimit dhe simptoma tē tjera tē lidhura me përdorimin e topiramattit. Nuk duhet tē drejtoni automjetin ose përdorni makineri, në qoftë se vini re ndonjë prej këtyre efekteve.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e Topiramat: Ky bar përbënkan laktoz. Nëse ju është thënë nga mjeku juaj që keni intolerancë nga disa sheqerna, kontaktoni mjekun tuaj përparrë se tē merrni këtë bar.

3. SI TA MERRNI TOPIRAMAT

Gjithmonë merreni Topiramat sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktioni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Topiramat janë shumë të forta ose shumë tē dobëta, flisi me mjekun ose farmacistin tuaj.

Zakonisht doza ditore merret në dy doza tē ndara. Tabletat Topiramat nuk duhen thyer ose përtypur. Tabletat e veshura me film Topiramat duhen tē merren me një gotë ujë tē mbushur plot. Tabletat e veshura me film Topiramat mund tē merren me ose pa ushqim.

Trajtimi i epilepsisë:

Mjekimi me topiramat duhet tē fillojë me një dozë tē ulët, dhe doza duhet tē rritet gradualisht.

- Trajtimi i epilepsisë vetëm me topiramat pér tē rriturit dhe adoleshentët më tē mëdherë se 21 vjeç: doza e zakonshme fillestare është 25 mg topiramat në ditë që merret si një tabletë e vetme në darkë pér një javë. Kjo dozë mund tē rritet nga 25 mg në 50 mg në intervalë prej një javë ose 2 javësh, në mënyrë që tē kontrollohen kritaz e epilepsisë. Doza e zakonshme mbajtëse është 100 mg në ditë (50 mg në mëngjes dhe 50 mg në darkë). Doza maksimale ditore e rekomanduar është 400 mg.

- Trajtimi i epilepsisë me topiramat dhe barna tē tjera antiepileptike: tek tē rriturit dhe adoleshentët më tē mëdherë se 12 vjeç: doza e zakonshme fillestare është 25 mg topiramat në ditë që merret si një tabletë e vetme në darkë pér një javë. Kjo dozë mund tē rritet nga 25 mg në 50 mg në intervalë prej një javë ose 2 javësh, në mënyrë që tē kontrollohen kritaz e epilepsisë. Doza e zakonshme është 200 mg - 400 mg topiramat në ditë, që merren në doza tē ndara. tek fëmijët e moshës 6-12 vjeç: doza duhet tē përcaktohen nga mjeku. Kjo dozë do tē varet nga pesha e fëmijës. Doza mund tē

rritet gradualisht në periudha një-javore ose dy-javore derisa kritat e epilepsisë së femijës tē mbahen nën kontroll.

Parandalimi i mërgjnës:

- Është e rëndësishme tē ndiqni udhëzimet e mjekut tuaj pér përdorimin e Topiramat në parandalimin e dhimbjeve tē kokës tē shkaktuara nga migrena.
 - Mos e përdoni topiramat pér fëmijët dhe adoleshentët pér parandalimin e dhimbjeve së kokës në formë mërgjëse.
- Doza e zakonshme fillestare pér tē rriturit është 25 mg topiramat në ditë që merret si një tabletë e vetme në darkë pér një javë. Doza e zakonshme mbajtëse është 100 mg në ditë në dy doza tē ndara nga 50 mg në mëngjes dhe në darkë.

Përdorimi i topiramat në personalat me probleme tē mëlcisë dhe veshkave:

- Në qoftë se keni sëmundje tē mëlcisë ose veshkave, mjeku do t'u rekomandojë tē merrni doza më tē reduktuarë tē Topiramat sesa dozat e mësippërmë.
- Në qoftë se jeni duke bërë hemodializë mjeku do t'u rekomandojë tē ndiqni një skemë tjetër mjekimi.

Nëse nuk jeni tē sigurt se sa tablettë tē veshura me film Topiramat duhet tē merrni dhe kur duhet t'i merrni, atëherë pyesni mjekun tuaj.

Në qoftë se keni marrë më shumë Topiramat

Në qoftë se keni marrë gabimisht më shumë Topiramat se sasia që duhet tē merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose telefononi urgjencën pér tē marrë një mendim pér rezikun si dhe këshilla tē përvjetor. Veprimet që duhet tē ndërmerrin. Simptomat nga mbidozimi përfshijnë dhimbje koke, përgjumje, çregullim në të folur, shikimi tē turbullët, diplopi, dëmtim tē aktivitetit mendor, letargji, koordinim jonormal, hipotension, dhimbje abdominale, axhitim, marrje mendsh, depresion dhe konvulsioni.

Mbidozimi me topiramat mund tē rezultojë në acidozë tē rëndë metabolike dhe hipokalemji.

Në qoftë se keni harruar tē merrni Topiramat

Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha pér marrjen e zakonshme tē saj. Mos merrni një dozë tē ditës së fishtë (ose më tē lartë) pér tē plotësuar dozën (dozat) e harruar(a).

Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në qoftë se ndërprisni përdorimin e Topiramat

Mos ndërprisni marrjen e këtij bari pa u konsultuar fillimisht me mjekun tuaj. Në qoftë se duhet tē ndërprisni këtë bar, fillimisht duhet tē reduktioni dozën gradualisht pér disa javë duke evitar në këtë mënyrë shfaqjen e krizave tē epilepsisë nga ndërprerja e menjëherëshe.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si tē gjithë barnat e tjera, edhe tabletat e veshura me film Topiramat mund tē shkaktojnë efekte anësore, megjithëse jo çokush i manifeston. Ndjonjëherë ato janë serioze, ndjonjëherë jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve tē mundshme anësore. Mund tē mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Ndërprisni menjëherë marrjen e këtij bari dhe konsultohuni me mjekun tuaj në qoftë se vëreni ndonjë prej efekteve anësore serioze tē mëposhtme:

- enjte tē dvarue, tē këmbëve, tē kyçeve, fytyrës, buzëve, ose fyti që shkaktojnë vështirësi në gjellëtje dhe frysëmarrje. Gjithashu mund tē keni kruarje, skujje dhe acarim tē lëkurës. Në këto raste kur vëreni këto shenja mund tē keni një reaksiqnë alergjik nga bari;
- mund tē ndodhë që tē vëreni zhveshje tē lëkurës në formë pëllakëzash në pjesën rreth buzëve, syve, në gojë, hundë dhe në organe gjenitale. Gjithashu mund tē keni simptomat e nje gripi si edhe tē temperaturë. Këto mund tē janë shenja tē një sëmundjeje serioze tē quajtur sindroma Stevens-Johnson;
- drdhje dhe konvulsioni;
- mendime pér tē lënduar veten apo pér tē bërë vëtëvrasje;
- mund tē keni dëmtimë tē funksionit tē mëlcisë dhe shenjat në këtë rast janë zverdhje e lëkurës dhe pjesës së brendshme tē syve. Ky dëmtim bëhet i dhikshem me anë tē analizave laboratorike;
- mund tē keni probleme me sytë si mijegullim i shikimit, vështirësi në shikimin afër dhe dhimbje tē syrit. Këto mund tē janë shenja tē rritjes së presionit tē syrit (glaukomë me kënd tē ngushtës).

Efekte anësore shumë tē zakonshme (prekin 1 në 10 pacientë):

- hutim, lodhje dhe përgjumje;
- mirëpje ose shpime në lëkurë (parestezi);

diarre, nauze, dhimbje stomaku ose mostretje tē ushqimit;

humbe në peshë, humbe tē oreksit, tharje tē gojës ose ndryshim në shijimjan e gjërvës;

nervozitet, lëkundje humorë ose mund tē keni gjendje depresioni;

probleme me shqiptimin e gjuhës dhe tē folurin;

probleme koordinimi.

Efekte anësore shumë tē zakonshme (prekin 1 në 10 pacientë):

- ndjenja e dobësise;
- dhimbje tē kockave;

vështirësi në frysëmarrje, ngadalësim i rritmit tē zemrës, nauze, konfuzion. Këto shenja janë pasojë e rritjes së aciditetit në gjakun tuaj (acidozë metabolike);

lodhje, këpupje, hutim, ose zbehje në lëkurë. Këto mund tē janë shenja tē një anemie;

- mund tē sëmurenë me shpesh nga infeksione tē ndryshme dhe tē vëreni nxirje apo mavjosje në trupin tuaj. Këto mund tē janë shenja tē problemeve me gjakun si leukopeni, neutropeni ose trombocitopeni;

- mund tē vëreni mungesë ndjeshmëri ose emocionesh ose eufori;

- vështirësi në kontrollin e emociioneve;

- mund tē ndiheni nervoz ose agresiv më shumë se zakonisht;

- reduktimi tē potencës seksuale;