

FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për përdoruesin

KETOFEK

Shurup – 1 mg / 5 ml
(Ketotifen fumarat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpresa se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është pëershkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerrë. Mund t'i dëmtojë atë edhe pse mund t'ë kenë të njëjtat simptoma me ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësitet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Ketofex dhe përsë përdoret
- Përpresa se të merrni Ketofex
- Si ta merrni Ketofex
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Ketofex
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË Ketofex DHE PËRSË PËRDORET

Shurupi Ketofex është një bar i cili përdoret për parandalimin dhe trajtimin e simptomave alergjike.

Ai indikohet në:

- trajtimi e simptomave në rrufë alergjike dhe në sëmundje alergjike të lëkureve, kur trajtimi me antihistaminikë orale (antihistaminikë shkaktorë përgjumje) si dhe përdorimi lokal i antihistaminikëve dhe glukokortikoidëve (preparate kortizonike) nuk është i përshtatshëm;
- parandalimi afatgjatë të simptomave astmatike në kombinim me antiinflamatorë të tjerë tek pacientë me ankesa të tipit alergjik në më shumë se një organ (p.sh. astëm bronkiale alergjike dhe alergji nga bari).

Udhëzim:

Shurupi Ketofex nuk është i përshtatshëm për trajtimin e atakeve akute të astmës.

Nuk rekomandohet trajtimi i astmës bronkiale vetëm me shurup Ketofex.

Terapija e astmës së rëndë duhet bërë gradualisht që t'ë ketë sukses.

Terapija duhet t'ë jetë e provuar nga kërkime të vazhdueshme mjekësore. Mjekët vlerësojnë se në ecurinë e sëmundjes si dhe në suksesin e trajmitit është i rëndësishëm një vetëkontroll i përditshëm.

Nëse edhe pas ndiqjes së një trajtimi korrekt nuk ka pëmërisëm, mjeku duhet t'ë rivlerësojë terapinë.

2. PËRPARA SE TË MERRNI Ketofex

Mos merrni Ketofex:

- në qoftë se jeni i ndjeshtë (alergjik) ndaj ketotifenit, metil - 4 – hidroksibenzoatit, propil – 4 – hidroksibenzoatit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit;
- në qoftë se vuani nga epilepsia;
- në qoftë se trajtoheni me antidiabetikë orale;
- në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjën me gji.

Tregoni kujdes gjatë përdorimit të Ketofex

Ketotifeni nuk është i përshtatshëm për trajtimin e atakeve akute të astmës.

Antiastattatikët me veprim simptomatik dhe parandalues, të cilët pacienti mund t'ë jetë duke i marrë, nuk duhet të ndërpriten në mënyrë të menjëherësime nësë do fillohet një trajtim afatgjatë me shurupin Ketofex. Kjo vlen më shumë për kortikosteroidët sistemicë për shkak të ekzistencës së mundshme të një insuficencë të gjendrës mbiveshkore tek pacientët e varur nga steroidet; në raste të tilla, kthimi në normalitet i veprimrit hipofizë – mbiveshkore në një situatë stresi, mund t'ë zgjasë deri në një vit.

Tek pacientët që marrin antidiabetikë orale njëkohësisht me shurupin Ketofex mund t'ë shfaqet trombocitopeni, ndaj përdorimi i njëkohshëm i tyre duhet shmhanguar.

Gjatë terapisë me shurupin Ketofex shumë rrallë mund t'ë shfaqen konvulsione.

Duke qenë se shurupi Ketofex mund t'ë ulë pragun e konvulsioneve, ai duhet përdorur me shumë kujdes tek pacientët që kanë histori epilepsie.

Tek diabetikët duhet t'ë merret parasysh përbajtja në karbohidrate e shurupit (5 ml = 2,76 g karbohidrate).

Në rast se ndodh reduktim i vëmendjes për shkak të veprimit qetësues të shurupit Ketofex, doza duhet reduktuar.

Fëmijët

Tek foshnjet dhe fëmijët e vegjël duhet menduar mundësia e një intolerance të trashëguar, të panjohur deri tanë, ndaj sorbitolit dhe fruktozës.

Marrja e barnave të tjera

Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë / përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë.

Shurupi Ketofex mund t'ë risë veprimin e: depresantë të sistemit nervor gjendor, antihistaminikëve, antiokagulantëve dhe të alkoolit. Përdorimi i njëkohshëm i Ketofex dhe antidiabetikëve orale duhet të shmanget.

Ketotifeni rrët veprimin e bronkodilatatorëve, kështu që shpeshtësia e marjes së tyre ndërkokë që përdorini Ketofex, duhet t'ë ulet. Ju lutemi yini re se këto informacione mund t'ë vlefshë edhe nëse përdorimi i barnave është për një kohë të shkurtër. Ketotifeni nuk është i lializueshëm.

Marrja e Ketofex me ushqime dhe pijë

Ketofex theksion veprimin e alkoolit, kështu që gjatë marjes së tij nuk duhet t'ë konsumoni alkool.

Shtatzënia dhe ushqimi me gjë

Shtatzënia

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpresa se të merrni këtë bar. Megjithëse ketotifeni nuk ka treguar ndikim në shtatzëni si dhe në periuftëshen perë – dhe postnatale në studimet në kafshë, siguria e tij në njëzër nuk është prouvuar. Kështu që shurupi Ketofex mund t'ë përdoret në shtatzani vetëm në raste të domosdoshme.

Ushqimi me gjë

Ketotifeni kalon në qumështin e gjirrit tek minjëtë. Mund t'ë pranohet që ai kalon edhe në qumështin e gjirrit tek njëzërit, prandaj nënat që marrin Ketofex, nuk duhet t'ë ushqejnë fëmijën me gjë.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Gjatë ditëve të para të mjekimit me ketotifenit mund t'ë ndiheni të dobët. Ju mund t'ë jeni të përgjumur dhe më t'ë ngathtë se zakonisht. Nuk duhet t'ë drejtoni automjetin ose t'ë punoni me makineri deri sa të zgjasin këto efekte anësore.

Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Ketofex

Ky bar përbënban sorbitol. Ju lutemi t'ë përdorni Ketofex vetëm pasi t'ë keni biseduar më mjekun nëse ju vuani apo jo nga ndonjë intolerancë ndaj shqernave.

Udhëzim për diabetikët: 1 lugë shurup Ketofex përbëmban 2,65 g sorbitol (burim për 0,66 g fruktozë). Sorbitoli mund t'ë ketë një veprim të lehtë laksativ.

Metil – 4 – hidroksibenzoati dhe propil – 4 – hidroksibenzoati mund t'ë shkaktojnë reaksiione mbindjeshmërie dhe reaksiione të vonuara. Ky bar përbënban 2,4 vol.-% alkool.

3. SI TA MERRNI Ketofex

Përdoren shurupin Ketofex gjithmonë sipas udhëzimeve të mjekut. Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj nëse janë të pasigurtë për dozën që duhet t'ë merrni dhe kur duhet t'ë merrni atë.

Nëse nuk përshtruhet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:

- fëmijët e vegjël nga 6 muajsh – 3 vjeç; në mëngjes dhe në darkë nga 2,5 ml shurup (ekuivalent me ½ mg ketotifen);
- të rritur, të rintjetë dhe fëmijët mbi 3 vjeç; gjatë 3 – 4 ditëve të para të trajtimit, 5 ml në darkë (ekuivalent me 1 mg ketotifen), më pak nga 5 ml në mëngjes dhe në darkë.

Nëse është i domosdoshme, teli t'ë rritur dhe fëmijët mbi 10 vjeç, doza maksimale mund t'ë rritet deri në 10 ml shurup (ekuivalent me 2 mg ketotifen) në mëngjes dhe në darkë.

Doza maksimale ditorë është 20 ml shurup (ekuivalent me 4 mg ketotifen).

Barnat që përbënjanë alkool nuk rekandohen për pacientët me démtimë të mëlqisë.

Mënyra e përdorimit

Merrni shurupin Ketofex të paholluar ose me pak lëng (p.sh. çaj ose lëng frutash).

Kohëzgjatja e përdorimit

Gjithmonë merrni shurupin Ketofex sipas udhëzimeve të mjekut. Duke qenë se efekti i plotë shfaqet pas 8 – 12 javësh, duhet që trajtimi t'ë zgjasë. Kjo kohë duhet respektuar edhe nëse filloni të ndiheni më mirë.

Ju lutemi t'ë njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse keni përshtypjen se efekti i Ketofex është shumë i fortë ose shumë i dobët.

Në qoftë se keni marrë më shumë Ketofex

Symptomat kryesore të një mbidozimi akut janë: përgjumje deri në qetësim të thellë, marje mendsh, humit dhe humje e orientimit; takikardi dhe hipotonji; irritim i theksuar ose qetësues të shurupit Ketofex, doza duhet reduktuar.

spazma kryesish tek fëmijët; koma reversibile. Trajtimi duhet t'ë jetë simptomatik. Nëse bari është marrë para një kohe të shkurtër, mund t'ë bëhet lavazh gastrik. Përdorimi i karbonit mjekësor mund t'ë ndihmojë. Nëse është e nevojshme, bëhet trajtim simptomatik dhe mbahet nën vëzhgim funksioni kardiovaskular. Në rast irritimi ose spazmash mund t'ë përdoren barbiturate ose benzodiazepina veprim t'ë shkurtër. Ketotifeni nuk është i lializueshëm.

Në qoftë se keni haruar të merrni Ketofex

Mos merrni një dozë të dyfishtë për të zëvendësuar një dozë të haruar, por vazhdoni trajtimin me dozën që ju është përcaktuar në kohën e duhur.

Nëse ndërprisni trajtimin me Ketofex

Mos ndaloni trajtimin me Ketofex pa u këshilluar me mjekun. Ndërprerja e mjekimit duhet t'ë bëhet në mënyrë graduale gjatë 2 – 4 javëve, përndryshe ankesat fillëstare mund t'ë rishqafen.

Ju lutemi t'ë flisni me mjekun tuaj nëse p.sh. për shkak të shfaqjes së efekteve anësore, e ndërprisni ose e përfundoni para kohe trajtimin me Ketofex.

Nëse keni pyetje të tjera mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si t'ë gjitha barnat e tjera, Ketofex mund t'ë shkaktojë efekte anësore, edhe se jo çdokush i shfaqat o. Për vlerësimin e efekteve anësore do përdoren treguesit e mëposhtëm të shpeshtësisë:

Shumë të shpeshta:	më shumë se 1 pacient ndër 10
Të shpeshta:	1 deri në 10 pacientë ndër 100
Me raste:	1 deri në 10 pacientë ndër 1,000
Të rralla:	1 deri në 10 pacientë ndër 10,000
Shumi të rralla:	më pak se 1 pacient ndër 10,000
Të panjohura:	nuk mund t'ë vlerësohen

Efekte të mundshme

Efektet anësore (Vështirim i përgjithshëm 1) janë renditur sipas shpeshtësisë, më të shpeshtat janë të parat. Brenda çdo grupi shpeshtësie, efektet anësore janë renditur sipas ashpersisë në rend zbritës.

Vështrim i përgjithshëm 1:

Infeksione dhe sëmundje parazitare

Me raste: cistit.

Efekte në sistemini imun

Shumë të rralla: eritema multiforme, sindroma Stevens – Xhonson, reaksiione të rënda në lëkurë.

Të panjohura: metil – 4 – hidroksibenzoati dhe propil – 4 – hidroksibenzoati mund t'ë shkaktojnë reaksiione mbindjeshmërie si dhe reaksiione të vonuara.

Efekte në metabolizëm dhe ushqyerje:

Të rralla: shtim në peshë.

Efekte në psikikë:

Të shpeshta: irritim, nervozizëm, pagjumësi.

Efekte në sistemini nervor:

Me raste: marje mendsh

Të rralla: lodhje.

Efekte në traktin gastrointestinal:

Me raste: tharje goje.

Sëmundje të mëlqisë dhe të fshikëzës së tëmthit:

Shumë të rralla: hepatit, vlera t'ë rritura t'ë enzimave të mëlqisë.

Pagjumësia dhet lodhje, si dhe tharja e gojës dhet marramendja mund t'ë shfaqen në fillim t'ë trajtimit, por zhduken vetveti me vazhdimin e tij.

Janë raportuar edhe të përziera, të vjella, dhimbje koke, spazma, urtikarie dhe rash.

Symptomat e stimulimit të Sistemit Nervor Qendror, si: mungesa e qëtësise, konfuzioni, shqetësimet e gjumit dhe nervozizmi vihen re më shumë tek fëmijët.

Ju lutemi t'ë informoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ndonjë prej efekteve anësore të lartpërmendura ju shqetëson ose nëse vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues.

Udhëzime të veçanta

Nëse shfaqen shenjat e para të një reaksiioni mbindjeshmërie, shurupi Ket