

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

Prostacure

Kapsula të forta me çlirim të zgjatur - 0.4 mg
(Tamsulozin klorhidrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyjetë të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjera. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoset ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Çfarë përbën ky fletëudhëzues:

- Çfarë është Prostacure dhe përsë përdoret
- Çfarë duhet të dini përparrë se të përdorni Prostacure
- Si ta përdorni Prostacure
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Prostacure
- Përbajtja e paketimit dhe informacione të mëtejshme

1. Çfarë është Prostacure dhe përsë përdoret

Prostacure përdoret në trajtimin e simptomave funksionale të hiperplazisë beninje të prostatës, të tillë si vështirësia në urinim.

Lënda vepruese e Prostacure është tamsulozin. Tamsulozina është një bllokues i receptorëve alfa1, që redukton tensionin në muskujt e prostatës dhe uretrës. Në këtë mënyrë mundësoset një rrjedhje e lehtë e urinës përmes uretrës dhe lehtësoset urinimi.

2. Çfarë duhet të dini përparrë se të merrni Prostacure

Mos merrni Prostacure

- në qoftë se jeni alergjik nga tamsulozina apo nga ndonjëri prej përbërësve të tjera të barit (të renditur në pikën 6)
- në qoftë se vuani nga hipotensioni ortostatik
- në qoftë se vuani nga një insuficiencë e rëndë hepatike.

Përkujdesjet gjatë përdorimit

Konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj përparrë se të merrni Prostacure

- në qoftë se vuani nga hipotensioni ortostatik (marrje mendsh e shkaktuar nga rënia e presionit të gjakut, kur uleni ose ngriheni në këmbë)

- në qoftë se merrni të tjera bllokues të receptorëve alfa1
- në qoftë se vuani nga një insuficiencë e rëndë renale.

Nëse jeni duke ju nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale në sy për shkak të kataraktit (turbullim i shikimit), ju lutemi të informoni mjekun tuaj specialist të syve para operacionit, që ju jeni duke përdorur ose keni përdorur më përparrë Prostacure. Prostacure mund të shkaktojë komplikime gjatë operacionit, të cilat mund të menaxhohen në qoftë se specialisti juaj është e përgatitur paraprakisht.

Marrja e Prostacure me ushqim dhe pijë

Prostacure duhet të merret pasi të hani mëngjesin ose pas vaktit të parë të ditës, me një gotë ujë.

Shtatzënia, ushqimi me gjë dhe fertiliteti

Prostacure përdoret vetëm në pacientët meshkuj.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nuk ka të dhëna të vlefshme nëse tamsulozina ndikon negativisht në aftësinë për të drejtuar automjetin ose për të përdorur makineri. Megjithatë, pacientët duhet të jenë në dijeni të faktit se Prostacure mund të shkaktojë marrje mendsh.

Barnat e tjera dhe Prostacure

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni duke marrë / përdorur ose keni marrë / përdorur kohë e fundit ose do të merrni / përdorni ndonjë bar tjetër. Përdorimi i njëkohshëm i tamsulozinës me të tjera bllokues të receptorëve alfa1 (prazosinë, alfuzosinë), mund të shkaktojë hipotension.

3. Si ta përdorni Prostacure

Gjithmonë ky bar përdoret ekzaktësisht si ju thotë mjeku juaj. Kësilllohu mi me mjekun ose farmacistin tuaj nëse nuk jeni të sigurt. Doza e rekomanduar është një kapsulë në ditë. Prostacure duhet të merret pasi të hani mëngjesin ose pas vaktit të parë të ditës, me një gotë ujë. Kapsula duhet të gëllitet e tëra, ndërkohe që jeni ulur ose në këmbë (jo në pozicionin e shtrirë). Kapsula nuk duhet përtypur pasi kjo do të ndërhyjë në çlirimin e modifikuar të lëndës vepruese.

Nëse keni përshtypjen se efekti i Prostacure është shumë i fortë ose shumë i dobët, konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Në qoftë se keni marrë më shumë Prostacure sesa duhet

Në qoftë se keni marrë më shumë Prostacure sesa ju përshkruan mjeku, kontaktoni mjekun tuaj ose spitalin.

Në qoftë se keni harruar të merrni Prostacure

Në qoftë se keni harruar ta merrni barin pasi keni ngrënë mengjesin, mund ta merrni më vonë në të njëjtën ditë. Në qoftë se harroni një dozë, merreni dozën në ditën në vijim.

4. Efekte anësore të mundshme

Si të gjithë barnat e tjera, Prostacure mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Gjatë përdorimit të tamsulozinës janë raportuar efektet e mëposhtme anësore:

Të zakonshme: mund të ndikojë në më pak se 1 në 10 njerëz

Marrje mendsh, çregullime të ejakulimit.

Të pazakonta: mund të ndikojë në më pak se 1 në 100 njerëz

Dhimbje koke, palpitacione, marrje mendsh sidomos kur ulesh poshtë ose ngrihesh në këmbë nga pozicioni i shtrirë, rinit, çregullime gastro-intestinale (konstipacion, diarre, nauze, të vjella), reaksione alergjike (skuqje të lëkurës, prurit, urtikarie), dobësi.

Të rralla: mund të ndikojë në më pak se 1 në 1.000 njerëz

Të fikët, angioedemë.

Shumë të rralla: mund të ndikojë në më pak se 1 në 10.000 njerëz

Sindromi Stevens-Johnson, priapizëm (erekcion i vazhdueshëm dhe i dhimbshëm).

Të panjohura: Frekuencia nuk mund të vlerësohet nga të dhënat e disponueshme
Çregullime të rrahjeve të zemrës (fibrilacion atrial, aritmji), rritje të rrahjeve të zemrës (takikardi), marrje fryme (dispne).

Nëse ju shfaqet ndonjë efekt anësor, njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj, përfshirë edhe ndonjë efekt anësor tjetër që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.

5. Si ta ruani Prostacure

Ruajeni barin larg fëmijëve.

Ruajeni në paketimin origjinal.

Mos e ruani mbi 30°C.

Mos e përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në blister dhe në kuti pas "Skad".

6. Përbajtja e paketimit dhe informacione të mëtejshme

Çfarë përbën Prostacure

- Lënda vepruese është tamsulozin klorhidrat. Çdo kapsulë me çlirim të zgjatur përbën 0.4 mg tamsulozin klorhidrat.

Përbësít e tjera janë

- Përbajtja e kapsulës: algjinat natriumi, kopolimer (1:1) acid metakrilik – etil akrilat, glicerinë dibenat, maltodekstrinë, laurisulfat natriumi, makrogol 6000, polisorbat 80, hidroksid natriumi, emulsioni i simetikonit (simetikon, metilcelulozë, acid sorbik), dioksid silici koloidal.

- Përbëja e kapsulës: xhelatinë, oksid hekuri i kuq (E172), dioksid titani (E171), oksid hekuri i verdhë (E172).

Përbajtja e paketimit

Prostacure disponohet në blistera, në kuti me nga 20 dhe 30 kapsula.

Mbajtësi i Autorizimit për Tregtim dhe Prodhuersi:



PROFARMA Sh.a.
Ruga "Myslym Keta"
Tel. Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPERI

Ky fletëudhëzues u rishikuva për herë të fundit në Gusht 2014.

