

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

VITAMINE B1

Tableta - 10 mg
Tretësirë pér injekzion – 50 mg / 1 ml
(Tiaminë klorhidrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues pérpara se t'i filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund t'ë keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar eshtë përshtkuar pér ju. Mos e jepni tek persona t'ë tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund t'ë keni t'ë njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë eshtë Vitamine B1 dhe përsë përdoret
- Përpresa se t'i merrni Vitamine B1
- Si ta merrni Vitamine B1
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Vitamine B1
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ESHTË VITAMINE B1 DHE PËRSE PËRDORET

Vitamine B1 (tiaminë klorhidrat) bën pjesë në grupin e vitaminave të tretshme në ujë, ndonëse disa rjedhës t'ë saj kanë një farë lipofilicitati.

Funksionet themelore të tiaminës klorhidrat janë: metabolismi i karbohidrateve, zhvillimi normal i organizmit, përcimi i impulseve nervore dhe sinteza e acetilkolinës. Tiamina eshtë thelbësore pér metabolismin aerob normal. Ajo kombinohet me adenozin trifosfatin (ATP) në prani të enzimës tiamin-ëpifosfatinazë, duke dhënë tiamin-ëpifosfatin, një koenzimë e rëndësishme që njihet edhe me emrin kokarboksilat.

Tiamin-ëpifosfatit eshtë forma vepruese e tiaminës dhe që vepron si koenzimë në metabolismin e karbohidrateve, ku bën çkarboksilimin e α -ketoacideve (si p.sh. acidi piruvik) dhe të α -ketoglutarateve.

Pamjaftueshmëria e tiaminës shfaqet kur marra e saj nëpërmjet ushqimit eshtë e papërshtatshme.

Pamjaftueshmëria e rëndë shkaktan sëmundjen e berberit, e cilës karakterizohet me çregullime gastrointestinale dhe neuropatit periferike.

Vitamine B1 tableta dhe tretësirë pér injekzion përdoren në situatat e mëposhtme klinike:

- profilaksi ose mjekimi i pamjaftueshmërisë së tiaminës (beri-beri)
- profilaksi e sindromit Wernicke-Korsakoff
- mjekimi i kolitit ulçerozi, i diarresë kronike, i sindromit cerebral, i polineuritit, nxitëse e oreksit.

Përdorimi i injekzionit indikohet kur marrja nga goja eshtë e pamundur ose nuk këshillohet.

2. PËRPARA SE TË MERRNI VITAMINE B1

Mos merrni Vitamine B1 në qoftë se keni mbindjeshmëri t'ë njohur ndaj këtij bari (tiaminës klorhidrat) ose ndaj përbërësve të tjerë të tabletës ose tretësirës pér injekzion.

Tregoni kujdes të veçantë me Vitamine B1

Duhet treguar kujdes pér shfaqjen e reaksioneve të mbindjeshmërisë. Në rastin e marjes së Vitamine B1 në formë tërë, ky fenomen eshtë i rrallë, ndërsa kur përdoret nërugë parenterale (muskul ose venë), atëherë këshillohet që t'ë bëhet prova intradermale. Janë konstatuar raste vdekejje nga injektimi në venë i injekzioneve të vitaminës B1.

Marrja e barnave të tjerë

Trajtimi i njëkohshëm me barna t'ë tjerë mund t'ë ndikohet ose t'ë ndikohet nga Vitamine B1. Ju lutemi t'ë kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna t'ë tjerë, përfshirë ato t'ë marrë pa recetë. Mos harroni t'ë informoni mjekun tuaj pér trajtimin me Vitamine B1 në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.

Eshtë veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj t'ë jetë në dijeni t'ë faktit që ju jeni trajtuar me:

- blokues neuromuskularë se pëse vitamina B1 mund t'ë rrissë efektin e tyre. Rëndësia klinike e këtij fenomeni mbetet e panjohur.
- antiacide se pëse pengojnë përrithithjen e vitaminës B1.

Marrja e Vitamine B1 me ushqim dhe pije

Shkalla e përrithithjes së tabletave Vitamine B1 ndikohet nga marja e njëkohshme e ushqimeve.

Shtatzënia

Kategoria C.
Nëse jeni shtatzënë, këshillouni me mjekun përpresa se t'i merrni këtë bar.

Nuk rekomandohet përdorimi i Vitamine B1 gjatë shtatzënisë në doza më të larta se ato t'ë rekomanuara të marjeas me anë të dietës, përvèç rastit kur përfitimi tejkalon riskun potencial.

Gjatë shtatzënisë, nevojat pér vitaminën B1 janë t'ë ritura, por pavarësisht kësaj, sasia e marrë me dietë zakonisht eshtë e mjaftueshme.

Ushqimi me gji

Përqëndrimi i Vitamine B1 (tiaminës klorhidrat) në qumështin e gjirit nuk ndikon në mënyrë domethënëse tek fëmija. Mendohet se përdorimi i saj eshtë i pajtueshëm me gjidhënen.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nuk ka t'ë dhëna se Vitamine B1 ndikon në aftësinë pér t'ë drejtuar automjetin apo pér t'ë përdorur makineri.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e tabletave Vitamine B1

Tabletat Vitamine B1 përmblajnë laktozë. Në qoftë se keni intolerancë ndaj disa sheqernave, flisni me mjekun tuaj përpresa se t'i merrni këtë bar.

3. SI TA MERRNI VITAMINE B1

Gjithmonë merrini tabletat ose tretësirën pér injekzion Vitamine B1 vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se ndjeni që efektet e Vitamine B1 janë shumë të fortë ose shumë t'ë dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Tabletat merren nga goja

Të ritritur: 10 - 20 mg, 1 - 2 herë në ditë.

Fëmijët deri në 1 vjeç: 5 mg në ditë.

Fëmijët 2 - 6 vjeç: 10 mg në ditë.

Fëmijët 7 - 12 vjeç: 20 mg në ditë.

Tretësira pér injekzion administrohet nën lëkurë, në muskul ose intravene.

Të ritritur: 50 - 100 mg në ditë.

Fëmijët deri në 1 vjeç: 2.5 - 5 mg në ditë.

Fëmijët 2 - 6 vjeç: 5 - 10 mg në ditë.

Fëmijët 7 - 12 vjeç: 12.5 - 25 mg në ditë.

Në qoftë se keni marrë më shumë Vitamine B1

Në qoftë se keni marrë më shumë Vitamine B1 se sasia që duhet t'ë merrnit, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimish këtë bar, ju lutemi t'ë kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose t'ë telefononi urgjencën pér t'ë marrë një mendim pér rezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet t'ë ndërmerrin.

Në qoftë se keni harruar t'ë merrni Vitamine B1

Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur t'ë jetë koha pér marrjen e zakonshme të saj.

Mos merrni një dozë t'ë dyfishtë (ose më t'ë lartë) pér t'ë plotësuar dozën (dozat) e harruar(a).

Nëse keni pyetje të mëtejshme pér këtë produkt, pyesni mjekun ose farmacistin.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si t'ë gjithë bartat e tjera, Vitamine B1 mund t'ë shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Ndonjëherë ato janë serioze, ndonjëherë jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund t'ë mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Ndonjëherë janë konstatuar t'ë përziera, hemorragji në aparatin tretës, edemë pulmonare, cianozë, edemë angioneurotike, t'ë kraujtura, urtikarie, ndjesi ngrëntësie, djerzitje, dobësi, hipotension dhe kolaps kardiovaskular. Këto dukuri zhdukën me uljen e dozës ose me ndërprerjen e mjekimit me Vitamine B1 (tiaminë klorhidrat).

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore pérkeqësitet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI VITAMINE B1

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos e përdorni Vitamine B1 pas datës së skadencës, e cilës eshtë e shënuar në paketim.

Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!

Ruajeni në paketimin original pér ta mbrojtur nga drita!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Lënda vepruese eshtë tiaminë klorhidrat.

Çfarë përbën Vitamine B1 – tabletë

Çdo tabletë përbën 10 mg tiaminë klorhidrat. Përbërësit e tjerë janë: laktozë, celulozë mikrokristalore, acid tartrik, talk, stearat magnezi, glikolat natriumi i amidonit.

Çfarë përbën Vitamine B1 - tretësirë pér injekzion

Çdo ampulë 1 ml përbën 50 mg tiaminë klorhidrat.

Përbërësit e tjerë janë: hidrogenfosfat natriumi, dihidrogenfosfat natriumi, tioure, acid klorhidrik mund të shtohet pér rregullim pH, ujë pér injekzion.

Përbajtja e paketimit

Tabletat: kuti me 60 tableta.

Tretësira pér injekzion: kuti me 10 ampula, kuti me 100 ampula (përdorim spitalor).

Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:



Mund t'ë merret pa recetë e mjekut.



Sipas recetës së mjekut.



Përbajtja.



Tretësirë pér injekzion.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u formula është përhershëm në Qershor 2015.