

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

VEPROL

TABLETA TË VESHURA ME FILM 40 mg, 80 mg (Verapamil Klorhidrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpëra se të filloni përdorimin e barit.

- Ruanjet këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerrë. Mund t'i dëmtojë atë edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoset ose në qoftë se vëreni ndonjë përfekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Veprol dhe përsë përdoret
- Përpëra se të mermi Veprol
- Si ta mermi Veprol
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Veprol
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË VEPROL DHE PËRSË PËRDORET

Veprol përbën si lëndë aktive verapamil klorhidrat. Verapamili është një blllokues i kanaleve të kalçiumit. Mekanizmi i veprimit konsiston në frenimin e hyrjes së kalçiumit në qelizë. Qelizat kryesore ku verpon verapamili janë: qelizat e muskulaturës së lëmuar të enës të gjakut, qelizat e miokardit, qelizat e nyjes atrioventrikulare dhe nyjes sinoatriale. Efekti kalçiblokues shprehet me dilatacion dhe veprim antispastik në arteriet koronare, në arteriet dhe arteriolat periferike. Verapamili shkakton zvogëlim të përgueshmërisë atrioventrikulare, zvogëlim të frekuencës kardiakë dhe ulje të forcës tukurëse në zemër.

Veprol përdoret në trajtimin e:

- aritmive supraventrikulare;
- angina pektoris;
- hipertensionit;

2. PËRPARA SE TË MERRNI VEPROL

Mos mermi Veprol në qoftë se keni:

- mbindjeshmëri ndaj verapamilit apo ndonjërit prej përbërsve të tjera (eksipientëve) të Veprol;
- hipotension, bradikardi, shkallën e dytë ose të tretë të bllikut atrioventrikular, sindromë të sinusit të sëmurë, shok kardiogen, bllok sinoatrial;
- të dhëna pér insuficiencë kardiakë ose dëmtim të theksuar funksionit të ventrikut të majtë, madje edhe kur ai kontrollohet nga një terapi;
- flater atrial ose fibrillacion të shqëruar me rrugë aksesore të përcimit (p.sh. sindromi Wolff-Parkinson-White);
- porfini akute.

Tregoni kujdes të veçantë me Veprol

Pyesni mjekun tuaj përpëra se të mermi Veprol. Veprol duhet të përdoret me kujdes në shkallën e parë të bllikut atrioventrikular, fazën akute të infarktit të miokardit dhe në pacientët që marrin beta-blllokues (mund të përdoret vetëm në rastet kur funksioni i miokardit ruhet mirë).

Përdorimi i Veprol duhet të shmanget gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë, përvèç rasteve kur përdorimi i tij është shumë i domosdoshëm. Ndërprerja e menjëhershme e këtij bari mund të shoqërohet me përkëqësim të anginës.

Dozimi me Veprol duhet të reduktohet në pacientët me dëmtime hepatike.

Duhet të shmangni marrjen e Veprol në të njëjtën kohë me lëngun e grejpfrutit.

Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë, keni marrë së fundmi ose mund të mermi barna të tjera, përfshirë ato të marrë pa recetë. Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u trajtuar me:

- anestezikë të përgjithshëm sepse fuqizojnë efektin hipotensiv të verapamilit;
- amiodaron, disopiramid ose flekainid, dronedaron (antiaritmikë);
- klaritromicin, eritromicin, rifampicin (antibiotikë);

- dabigatran eteksilat (antikoagulant);
- frenues të monoaminosidazës (MAOI), buspiron, litium, lule basani, triciklikë (barna kundër depresionit, ankhit dhe psikozave);
- karbamazepin, fenitojin, primidon (antiepileptikë);
- atazanavir (antiviral);
- midazolam (hipnotik);
- barbiturate sepse ulin efektin e verapamilit;
- beta-blllokues sepse rrisin rezikun pér asistol, hipotension të rendë dhe insuficiencë kardiakë;
- digoksinë (glikozid kardiak);
- kolkicinë (bar që përdoret pér trajtimin e gutës), sepse verapamili mund t'risë riscunk pér tokscitit nga kolkicina; shmangni përdorimin e njëkohshëm në insuficiencën hepatike ose renale;
- eplerenon (diuretic);
- duasterid (antagonist hormonal);
- ciklosporin, everolimus, sirolimus dhe takrolimus (imunosupresorë);
- ivabradinë sepse verapamili rrit përqëndrimin plazmatik të saj; shmangni përdorimin e njëkohshëm të tyre;
- simvastatin (bar që ul nivelin e kolesterolit në gjak);
- teofilinë (bar që përdoret në astmë).

Marrja e Veprol me ushqim dhe pije

Nuk duhet të konsumoni lëngun e grejpfrutit gjatë kohës që jeni duke marrë Veprol, sepse rritet përqëndrimi i verapamilit në gjak.

Nuk kësillohet konsumimi i alkoolit gjatë kohës që jeni duke marrë Veprol duke qenë se verapamili rrit përqëndrimin e alkoolit në gjak.

Shtatzënia

Nëse jeni shtatzënë, mendoni se mund të jeni shtatzënë ose planifikoni të mbeteni, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj pér këshilla përpëra se të mermi këtë bar.

Përdorimi i Veprol gjatë shtatzënisë mund të ulë fluskin e gjakut në mitë duke shkaktuar hipoksi të fetusit. Ai duhet të shmanget gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë, përvèç rasteve kur përdorimi i tij është shumë i domosdoshëm. Veprol gjithashtu frenon lindjen.

Ushqimi me gji

Nëse ushqeni fëmijën me gji, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj pér këshilla përpëra se të mermi këtë bar.

Disa studime kanë treguar se sasia e verapamilit që kalon në qumështin e gjirit është shumë e vogël pér të qenë e dëmshme. Megjithatë, verapamili nuk rekombinohet të përdoret gjatë ushqimit me gji, përvèç rasteve kur mjeku e konsideron të nevojshëm përdorimin e tij.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Veprol mund të shkaktojë marrje mendsh, lodhje, përgjumje dhe çregullime të ekilibrit, duke ndikuar në këtë mënyrë aftësinë pér të drejtuar automjetin ose përdorur makineritë. Rekomandohet të shmanget përdorimi i Veprol gjatë drejtimit të automjetit ose përdorimit të makinerive, veçanërisht kur keni konsumuar alkool, sepse verapamili rrit nivelin e alkoolit në gjak duke theksuar efektet e tij.

3. SI TA MERRNI VEPROL

Gjithmonë Veprol merret ekzaktësisht siç ju thotë mjeku juaj. Duhet të konsultoheni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni i sigurt.

Të rriturit

Aritmitë supraventrikulare: 40 – 120 mg, 3 herë në ditë.

Angina pektoris: 80 – 120 mg, 3 herë në ditë.

Hypertension: 240 – 480 mg në ditë, në 2 – 3 doza të ndara.

Në qoftë se keni marrë më shumë Veprol

Në qoftë se keni marrë më shumë Veprol se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se fëmijët e kanë arritur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën pér të marrë një mendim pér prezikun dhe këshilla pér veprimet që duhet të ndërmerrin.

Mbidozimi me verapamili shkakton simptoma të cilat janë kryesisht zgjatja e efekteve anësore të zakonshme, të tillë si: hipotension, bradikardi, bllok atrioventrikular ose asistol dhe rastë fatale.

Trajtimi: Të gjitha mbidozimet nga verapamili duhet të konsiderohen serioze si dhe pacientët duhet të jenë nën vëzhgim pér të paktën 48 orë në ambientet spitalore. Rekomandohet lavazhi i stomakut dhe administrimi intravenoz i lëngjeve. Verapamili nuk mund të eliminohet me dializë.

Në qoftë se keni haruar të mermi Veprol

Në qoftë se haroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha pér marrjen e zakonshme të saj.

Mos mermi një dozë të dysfishtë (ose më të lartë) pér të plotësuar dozin (dozat) e haruar(a).

Në qoftë se ndërpërsni marrjen e Veprol
Ndërpërja e menjëhershme e verapamilit mund të shoqërohet me përkëqësim të anginës.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, verapamili mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Mjekimi me verapamili në përgjithësi tolerohet mirë, por efektet anësore të lidhura me efektet farmakologjike të tij në përcjimin kardiak, mund t'rihen dhe mund t'ë shprehë më shumë në pacientët me dëmtim të mëparshëm të miokardit ose kardiomiopati hipertrofike.

Efekti anësore në zemër përfshinjë: bradikardi, bllok atrioventrikular, përkëqësim të insuficiencës kardiakë dhe asistol kalimtare.

Këto efekte janë më të zakoshme gjatë terapisë parenterale sesa terapisë orale.

Efekti anësore jo-kardiak më i mundshëm është konstipacioni. Mund t'ë shfaqen nauze, të cilat janë reportuar më rrahë.

Efekti të tjera anësore përfshinjë: hipotension, marrje mendsh, afshe, dhimbje koke, lodhje, dispne dhe edemë periferike. Gjithashtu janë reportuar reaksione në lëkurë, disa raste të funksionimit jonormal të mëlçisë dhe hepatotoksicitet, si dhe hiperplazi gingivale. Gjinekomastia është reportuar rrahë.

Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore osi qdo efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.

5. SI TA RUANI VEPROL

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos e përdorni Veprol pas datës së skadencës të shënuar në paketim. Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C.

Ruanjet në paketimin original.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Veprol – Tableta të veshura me film 40 mg

Lënda vepruese është verapamil klorhidrat.

Çdo tabletë e veshur me film përbën 40 mg verapamil klorhidrat.

Përbërsë të tjerrë: celulozë mikrokristallore, kroskarmelozë natriumi, amidon i prexhelatinuar, dioksid silici koloidal, stearat magnez i Opadry II rozë.

Çfarë përbën Veprol – Tableta të veshura me film 80 mg

Lënda vepruese është verapamil klorhidrat.

Çdo tabletë e veshur me film përbën 80 mg verapamil klorhidrat.

Përbërsë të tjerrë: celulozë mikrokristallore, kroskarmelozë natriumi, amidon i prexhelatinuar, dioksid silici koloidal, stearat magnez i Opadry II kuq.

Përbajtja e paketimit

Veprol – Tableta të veshura me film 40 mg

Kuti me 30 tabletë.

Veprol – Tableta të veshura me film 80 mg

Kuti me 30 tabletë.

Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:

! Kësillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

✗ Nuk duhet ta përdorni gjatë shtatzënisë.

⌚ Përbajtja. ! Kujdes. ⚡ Forma e tabletës.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAH) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel./Fax: 00355 4 23 62 800
Tiranë - Albania

Ky fletëudhëzues u formua në Janar 2015.