

**i** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion pér përdoruesin

# PIPERAZINE

Tableta - 250 mg  
(Piperazinë adipat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se t'elloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë të lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyjetë të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar eshtë përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështoret ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt jetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë eshtë Piperazine dhe përsë përdoret
- Përparrë se t'elli merrni Piperazine
- Si ta merrni Piperazine
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Piperazine
- Informacion i mëtejshëm

## 1. ÇFARË ËSHTË PIPERAZINE DHE PËRSË PËRDORET

Piperazina eshtë një antihelmintik që vepron kundër askarideve (Ascaris lumbricoides) dhe enterobiazave (Enterobius vermicularis). Te askaridet, piperazina shkakton blokimi neuromuskular që çon në paralizë muskulore të këtyre parazitëve, të cilët pastaj largohen me lehtësi nga pozicioni i tyre prej lëvizjeve të zorrëve dhe pastaj jashëqitën me fecet.

Piperazine tabletë - 250 mg indikohet në trajtimin e askaridiazës dhe enterobiazave.

Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Piperazine pér një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni të dini përsë ju eshtë dhënë Piperazine.

## 2. PËRPARA SE TË MERRNI PIPERAZINE

Mos merrni Piperazine në qoftë se:

- keni mbindjeshmëri ndaj piperazinës apo ndaj ndonjëjë prej përbërësve të tjerë të tabletave Piperazine;
- vuanı nga epilepsia;
- keni dëmtim të rëndë të funksionit të veshkave;
- keni dëmtim të funksionit të mëlçisë.

Tregoni kujdes të veçantë me Piperazine

Pyesni mjekun tuaj përparrë se t'elli merrni Piperazine në qoftë se:

- do të përdoret tek të sémurët me dëmtim të funksionit të veshkave (nuk duhet përdorur kur dëmtimi eshtë i rëndë);
- do të përdoret tek të sémurët me sémundje nervore;
- jeni gjatë shtatzënise.

## Marrja e barnave të tjera

Trajlimi i njëkozhëm me barna të tjera mund të ndikojë ose t'ë ndikohet nga Piperazine. Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohë e fundit barna të tjera, përfshirë ato t'ë marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj pér trajtimin me Piperazine në qoftë se ju jepet ndonjë bar jetër gjatë trajtimit.

- Efekti antihelmintik i piperazinës mund t'ë antagonistohet nga piranteli.
- Ekziston mundësia e ndërveprimit të fenotiazinave me piperazinën.

## Marrja e Piperazine me ushqim dhe pije

Nuk ka t'ë dhëna pér ndikimin e ushqimit dhe pijeve në farmakokinetikën e Piperazine.

## Shtatzënia

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni ose po planifikoni t'ë ngeleni shtatzënë. Eshtë raportuar se piperazina eshtë teratogenike tek leput dhe janë raportuar raste t'ë izoluarat t'ë keqformimeve fetale pas përdorimit të piperazinës tek njerëzit. Për këtë arsy, këshillohet t'ë mos përdoret gjatë shtatzënës dhe veçanërisht gjatë tremujorit t'ë parë, përvës rastevë kur trajtimi me piperazinë eshtë i domosdoshëm pér nënën.

## Ushqimi me gji

Piperazina kalon në qumështin e gjirit. Nënat duhet t'ë këshillohen që t'a marrin barin pas dhënies së gjirit dhe më pas t'ë mos e ushqejnë foshnjën me gji pér 8 orë. Gjatë kësaj periudhe 8-orëshe ato duhet ta mbledhin dhe ta derdhin qumështin i cili do t'ë sekretohet në oraret normale t'ë ushqyerjes së foshnjës me gji.

## 3. SI TA MERRNI PIPERAZINE

Gjithmonë merrni Piperazine sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efekti e Piperazine janë shumë t'ë forta ose shumë t'ë dobëta, fshini me mjekun ose farmacistin tuaj. Tabletat duhet t'ë gjelliten me një gotë ujë (200 - 250 ml ujë).

Dozimi jepet si më poshtë:

Fëmijët deri në 1 vjeç: 200 mg, 2 – 3 herë në ditë; Fëmijët nga 1 – 6 vjeç: 200 – 400 mg, 2 – 3 herë në ditë;

Fëmijët mbi 6 – 15 vjeç: 400 – 500 mg, 2 – 3 herë në ditë;

Fëmijët mbi 15 vjeç dhe t'ë ritrit: 500 mg, 3 herë në ditë.

Mjekimi vazhdohet pér 1 javë reshët dhe piperazina zakonisht merret 2 orë para ushqimit. Në mjekimin me doza sulmi (sidomos në askaridiazë), në ditën e parë përdoren 100 mg piperazinë / kg peshë, 2 orë para ngrënies së darkës, por j'ë shumë se 3 g (d.m.th 12 tabletë). E njëjtë dozë përdoret edhe ditën e dytë esëll (1 orë para ngrënies së mëngjesit).

Zakonisht këshillohet që mjekimi me Piperazine t'ë përsërit pas 6 javësh në askaridiazë.

## Në qoftë se keni marrë më shumë Piperazine

Në qoftë se keni marrë më shumë Piperazine se sasia që duhet t'ë merrnit, ose në qoftë se fëmjët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi t'ë kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose t'ë telefononi urgencën pér t'ë marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet t'ë ndërmerren.

## Në qoftë se keni harruar t'ë merrni Piperazine

Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur t'ë jetë koha pér marrjen e zakonshme të saj.

Mos merrni një dozë t'ë dyfishtë (ose më t'ë lartë) pér t'ë plotësuar dozën (dozat) e harruar(a).

Në qoftë se keni pyjetë t'ë mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si t'ë gjitha barnat e tjera, Piperazine mund t'ë shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çodkush i manifeston. Piperazine tolerohet mirë në dozat e rekomanduara. Njoftoni mjekun tuaj pér efektet anësore t'ë mëposhtme që mund t'ju shfaqen:

- t'ë përziera, t'ë vjella, kolika, diarre, dhimbje abdominale, dhimbje koke;
- reaksione alergjike (përfshirë urtikarien, rashet kutane, bronkospazmat e më rrallë sindromën Stevens – Johnson dhe angioedemën);
- më rrallë përshkruehen marrje mendsh, çorientim muskular, përgjumje, debulësë, ataksia, parestezi, konfuzion mendor, lëvzje koreiforme, tremor, kontraksione mioklonike, konvulsione dhe humbe t'ë reflekseve tek t'ë sémurët me çrrëgullime neurologjike ose renale;
- shqetësimë t'ë përkohshme vizuale si shikim i turbullt dhe formim katarakti, megjithëse ky i fundit ende nuk eshtë pruvor.

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësitet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj. Kur shfaqet ndonjë nga efektet anësore t'ë mësipërme, mjekimi me Piperazine duhet ndërprerë dhe ju duhet t'ë këshillloheni me mjekun ose me farmacistin tuaj.

## 5. SI TA RUANI PIPERAZINE

Mbajeni larg fëmijëve!  
Mos e përdori Piperazine pas datës së skadencës.  
Ruajeni nén temperaturën 25°C!  
Ruajeni në paketimin original pér ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia!

## 6. INFORMACION I MËTEJSHËM



Çfarë përbën Piperazine

Lënda vepruese është piperazinë adipat. Çdo tabletë përbën 250 mg piperazinë adipat. Përbërsë t'jërë: amidon, celulozë mikrokristalore, xhelatinë, glikolat natriumi i amidonit, stearat magnezi.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 30 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:



Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

**PROFARMA Sh.a.**  
Rruga "Myslym Keta"  
Tel.: 00355 4 23 89 602  
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishiku pér herë t'ë fundit në Qershori 2015.

