

**i** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion për pacientin

# GENTA

Krem – 0.1 %  
(Gentamicinë sulfat)

**Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.**

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

**Në këtë fletëudhëzues:**

1. Çfarë është Genta dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Genta
3. Si ta përdorni Genta
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Genta
6. Informacion i mëtejshëm

## 1. ÇFARË ËSHTË GENTA DHE PËRSE PËRDORET

Genta është një produkt farmaceutik që ka si lëndë aktive gentamicininë sulfat. Gentamicina është një antibiotik aminoglikozidik, veçanërisht aktiv kundër bacileve aerobe gram-negativë, sidomos *Escherichia coli*, *Proteus*, *Klebsiella*, *Serratia*, *Enterobacter* dhe *Citrobacter*. Gentamicina nuk është e efektshme ndaj anaerobëve, mykut dhe viruseve. Genta - krem përdoret në format e infektuara të lëkurës të shkaktuara nga mikrobe të ndjeshme ndaj gentamicinës si: piodermi me shtrirje dhe gravitet të ndryshëm, folikulite, forunkuloza, ekzema mikrobike. Gjithashtu përdoret edhe në format e infektuara sekondare si: dermatite, ekzema, ulçera, leziona traumatike, në djegie dhe plagë të infektuara. Infeksionet e tjera të lëkurës që kërkojnë përdorimin e Genta krem janë akneja dhe psoriasis pustuloza, forma integroide.

## 2. PËRPARA SE TË PËRDORNI GENTA

**Mos përdorni Genta - krem:**

- në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj aminoglikozidëve ku bën pjesë gentamicina, ndaj propilenglikolit, nipaginës, nipazolit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit pasi mund të shfaqen reaksione alergjike, përfshi dhe anafilaksinë. Reaksionet alergjike nga aminoglikozidët nuk janë të zakonshme, por, kur ndodhin, shpesh janë të kryqëzuara brenda grupit kimik.

## Tregoni kujdes të veçantë me Genta

Pyesni mjekun tuaj përpara se të përdorni Genta - krem.

- Kur gentamicina përdoret lokalisht në sipërfaqe të mëdha lëkure, duhet pasur parasysh mundësia e përthithjes së antibiotikut, çka përbën një rrezik të vogël për shfaqjen e ototoksicitetit, veçanërisht në të moshuarit dhe në të sëmurët me dëmtim të funksionit të veshkave.
- Në qoftë se shfaqet iritrim, sensibilizim ose mbiinfeksion, mjekimi duhet ndërprerë dhe duhet filluar një mjekim tjetër i përshtatshëm.
- Duhet përdorur me shumë kujdes tek fëmijët më të vegjël se një vjeç. Siguria dhe efektiviteti i barit tek këta fëmijë nuk janë konfirmuar ende.
- Genta – krem është vetëm për përdorim të jashtëm në lëkurë.

## Marrja e barnave të tjera

Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë / përdorur ose keni marrë / përdorur kohë e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Genta – krem në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit. Ndërveprimet medikamentoze klinikisht të rëndësishme vërehen pas përthithjes sistemike të Genta - krem. Përdorimi i barnave të tjera si: kanamicinë, neomicinë, streptomycinë, ciklosporinë, aciklovir, polimiksinë B, kolistinë, vankomicinë, cisplatinë dhe fludarabinë shton rrezikun e nefrotoksicitetit. Duhet mënjëruar përdorimi i njëkohshëm i gentamicinës me barna të tjerë ototoksikë siç janë acidi etakrinik dhe ndoshta furosemedi sepse mund të rrisin toksicitetin e aminoglikozidëve.

## Shtatzënia dhe Ushqimi me gji

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të përdorni këtë bar. Siguria e përdorimit të këtij bari në shtatzëni dhe laktacion nuk është vërtetuar ende. Megjithatë, duhet të evitohet përdorimi si gjatë shtatzënisë dhe gjatë ushqyerjes me gji.

## Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nuk ka të dhëna që ky preparat mund të ndikojë në aftësinë për të drejtuar automjetin apo përdorur makineri.

## Informacion i rëndësishëm për disa nga

### përbërësit e Genta - krem

Genta përmban nipaginë dhe nipazol të cilët mund të shkaktojnë reaksione alergjike (ndoshta të vonuara). Gjithashtu, përmban propilenglikol i cili mund të shkaktojë iritrim të lëkurës.

## 3. SI TA PËRDORNI GENTA

Gjithmonë përdoreni Genta – krem sipas këshillës së mjekut tuaj. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Genta - krem janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj. Para përdorimit, zona e infektuar duhet larë dhe tharë mirë. Përpara se të aplikohet, mund të jetë e nevojshme që të largohen krustat nga lëkura, me qëllim që të lehtësohet kontakti dhe veprimi i gentamicinës me bakteret shkaktarë patogjenë.

Kremi përdoret 3-4 herë në ditë deri në arritjen e përmirësimit. Më pas aplikimet mund të bëhen 2-3 herë në ditë. Është mirë që pas përdorimit pjesa e lyer të mbulohet me garzë sterile, por kjo nuk është e domosdoshme.

## Në qoftë se keni përdorur më shumë Genta

Në qoftë se keni përdorur më shumë Genta - krem, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren.

## Në qoftë se keni harruar të përdorni Genta

Në qoftë se harroni të përdorni një dozë, përdorni dozën pasardhëse kur të jetë koha për përdorimin e zakonshëm të saj. Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Genta - krem mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit. Kur kremi përdoret vazhdimisht ose në mënyrë të përsëritur ekziston rreziku i shfaqjes së reaksioneve të sensibilizimit.

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 5. SI TA RUANI GENTA

Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët në një temperaturë jo më shumë se 25°C. Duhet të ruhet nga drita dhe lagështira. Mos e përdorni Genta - krem pas datës së skadencës.

Mbajeni barin tuaj në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund ta marrin sepse ai mund t'i dëmtojë ata.

## 6. INFORMACION I MËTEJSHËM

### Çfarë përmban Genta - krem

Lënda vepruese është gentamicinë sulfat. 1 g krem përmban gentamicinë sulfat ekuivalent me 1 mg gentamicinë (0.1%). Përbërës të tjerë janë: vazelinë, vaj vazeline, nipaginë, nipazol, propilenglikol, Tefose 63 (DUB 1632), ujë i pastruar.

### Përmbajtja e paketimit

Kuti me 1 tubet që përmban 15 g krem.

### Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:



Sipas recetës së mjekut.



Përmbajtja.



Kujdes.



Krem.

### Mbajtësi i autorizimit të tregtimit (MAT) dhe prodhuesi:



**PROFARMA Sh.a.**  
Rruga "Myslym Keta"  
Tel./Fax: 00 355 4 23 62 800  
Tiranë - SHQIPËRI

**Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Shkurt 2014.**