

**i** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion pér pacientin

# NEOBAC

Pomadë - (5 mg + 500 IU) / g  
(Neomycin sulfat, Bacitracin)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit

- Ruanjeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerrë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund t'ë kenë të njëjtë simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjeter anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

1. Çfarë është Neobac dhe përsë përdoret
2. Çfarë duhet të dini përparrë se të përdorni Neobac
3. Si ta përdoni Neobac
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Neobac
6. Informacion i mëtejshëm

## 1. Çfarë është Neobac dhe përsë përdoret

Pomada Neobac është një antibiotik.

Ajo indikohet në infeksionet e vogla, sipërfaqësore të lëkurës, të cilat shkaktohen nga agjentë të ndjeshëm ndaj neomicinës dhe / ose bacitracinës.

## 2. Çfarë duhet të dini përparrë se të përdorni Neobac

**Neobac nuk duhet të përdoret:**

- në rast mbindjeshmëri ndaj neomicinës, ndaj antibiotikëve të tjerrë aminoglikozidikë, ndaj bacitracinës apo ndaj ndonjë prej përbërësive të tjerrë të barit;
  - në shtatzëni dhë gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijës me gjji.
- Neomicina, lënda aktive e pomadës Neobac mund të shkaktojë dëmtim të dégjimit deri në shurdhim; ndëstudim në kafshë si edhe në raportin tek njëritështë vënë re dëmtim i dégjimit / shurdhim tek fetusi / i porsalinduri pas ekspozitimit të nënës.
- Neomicina e kalon barierën placentare. Nuk dihet nëse neomicina dhe bacitracina kalojnë në qumëshin e gjirit.
- Pomada Neobac nuk duhet të përdoret në kanalin e dégjimit.
  - Ajo nuk duhet të përdoret në lëkuren shumë të démtuar, si plaqë apo djegje.

## Tregoni kujdes të veçantë me Neobac:

Tek meshkujt, neomicina, lënda aktive e pomadës Neobac, ka treguar efekte negative në formimin e spermës, duke reduktuar përqendrimin e saj dhe numrin e spermatozoideve, si edhe lëvizshmërinë e tyre.

Përdorimi topik i neomicinës në infeksionet e lëkurës mbart riskun e reaksioneve alergjike. Mes neomicinës dhe antibiotikëve të tjerrë aminoglikozidikë, si gentamicina dhe kanamicina, mund t'ë ndodhë alergji të kryqëzuara.

Për shkak të efektit blokues neuro – muscular të aminoglikozidikëve gjatë përhithjës sistemike, duhet treguar kujdes tek pacientët me miastenia gravis, parkinson, sëmundje të tjera që shqoqërohen me dobësi muskulare ose tek ata pacientë të cilët përdorin njëkohësisht barna me veprinë blokues neuro – muscular.

## Marrja e barnave të tjera:

Njofoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë / përdorur barna të tjera ose nëse i keni marrë / përdorur së fundmi ato, përfshirë barnat që merren pa recetë. Deri tanë nuk nijhen ndërveprime me barna ose ndërveprime të tjera.

## Shtatzënia dhe Ushqimi me gjji

Shih piken „Neobac nuk duhet të përdoret“.

Përparrë marries / përdorimit që do bari, këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

## Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nuk ka të dhëna në lidhje me ndikimin në aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri.

## 3. Si ta përdorni Neobac

Përdoren Neobac gjithmonë sipas udhëzimit të mjekut.

Nëse nuk jeni të sigurtë, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## Nëse nuk përshkruhet ndryshtësia nga mjeku:

Neobac përdoret disa herë në ditë.

## Mënyra e përdorimit

Për përdorim në lëkurë. Aplikohet një shtresë e hollë e pomadës Neobac në zonën e trupit që do trajtohet.

## Kohëzgjata e përdorimit

Kohëzgjata e trajtimit varet nga illoji, shkalla dhe ecuria e sëmundjes dhe si rregull nuk zgjat më shumë se 4 - 8 ditë.

Ju lutemi të flisni me mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju krijohet përshtypja se efekti i Neobac është shumë i fortë ose shumë i dobët.

## Nëse keni përdorur një sasi më të madhe pomade Neobac sesa duhet:

Vazhdojeni trajtinim me dozat e përshkruara. Në rast të një mbidozimi afatshkurtër nuk pritet të shkaktohen dëmtime.

## Nëse keni harruar të përdorni Neobac:

Mos përdorni një dozë të dyfishtë nëse keni harruar të përdorni dozën paraardhëse.

## Nëse ndërprinci përdorimin e Neobac:

Mund të rezikoni sëkuksen e trajtimit. Ju lutemi të flisni me mjekun ose farmacistin tuaj përparrë se të ndërprinci trajtimin me Neobac.

Nëse keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 4. Efekte anësore të mundshme

Si të gjitha barnat e tjera, Neobac mund të shkaktojë efekte anësore, por jo çdokush i manifeston ato.

Për vlerësimin e efekteve anësore do përdoren treguesit e mëposhtëm të shpeshlësise:

Shumë të shpeshta:	më shumë se 1 përdorues ndër 10
Të shpeshta:	1 deri në 10 përdorues ndër 100
Më raste:	1 deri në 10 përdorues ndër 1.000
Të ralla:	1 deri në 10 përdorues ndër 10.000
Shumë të ralla:	më pak se 1 përdorues ndër 10.000
Të panjohura:	Nuk mund të vlerësohen

## Efekte të padëshiruara të mundshme

Në disa raste mund të ndodhin irritime lokale dhe reaksiione alergjike kontakti (të kraujtura, skujje, vezikula) ose ndikime në shërimin e plágës.

Nës bari përdoret sipas udhëzimeve (në siperfaqe të vogël, në mënyrë sipërfaqësore dhe për një kohë të shkurtër), nuk pritet efekte anësore sistemike, si p.sh. dëmtimë të dégjimit ose dëmtimë të veshkave.

Nëse ndonjë prej efekteve anësore të përmendura ju shqetëson ose nëse vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të informoni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 5. Si ta ruani Neobac

Të ruhet larg fëmijëve!

Të ruhet nën 25 °C.

Mund të përdoret 3 muaj pas hapjes së tubet.

Mos e përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në paketim si „Skad.“.

## 6. Informacion i mëtejshëm

### Çfarë përmban Neobac:

Lëndët vepruese janë Neomycin sulfat dhe Bacitracin.

1 g pomadë përbën 5 mg Neomycin sulfat dhe 500 IU. Bacitracin.

Perbërsit e tjerrë janë: alkool benzilik, Tefose 63, olijol oleat, Labrafac, parafinë e lëngshme, vitamini E, acid askorbik, esencë lavandule, ujë i pastruar.

### Si paraqitet Neobac dhe përmbytja e paketimit:

Neobac është pomadë e bardhë, në paketim: kuti me një tubet 30 g.

Shpërgues i ikonave ilustruese në paketim:



Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.



Përmbytja.



Kujdes.



Pomadë.

### Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.

Rruga "Myslym Keta"

Tel./Fax: 00355 4 23 62 800

Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u formuloa në Tetor 2013.

**i** SPECIFICATION

CROPPING AREA 15 X 25 cm

## i PACKAGE LEAFLET:

Information for the patient

# NEOBAC

Ointment – (5 mg + 500 IU) / g  
(Neomycin sulphate, Bacitracin)

Please talk to your doctor or pharmacist if you have the impression that the effect of Neobac is too strong or too weak.

## If you use more Neobac than you should:

Continue your treatment with the prescribed doses. In case of short-term overdosage, no impairment is expected.

## If you forget to use Neobac:

Do not use a double dose if you forget the previous dose.

## If you stop using Neobac:

You can risk the success of your treatment. Please, talk to your doctor or pharmacist before stopping the treatment with Neobac.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

## 4. Possible side effects

Like all medicines, Neobac can cause side effects, although not everybody gets them.

For the evaluation of side effects will be used the following frequency indicators:

Very common	more than 1 user in 10
Common	1 to 10 users of 100
Uncommon	1 to 10 users of 1,000
Rare	1 to 10 users of 10,000
Very rare	less than 1 user in 10,000
Not known	Can not be estimated

## Possible undesirable effects

Occasionally may happen local irritations or reactions of contact allergies (itching, redness, vesicles) or disorders of the wound healing.

If used according the instructions (small surface, superficially and shortly), systemic adverse effects, like e.g. hearing impairment or renal impairment are not expected.

Talk to your doctor or pharmacist if you get any of these side effects or any side effects not listed in this leaflet.

## 5. How to store Neobac

Keep away from children!

Do not store above 25°C.

Can be used up to 3 months after opening.

Do not use after the expiry date which is stated on the package as „Skad.“.

## 6 Further information

### What Neobac contains:

The active substances are Neomycin sulphate and Bacitracin.

1 g ointment contains 5 mg Neomycin sulphate and 500 IU. Bacitracin.

The other ingredients are: benzyl alcohol, Tefose 63, oleyl oleate, Labrafac, light liquid paraffin, vitamin E, ascorbic acid, essence lavandule, purified water.

### What Neobac looks like and contents of the pack

Neobac is a white ointment, packed in box with one tube of 30 g.

### Explanatory of the illustration icons on the packaging:

! Ask your doctor or pharmacist.

Content. ! Warning.

Ointment.

### Marketing Authorisation Holder (MAH) and Manufacturer:



PROFARMA Sh.a.

Rruga "Myslym Keta"

Tel./Fax: 00355 4 23 62 800

Tirana - ALBANIA

This leaflet was formulated in October 2013.

**PAY ATENTION**, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.