

**i** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion pér pacientin

## GLUKOZE

Tretësirë pér injekzion – 4000 mg / 10 ml (40%)

Tretësirë pér perfuzion – 5 %  
(Glukozë)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit.

- Rusjeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshtuar për ju. Mos e jepni tek persona tjetër. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtë simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Glukoze dhe përsë përdoret
- Përparrë se të merrni Glukoze
- Si ta merrni Glukoze
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Glukoze
- Informacion i mëtejshëm

### 1. ÇFARË ËSHTË GLUKOZE DHE PËRSE PËRDORET

Glukoza është një monosakarid, që e përdorur nga goja e sidosmos me injekzioni shërbën si burim energjetik; ajo merr pjesë edhe në metabolismin e yndymave dhe parandalon acidozën, duke rritur përbajtjen e azotit të mëlçisë. Ky veprim i fundit është shfrytëzuar për parandalimin dhe trajtimin e helmimeve nga barnat me veprim helmues në mëlc. Në mungesë të një sasie të mjaftueshme glukoze, sasia e yndymave që oksidohet ritet shumë dhe produktet e ndërmjetme, si: acidi hidroksibutirik dhe acidi acetaozelik grumbullohen në gjak, duke u bërë shkak për ketoacidozë.

Indikatori për zëvendësimin e lëngjeve dhe furnizimin e energjisë së nevojshme, për ushqimin parenteral të të sémurëve rënde, në hipoglicemji; në helmimë me lëndë të ndryshme (barbiturate, morfinë, salicilate, përbërje të mërkurit).

### 2. PËRPARA SE TË MERRNI GLUKOZE

Mos merrni Glukoze në qoftë se vuani nga:

- diabeti melitus;
  - insuficiencë e rëndë renale.
- Tretësirat hipertone (p.sh. 40%) të glukozes janë të kundërndikuara në:
- të sémurët me anuri;
  - hemorragji intrakraniale ose intraspinal;
  - delirium tremens kur ka dehidrim.

### Tregoni kujdes të veçantë me Glukoze

Pyesni mjekun tuaj përparrë se të merrni Glukoze. Kujdes duhet treguar tek pacientit që kanë intolerancë ndaj glukozes.

Kujdes i veçantë kërkohet në pacientët me insuficiencë kardiakë dhe në gjendjet me edema dhe mbajtje të ujit dhe kripërave.

Kujdes kërkohet nëse glukoza administrohet tek pacientë që marrin kortikosteroidë ose kortikotropinë.

Tretësira e përqëndruar e glukozes (40%) duhet përdorur me kujdes të posaçëm në sklerozën trunore të përparruar.

Tretësirat e glukozes nuk duhen përdorur në të njëjtin sistem perfuzioni me gjakun e konservuar, sepse mund të ndodhë hemolizë.

### 3. SI TA MERRNI GLUKOZE

Gjithmonë merrni glukozen sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se njeri jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjenjë efektet e glukozes janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Doza e përdorur varet nga karakteristikat e pacientit (mosha, peshë, gjendja klinike, bilanci hidro-elektritik) dhe ai ajo - bazikë.

### Në qoftë se keni marrë më shumë Glukoze

Në qoftë se keni marrë më shumë Glukoze se sasia që duhet të merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni me mjekun tuaj, spitalin, ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerrin.

Përdorimi afatgjatë ose perfuzionimi i shpejtë i vëllimeve të mëdha i tretësirave izotonike (5%) mund të shkaktojë edema ose helmin nga uji; përkundrazi, përdorimi afatgjatë ose injektimi i shpejtë i tretësirave hipertonike, mund të shkaktojë dehidrim, si rezultat i njiljes së hiperglisemisë.

### Në qoftë se keni haruar të merrni Glukoze

Në qoftë se haroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdin kur të jetë kohë përmarrjen e zakonishte të saj.

Mos merrni një dozë të dyfishët (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e haruar(a).

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

### 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjithë barnat e tjerë, glukoza mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse që qodkush i manifeston.

Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza reduktivitet ose trajtimi ndërpreritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të trajimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.

Injektimi në venë i tretësirave të glukozes, në mënyrë të veçantë i tretësirave hipertonike (p.sh. 40%) mund të shkaktojë dhimbje lokale, irritim të venave dhe tromboflebit. Disa nga këto reaksiione mund të shkaktohen si rezultat i pranisë së produkteve të shpërbërjes pas autoklavimit të tretësirave ose teknikave jokorekte të injektimit.

Perfuzionet venozë (tretësira 5%) mund të bëhen shkak përvillimin e çregullimeve të lëngjeve dhe elektrolitëve, përfshirë hipokalemien, hipomagnezeminë dhe hipofosfateminë.

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkëqësoshet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmeroni mjekun ose farmacistin tuaj.

### 5. SI TA RUANI GLUKOZE

Mbajeni larg fëmijëve. Mos e përdorni barin pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C.

### 6. INFORMACION I MËTEJSHËM

#### Çfarë përmban Glukoze

Lënda vepruese është glukoze monohidrat ose glukoze anhidër.

#### Glukoze – Tretësirë pér injekzion 40%

Çdo ampulë 10 ml përmban glukoze monohidrat ekuivalent me 4000 mg

glukoze anhidër.  
Përbërës të tjerë: klorur natriumi, acid klorhidrik dhe ujë pér injekzion.

### Glukoze – Tretësirë pér perfuzion 5%

1 ml tretësirë pér perfuzion përmban glukoze monohidrat ekuivalent me 50 mg glukoze anhidër.

Përbërës të tjerë: ujë pér injekzion.

### Përbajtja e paketimit

Tretësira pér injekzion 40%: kuti me 10 ampula 10 ml;  
kuti me 100 ampula 10 ml (përdorim spitalor)

Tretësira pér perfuzion 5%: shishe qelqi të shkallëzuara ose  
qeska plastike me vëlim 250 ml ose 500 ml.

### Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:

Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Përbajtja. Kujdes.

Tretësirë për injekzion.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

PROFARMA Sh.a.  
Rruga "Myslym Keta"  
Tel.: 00355 4 23 89 602  
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Mars 2015.

