

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

DILTIAZEM

Tableta – 60 mg
(*Diltiazem klorhidrat*)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpala se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky barë shëtit përshtuar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjeter anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Diltiazem dhe përsë përdoret
- Përpala se të merrni Diltiazem
- Si ta merrni Diltiazem
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Diltiazem
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË DILTIAZEM DHE PËRSE PËRDORET

Tabletat Diltiazem përbajnjë 60 mg diltiazem klorhidrat. Diltiazemi është një benztiazepinë blokuese e kanaleve të kalçiumit, që e ushtron veprimin në sajë të veteve të tij vazodilatatore në enët koronare dhe ato periferike dhe veteve inotrope negative (pakëson forcën e kontraktimit të muskulit të zemrës). Tabletat Diltiazem përdoren në trajtimin e angina pektoris dhe hipertensionit.

2. PËRPARA SE TË MERRNI DILTIAZEM

Mos merrni Diltiazem:

- në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj diltiazem klorhidratit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të tabletave Diltiazem;
- në qoftë se keni puls shumë të ulët (më pak se 50 të rratura në minutë);
- në qoftë se keni pamjaftueshmëri të barkushes së majtë me stazë pulmonare;
- në qoftë se jeni shtatzënë, planifikoni të mbeteni shtatzënë apo ushqeni fëmijën me gjë;
- në qoftë se vuani nga sindromi i "sinusit të sëmurë", shkallë e dytë dhe e tretë e blokut AV tek pacientit pa "pacemaker";
- në qoftë se po përdorni një infuzion dantrolen (bar relaksues i muskujve me veprim të drejtëpërdrejtë në muskulaturën skeleto);
- në qoftë se vuani nga porfiria.

Tregoni kujdes të veçantë me Diltiazem

Pyesni mjekun tuaj përpala se të merrni tabletat Diltiazem:

- në qoftë se vuani nga pamjaftueshmëria kongjesteive e zemrës;
- në qoftë se vuani nga çregullimet e përcimit kardiak;
- në qoftë se vuani nga hipotensioni; ulja e presionit të gjakut që shqëron terapinë me diltiazem ndonjëherë mund të rezultojë me hipotension simptomatik;
- në qoftë se vuani nga një démtim akut i mëlçisë;
- në qoftë se vuani nga çregullime të funksionit të veshkave.

Marrja e barnave të tjera

Trajimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga diltiazem.

Ju lutemi t'ë kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me tabletat Diltiazem në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.

Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj t'ë jetë në djeni të faktit që ju po trajtoheni me:

- beta - blokues (si p.sh propranolol);
- cimetidinë (bar për trajtimin e ulcérës së stomakut, aciditetit në stomak dhe refluksit acid);
- digitalikë (barna për trajtimin e problemeve të zemrës);
- anestezikë (barna të përdorura në anestesi);
- benzodiazepina (si p.sh midazolam, triazolam);
- ciklosporinë (bar për ndrydhjen e sistemit imun, për parandalimin e reaksiioneve të mospranimit pas transplantit të organeve, gjithashtu i përdorur për p.sh. probleme të caktuara reumatike ose dermatologjike);
- karbamazepinë, fenitoïnë (barna që kryesish përdoren për trajtimin e epilepsive);
- lovastatinë, simvastatinë (barna për uljen e kolesterolit në gjak);
- rifampin (antibiotik);
- litium (i përdorur për të trajtuar maninë që është pjesë e çregullimit bipolar, sëmundjet maniako - depresive);
- amiodaron, dronedaron (barna antiartitmitikë);
- eritromicinë, klaritromicinë, telitromicinë (antibiotikë);
- α - blokues;
- atazanavir, ritonavir (antiretroviralë);
- kolkincinë (bar i përdorur për trajtimin e gutës);
- ivabradinë (bar i përdorur në trajtimin simptomatik të angina pektoris);
- sirolimus, takrolimus (barna imunosupresivë);
- teofilinë (bar i përdorur në probleme respiratore);
- avanafil (bar i përdorur në çregullimin e funksionit erektil).

Marrja e tabletave Diltiazem me ushqim dhe pije

Mënjanoni konsumimin e pijave alkolike gjatë mjekimit me diltiazem.

Shtatzënia

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpala se të merrni këtë bar.

Nuk ka studime të mirë-kontrolluara në gra shtatzëna, prandaj diltiazemi duhet t'ë shmanget në shtatzëni.

Ushqimi me gjë

Diltiazemi kalon në qumështin e gjirit. Në qoftë se përdorimi i tij konsiderohet primar për shëndetin e pacientes, duhet ndërprerë dhënia e gjirit dhe t'ë gjendet një metodë tjeter ushqimi për fëmijën.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Duhet mbajtur parasysh fakti që gjatë mjekimit mund të ndiheni të lodhur, të keni marrje mendsh apo dobësi muskulare. Nëse ju ndodhin këto efekte, nuk duhet t'ë drejtoni automjetin apo t'ë përdorni makineri.

Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Diltiazem

Tabletat Diltiazem përbajnjë lakozë. Nëse keni intolerancë ndaj disa sheqernave, kontaktoni mjekun tuaj para se t'ë përdorni këtë bar.

3. SI TA MERRNI DILTIAZEM

Gjithmonë merrni tabletat Diltiazem sipas këshillës së mjekut. Mos e merrni këtë bar në dozë më të madhe se ajo e rekomanduar apo për një kohë më të gjatë. Tabletat duhet t'ë gjelliten me një gotë ujë. Mos e përtypni, gjelliteni të gjithë tabletën.

Mos e ndërprisni marrjen e këtij bari pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Ndërprera e menjëherë mund t'ë çojë në përkeqësim të gjendjes suaj shëndetësore. Në qoftë se po mjekoheni për tensionin e lartë, vazhdoni ta merrni këtë bar edhe pse mund t'ë ndiheni mirë. Tensioni i lartë shpeshherë nuk ka shenja.

Të rriturit: doza e zakonshme për trajtimin e **angina pektoris** është një tabletë (60 mg) tre herë në ditë. Megjithatë, përgjigjja ndaj mjekimit ndryshon nga pacienti në pacient ndaj dhe dozimi mund t'ë ndryshojë. Në qoftë se është e nevojshme mund t'ë merren deri në 360 mg/ditë në doza të ndara.

Në trajtimin e **hipertensionit** doza fillestare është 60 mg deri në 120 mg dy herë në ditë. Doza mund t'ë rritet deri në 360 mg/ditë.

Të moshuarit dhe pacientët me funksion të dëmtuar të veshkave apo mëlcisë: doza fillestare e rekomanduar është nga një tabletë (60 mg) dy herë në ditë. Porsi duhet matur herë pas here dhe doza nuk duhet rritur nëse numri i të rrashurave bie nën 50 rrashje në minutë.

Fëmijët: nuk rekomandohet përdorimi në fëmijë.

Në qoftë se keni marrë më shumë tabletë Diltiazem se sa duhet

Në qoftë se keni marrë më shumë Diltiazem se sasia që duhet t'ë merrnit, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi t'ë kontaktoni mjekun tuaj, spitalin, ose t'ë telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet t'ë ndërrermen.

Simptomatët e mbidozimit mund t'ë përfshijnë: marje mendsh, ulje të presionit të gjakut, ulje t'ë numrit të rrashurave të zemrës deri në bllok t'ë plotë e asistola.

Në qoftë se harroni të merrni tabletat Diltiazem

Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur t'ë jetë koha përmarrjen e zakonshme t'ë saj.

Mos merrni një dozë t'ë dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e harruar(a).

Në qoftë se ndërprisi trajtimin me Diltiazem

Mos e ndërprisi papritur trajtimin, pasi gjendja juaj mund t'ë përkeqësohet.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Në dozat e rekomanduara terapeutike, diltiazemi tolerohet mirë. Efektet anësore të rënda që mund t'ë çojnë deri në ndërprerë të terapisë me diltiazem apo ndryshim të dozës janë t'ë rralla, megjithatë, në 1% të pacientëve çregullimet e traktit gastrointestinal, reaksionet dermatologjike ose bradikardia mund t'ë çojnë deri në ndërprerje të mjekimit.

Efektet kardiovaskulare

Efektet anësore kardiovaskulare të diltiazemit përfshijnë: hipotension ose hipotension ortostatik (hipotensioni vjen si një efekt sekondar, si pasojë e efektit vazodilatator të diltiazemit në muskulaturën e lëmuar t'ë enjve të gjakut), anginë, aritmë, përkeqësim t'ë pamjaftueshmërisë kongjesteive të zemrës, sinkop (të fikët), ndjesi nxehësie në trup, vaskulit, bllok sinoatrial dhe atrioventrikular, palpitacione. Fryrje dhe/ose edema (veçanërisht t'ë gjymtyrëve të poshtme) janë ndër efektet e tjera anësore të raportuara.

Efektet gastro-intestinale

Nauzea ndodh deri në 3% të pacientëve që marrin diltiazem. Anoreksi, t'ë vjella, diarre, dhimbje barku, çregullim në tretje, çregullim i t'ë shjuarit, hemorrhagi gastrointestinal, ulcera gastrike, kapsllëk, tharje e gojës, etje, shtim në peshë, hiperplazi e gingivave.

Efektet në sistemin nervor

Efektet anësore të diltiazemit në sistemin nervor përfshijnë: dhimbje koke, përgjumje, marje mendsh dhe dobësi muskulare. Reaksionet ekstrapiramidale janë raportuar rrallë në pacientët që mjekohen me diltiazem.

Efektet në mëlçi

Rritje t'ë lehta ose t'ë theksuara t'ë rezultateve të testeve mbi funksionin e mëlcisë (p.sh. LDH, kreatinë kinazë, kreatinë fosfokinazë, alkalinë fosfatazë, bilirubinë) dhe dëmtim i qelizave të mëlcisë janë raportuar rrallë në pacientët që marrin diltiazem nga goja, zakonisht në fillimin e terapisë (p.sh. 1-8 javë pas fillimit); megjithatë, në shumicën e rasteve, një lidhje me barin është e pasigurtë, është e mundshme në disa raste.

Efektet anësore në mëlçi të diltiazemit t'ë marrë në rrugë orale janë t'ë rikthyeshme pas ndërprerjes së barit.

Efektet lokale dhe dermatologjike

Në rrëth 1% të pacientëve që marrin diltiazem është raportuar rash si efekt anësor në lëkurë. Reaksionet e ndjeshmërisë ndaj dritës, urtikaria, hipertrofia e lëkurës dhe kruarje t'ë lëkurës janë raportuar në më pak se 1% të pacientëve.

Eritema e thjeshtë ose deskuamative (me apo pa temperaturë), eritema multiforme, dermatiti eksfoliativ, dermatiti akut pustular ekzematoz i gjeneralizuar janë raportuar gjithashtu.

Efekte të tjera anësore

Efektet e tjera anësore të diltiazemit përfshijnë: dispne (vështirësi në frymëmarje), këputje, gjinekomasti, rinit, shtim i kollës, kongjestion nazal, dhimbje qafe, dhimbje shpine, irritim në sy, turbullim i shkitimit, anemi hemolitike, rritje e kohës së nevojshme për ndalim e hemorrhagjisë.

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkëqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI DILTIAZEM?

Ruajeni barin larg fëmijëve.

Mos i përdorni tabletat Diltiazem pas datës së skadimit e cilës është dhe shënuar në paketim.

Mos i ruani tabletat mbi 25°C.

Ruajni në paketimin original për t'i mbrojtur nga drita dhe lagështia.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbajnjë tabletat Diltiazem

Lënda vepruese është diltiazem klorhidrat.


Cdo tabletë përbën 60 mg diltiazem klorhidrat.

PËRBËRËSIT E TËRË JANË: lakozë, PEG 6000, vaj vegetal i hidrogjenuar, hidrokisipropilmelcelululozë, stearat magnezit.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 30 tabletë.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:



Sipas recetës së mjekut.



Përbajtja.



Forma e tabletës.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikuva për herë të fundit në Prill 2016.