

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

MIKONAL Ovula - 100 mg (Mikonazol nitrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjera. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësitet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Cfarë është Mikonal dhe përsë përdoret
- Përpresa se të përdorni Mikonal
- Si ta përdorni Mikonal
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Mikonal
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË MIKONAL DHE PËRSE PËRDORET

Mikonal përbënë si lëndë aktive mikonazol nitrat, i cili është një antimiçotik imidazolit me veti të ngashme me ketokonazolin. Në kushte *in vitro* ai vepron kundër *Cladosporium*, *Madurella*, *Aspergillus* të *Phialophora*, *Pseudallescheria boydii* dhe baktereve gram – pozitivë, përfshirë disa stafilokokë dhe streptokokë. Një numër i madh kërpudhash të ndjeshme ndaj mikonazolit mund t'u frenohen në përgëndrimin prej 2 mikrogramë ose edhe më vogël për ml.

Mikonazoli përthihet pak përmes lëkurës ose membranave mukoze kur ai përdoret lokalisht në trajtë kreml, tretësire ose ovulash vaginale.

Mikonal përdoret në infeksionet mykotike vaginale ose vulvovaginale, të shkaktuar kryesisht nga *Candida*.

Shenjet e këtij infeksioneve përfshinë kruarje, skujje dhe sekrecione të bardha. Ovulat shkatërronjë funget që shkaktojnë këto infeksione dhe disa baktere, të cilat janë gjithashtu prezente.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI MIKONAL

Mos përdorni Mikonal në qoftë se keni mbindjeshmëri të njohur ndaj mikonazolit nitrat ose ndaj antimiçotikëve të tjera derivate të imidazolit, si dhe ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjera të ovulës. Mikonal nuk duhet t'u përdoret nga fëmijët.

Tregoni kujdes të veçantë me Mikonal

Ovulat Mikonal nuk duhet t'u përdorni për vëtëmjejim në qoftë se keni simptoma të tillë si: dhimbje barku, temperaturë të lartë ose sekrecione vaginale me erë të keqe sepse mund të bëhet fjallë për një gjendje më serioze se një kandidozë vulvovaginale.

Duhet t'u këshillohen me mjekun ose me farmacistin tuaj përpëra se ta përdorni këtë bar në qoftë se jeni duke përdorur një metodë kontraceptive si "diaphragma", prezervativ ose spermicidë sepse ovulat vaginal mund t'u dëmtojnë gomën dhe t'u ndalojnjë veprimin e këtij kontracepcioni. Duhet t'u filsni me mjekun tuaj rreth përdorimit të një tipit tjetër kontracepcioni ndërsa ju jeni duke përdorur këtë bar.

Gjatë trajtimit të zonave genitale, preferohen që edhe partneri seksual të bëjë një cikël trajtimi topik përsë arsyse parandalimi. Duhet t'jeni të sigurt që të mos infektoni të tjérat; mos i lejoni të tjérat t'u përdorin peshqirin tuaj.

Mikonal mund t'u shkaktojë një ndjesi djeqieje dhe irritim. Rastet e shfaccës së irritimit mund t'u tregojnë një reaksion mbindjeshmëri dhe trajtimi me barin duhet ndërprerë. Përdorimi për një kohë të gjatë mund t'u shkaktojë mbivendosjen e mikroorganizimeve të tjere jo t'u ndjeshmëndaj bar. Me shfaccen e mbivendosjeve Mikonal duhet ndërprerë dhe mund t'u fillohet një trajtim tjetër i përshtatshëm.

Marrja e barnave të tjera

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund t'u ndikojë ose t'u ndikohet nga Mikonal.

Ju lutemi t'u kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni t'u informoni mjekun tuaj për trajtimin me Mikonal në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.

Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj t'u jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u trajtuar me barna holluese të gjakut (antikoagulantë) të tillë si varfarina ose acenocumarol. Mikonal edhe kur përdoret lokalisht mund t'u fuqizojë veprimin e tyre. Gjithashtu, duhet treguar kujdes edhe kur mikonazoli merret njëkohësisht me hipoglicemiantë orale, fenitojinë ose simvastatinë.

Shtatëzënia dhe Ushqimi me gji

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpëra se të përdorni këtë bar në periudhën e shtatzënës ose gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijës me gji. Në periudhën e shtatzënës dhe të ushqyerjes së fëmijës me gji, ovulat vaginal mund t'u përdoren vetëm në rastet e domosdoshme dhe nën kontrollin e drejtëpërdrejtë të mjekut.

3. SI TA PËRDORNI MIKONAL

Gjithmonë përdorni këtë bar ekzaktësisht si ju ka thënë mjeku juaj. Ju duhet t'u këshilloheni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni të sigurt.

Nuk duhet t'u përdoren nga fëmijët.

Ovulat futen në thellësi të vaginës, më mirë në pozicionin shtrirë në shpinë.
 - Përdorni një ovulë çdo darkë për 7 ose 14 ditë ose një ovulë dy herë në ditë për 7 ditë, në qoftë se jua rekandoman mjeku juaj.
 - Simptomat tuaja mund të zhduken shpejt për ju duhet t'u vazhdoni përdorimin e ovulave për aq kohë sa ju ka rekandomuar mjeku. Në qoftë se në ndaloni trajtimin para se të mbarojë terapija e rekandomuar, simptomat mund t'u kthehen përmes një shpërblimi.
 - Përdorni ovulat përpëra se të shtriheni për të fjetur. Kjo ju ndihmon se qëndroni në një vend.
 - Mos i gjellësin ovulat.
 - Në rast recidivash duhet bërë mbjellje kulture dhe t'u konfirmohet diagnoza që t'u fillohet edhe një herë më vonë.

Në qoftë se keni përdorur më shumë Mikonal

Në qoftë se keni përdorur më shumë ose keni gjellitur gabimisht ovula Mikonal, ose në qoftë se fëmijët e kanë gjellëtur gabimisht këtë bar, ju lutemi t'u kontaktoni me mjekun tuaj, spitalin ose të telefonin urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshilli për veprimet që duhet t'u ndërmerrin.

Megjithatë, edhe në raste mbidozimi, tek njerëzit nuk është raportuar asnjë e dhëne e padëshiruar. Marja e një dozë më të madhe se ajo e rekandomuar nga mjeku është normalisht e padëmshme. Megjithatë ju duhet t'u kontaktoni me mjekun tuaj. Nga gjellitja mund të shfaqen: nauze, të vjella, diarre, të cilat kërkojnë trajtim simptomatik.

Në qoftë se keni haruar të përdorni Mikonal

Në qoftë se haroni një dozë, përdoni dozën në vazhdim kur të jetë koha për përdorimin e zakonshëm të saj. Mos përdorni një dozë përfshirë për të plotësuar dozën e haruar. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Mikonal mund t'u shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Ndjonjëherë ato janë serioze, ndonjëherë jo. Mos u alarmoni nga kjo listë ato që mund t'u ndalojnë anësore. Mund t'u mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Në qoftë të mjejkimt mund t'u shfaqet një ndjesi djeqieje, prurit dhe irritim vaginal, si dhe krampe pelvike, ekzantema dhe dhimbje koke. Në këto raste është e nevojshme që mjejkimi t'u ndërpritet dhe t'u fillohet një mjejkim tjetër i përshtatshëm. Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkëqësitet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'u lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI MIKONAL

Mbajeni larg fëmijëve. Mos e përdoroni Mikonal pas datës së skadencës e cilës është e shënuar në paketin.

Mos e ruani mbi 25°C. Ruajeni në paketin original për ta mbrojtur nga drita.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbënë Mikonal – ovula

Lënda vepruese është mikonazol nitrat. 1 ovulë vaginal përbënë 100 mg mikonazol nitrat. Përbërësit e tjera janë yndyrna të ngurta.

Përbajtja e paketit

Kuti me 10 ovula.

Shpjegimi i ikonave ilustruese në paketim:



Përbajtja.



Kujdes!



Me recetën e Mjekut!



Ovula.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - Shqipëri

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në
Shtator 2014.

i PACKAGE LEAFLET:
Information for the patient

MIKONAL Ovules – 100 mg (Miconazole nitrate)

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

- What Mikonal is and what it is used for
- Before you use Mikonal
- How to use Mikonal
- Possible side effects
- How to store Mikonal
- Further information

1. WHAT MIKONAL IS AND WHAT IT IS USED FOR

Mikonal contains miconazole nitrate as active substance which is an imidazole antifungal with similar activity to that of ketoconazole. In vitro, it also has some activity against *Cladosporium*, *Madurella*, some *Phialophora*, *Pseudallescheria boydii* and gram-positive bacteria including some staphylococci and streptococci. A great number of fungi sensible to miconazole can be inhibited in concentrations of 2 mcg per ml or less.

Small amounts of miconazole is absorbed through the skin or mucous membranes when it is used locally, as cream, solution or vaginal ovules. Mikonal is used in vaginal and vulvovaginal mycotic infections caused mainly by *Candida*.

The symptoms of this infection include itching, redness and white vaginal discharge. Ovules destroy fungi that cause these infections and some bacteria, which are also present.

2. BEFORE YOU USE MIKONAL

Do not use Mikonal if you have known hypersensitivity to miconazole nitrate or to any imidazole derivative antifungal agent and also to any other ingredient of the ovule. Mikonal should not be used by children.

Take special care with Mikonal

You should not use Mikonal ovules for self-medication if you have symptoms such as: abdominal pain, fever, or malodorous vaginal discharge, as a condition more serious than vulvovaginal candidiasis may exist.

You should consult with your doctor or pharmacist before using this drug if you are using a contraceptive method like "diaphragms", condoms or spermicides because vaginal ovules may damage the rubber and stop the action of this contraception. You should talk with your doctor about another method of contraception while using this drug.

During the treatment of genital areas, it is preferable that also the sexual partner has a topical treatment cycle for prevention. You should be sure not to infect the others; do not allow the others to use your towel.

Mikonal may cause burning sensation and irritation. Cases when irritation appears indicate hypersensitivity reaction and in this case the treatment should be discontinued. Long-term treatment may cause invasion of other bacteria not sensible to the drug. If suprainfection occurs, the treatment should be discontinued and another appropriate treatment may be initiated.

Taking other medicines

Concomitant treatment with other drugs can affect or be affected by Mikonal. Please, tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken other medicines, including medicines obtained without a prescription. Do not forget to inform your doctor about the treatment with Mikonal if you are given another drug during treatment.

It is particularly important to inform your doctor that you are taking medicines to thin the blood (anticoagulants) such as warfarin or acenocoumarol. Mikonal, even when used locally, may enhance their action.

Caution should be exercised also when miconazole is co-administered with oral hypoglycaemic drugs, phenytoin or simvastatin.

Pregnancy and Breastfeeding

Consult with your doctor or pharmacist before using this drug during pregnancy or breastfeeding. During pregnancy or breastfeeding, vaginal ovules should be used only in cases where it is very necessary and under the direct control of the doctor.

3. HOW TO USE MIKONAL

Always use this medicine exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

It should not be used in children.

Ovules are inserted high into the vagina, best done in the reclining position.

- Use one ovule every evening for 7 or 14 days, or one ovule twice daily for 7 days if your doctor recommends so.

Your symptoms may disappear early but you should continue using the ovules as long as your doctor has recommended you. If you stop the treatment before the recommended therapy, the symptoms may appear again.

- Use the ovules at bedtime. This will help you because you stay in one place.

Do not swallow the ovules.

In event of relapse, an antibiogram should be performed and the diagnosis should be confirmed so that another treatment may be initiated again.

If you use more Mikonal

If you use more Mikonal than you should or accidentally swallow the ovules, or if the children swallow it accidentally, please contact your doctor, the hospital or any medical care site to seek advice on the risk and the appropriate measures.

Anyway, even in cases of overdosage in humans no undesirable data have been reported. Taking a dose greater than the recommended one from your doctor is normally harmless.

Anyway, you should talk with your doctor.

If swallowed: nausea, vomiting, diarrhea may occur which may need symptomatic treatment.

If you forgot to use Mikonal

If you forget using one dose, use the next dose at its usual time. Do not use a double dose to make up a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, Mikonal may cause side effects, although not everybody gets them. Sometimes they may be serious, sometimes not. Do not worry about this list of possible side effects. None of them may appear to you.

In the beginning of the treatment vaginal burning sensation, prur