

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér përdoruesin

ALUKOL

Tableta - 500 mg (Hidroksid alumini)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se tē filloni përdorimin e barit.

- Ruanjeni këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar eshtë përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona tē tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund tē keni tē njëjtën komunikim.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose nē qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet nē këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë eshtë Alukol dhe përsë përdoret
- Përpala se tē merrni Alukol
- Si ta merrni Alukol
- Efekte anësore tē mundshme
- Si ta ruani Alukol
- Informacion i mëtejshëm.

1. ÇFARË ESHTË ALUKOL DHE PËRSË PËRDORET

Alukol përbalan si lëndë vepruese hidroksid alumini, i cili eshtë një antiacid që ul hiperaciditetin e lëngut gastrik dhe kështu mënjanon shtrëngimet në stomak tē shkaktuar nga hiperaciditeti. Veprimi përdorit fillon shpejt dhe zakonisht zgjat rreth 2 orë. Përvëç asnjësimt tē shpejtë e afatgjatë, Alukol frenon edhe veprimin e pepsinës (proteazës), mënjanon veprimin e dëmshëm tē acidit tē stomakut, i cili vepron si faktor agresiv i barrierës mbrojtëse tē mukozës.

Indikohet nē:

- mjekimin e hiperaciditetit, ulqerës së stomakut dhe duodenit, ulqerës së shkaktuar nga antiinflamatorët josteroidë, refluks ezofageal, sindrom Zollinger – Ellison, gastrit kronik dhe akut me hiperaciditet, irritimi tē mukozës së stomakut i shkaktuar nga konsumi i alkoolit, kafesë dhe duhanit. Redukton nivelin e lartë tē fosfatave në gjak që eshtë e rëndësishme nē pacientët me sëmundje veshkash tē cilët nuk eleminojnë dot nga organizmi sasinë e fosfatit tē hekurit që marrin me diëtin.

2. PËRPARA SE TĒ MERRNI ALUKOL

Mos merrni Alukol nē qoftë se:

- jeni alergjik ndaj hidroksidit tē aluminit;
- jeni alergjik ndaj ndonjëjët prej përbërësve joaktivë tē përmendur në fund tē këtij fletëudhëzues;
- vuanit nga porfiria;
- jeni nivel tē ulët tē fosfatave në gjak;
- jeni insufisencë tē rendë renale;

- pacienti eshtë nēn moshën 12 vjeç. Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i merrni tabletat. Shkonit që fillimi i shkaktuar nga mjekun tuaj dha ndiqni këshillat e dhëna. Nëse shkonit te ndonjë mjek tjetër apo dentist, njoftoni që jeni duke marrë Alukol.

Tregoni kujdes tē veçantë me Alukol

- Njoftoni mjekun tuaj nē qoftë se:
- jeni alergjik ndaj barnave të tjera, veçanërisht nē qoftë se janë nē tē njëjtën klasë barnash me Alukol;
 - jeni duke marrë barna të tjera, në veçanti antibioticë (si tetraciklina) sepse hidroksidi i aluminit redukton përrithjen e tyre nē trupin e rneriut;
 - keni nē plan tē ngeleni shtatzënë gjatë kohës që jeni duke përdorur Alukol.
- Në tē sëmurët me diëtin me pak fosfatet, dozat e larta dha ndonjëherë dozat e zakonshme, mund tē shkaktojnë largimin e fosfatave, gjë që shoqërohet me rritjen e përrithjesh dhe tē jashtëqitjes urinare tē kalçiumit, që përbën rezik pér osteomalaci.

Në tē sëmurët me insufisencë kronike tē veshkave që marrin doza relativisth tē larta tē hidroksidit tē aluminit, mund tē shfaqet gjithashtu osteomalaci dhe demencë.

Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nē qoftë se jeni duke përdorur ose keni marrë së fundmi barna të tjera, edhe ato pa recejtë. Hidroksidi i aluminit mund ta ulë biodisponibilitetin e antikolinergjikëve, diazepamit, kinoloneve, diflunisolit, digoksinës, fenotiazinave, glukokortikoidëve, indometacinës, ionizazidit, kinidinës, propranololit, përgatesave tē hekurit, tetraciklinës, vitaminave tē tretshme nē ndyrra dha fosfatave, prandaj këto barna nuk duhen përdorur asnjëherë së bashku, por pas një intervall tē paktën prej dy orësh. Antiacidët mund tē ulin përrithjen e levotiroksinës. Mund tē keni nevojë tē përdorni sasi tē ndryshme tē këtij bari ose tē merrni barna tē tjera. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshillojë.

Marrja e Alukol me ushqim dhe pije

Alukol eshtë një bar i cili rekomandohet tē merret para ose gjatë grënies.

Shtatzënë

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nē qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni tē ngeleni shtatzënë. Si shumica e barnave tē këtij illoji, Alukol nuk eshtë mirë tē përdoret gjatë shtatzënës. Mjeku ose farmacisti do tē diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së tij gjatë shtatzënës.

Ushqimi me gjji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj nē qoftë se ushqeni foshnjën me qumëshit gjiri. Hidroksidi i aluminit kalon në qumëshin e gjirit. Mjeku ose farmacisti do tē diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së tij nē qoftë se jeni duke ushqyer foshnjën me gjii apo keni nē plan tā bëni këtë.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Tregohuni tē kujdesshëm gjatë drejtimit tē automjetit ose përdorimit tē makinerive derisa tē shihni se si Alukol ndikon tek ju edhe pse s'ka tē dhëna që Alukol tē pengojë aftësitë drejtuese tē automjetit.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësít e Alukol

Ky bar përbalan laktozë. Në qoftë se keni intolerancë ndaj disa sheqernave, kontaktioni me mjekun tuaj përpala se tē merrni këtë bar.

3. SI TA MERRNI ALUKOL

Ju lutemi tē ndiqni këshillat e mjekut pér mënyrën e marrjes dha dozimin e Alukol.

Tabletat tē merren me ushqim me një gotë ujë.

0.5 - 1 g (1 - 2 tableta), 4 herë nē ditë (para ose gjatë grënies, si edhe para gjumit).

Megjithatë, mjeku juaj mund t'ju këshillojë tē merrni një dozë tjetër nē varësi tē gjendjes dhe reagimit tuaj ndaj barit.

Mjeku juaj mund t'ju kërkoi tē merrni Alukol pér një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj pér këshillë nē qoftë se nuk jeni i sigurt pér sa kohë duhet ta merrni.

Në qoftë se keni marrë më shumë Alukol:

Në qoftë se keni marrë më shumë Alukol se sasia që duhet tē merrni, ose nē qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktioni me mjekun tuaj, spitalin ose tē telefononi urgjencën pér tē marrë një mendim pér rrezikun dha këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerrin.

Në qoftë se keni harruar tē merrni Alukol:

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën nē vazhdim kur tē jetë koha pér marjen e zakonshme tē saj.

Mos merrni një dozë tē dyfishtë pér tē plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshëm mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TĒ MUNDSHME

Të gjitha barnat mund tē shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve tē mundshme anësore. Mund tē mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Njoftoni mjekun tuaj nē qoftë se ndonjë prej efekteve anësore tē mëposhtme ju shqetëson:

- të përziera;
- të vjella;
- konstipacion.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë tē përmendura nē këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI ALUKOL

Mbajeni larg fémijëve.

Mos e përdori Alukol pas datës së skadencës e cila është e shënuar nē paketim.

Mos e ruani mbi 25°C.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbalan Alukol - Tableta 500 mg:

Lënda vepruese eshtë hidroksid alumini koloidal.


Cdo tablete përbalan 500 mg hidroksid alumini koloidal. Përbërësit e tjerë janë: laktozë monohidrat, xhelatinë, vaj mente, glikolat natriumi i amidonit, stearat magnezi.

Përbajtja e paketimit:
Kuti me 30 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese nē paketim:



Pa rekondim tē mjekut.



Mosha e përdorimit mbi 12 vjeç.



Përbajtja.



Kujdes.



Forma e tabletës.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dha prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.

Rruga "Myslym Keta"

Tel./Fax: 00 355 4 23 89 602

Tiranë - Shqipëri

Ky fletëudhëzues u rishikuva pér herë tē fundit nē Qershorr 2015.

CROPING AREA 12 x 19 cm

PAY ATENTION, all the layers are visible. If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.