

**i** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion pér përdoruesin

# ANABOFARMA

Tableta - 5 mg  
(Metandienon)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se tē filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është pëershkruar pér ju. Mos e jepni tek persona tē tjerë. Mund i'dëmtojë ata edhe pse mund tē kenë tē njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Anabofarma dhe përsë përdoret
- Përpara se tē merrni Anabofarma
- Si ta merrni Anabofarma
- Efekte anësore tē mundshme
- Si ta ruani Anabofarma
- Informacion i mëtejshëm.

## 1. ÇFARË ËSHTË ANABOFARMA DHE PËRSE PËRDORET

Anabofarma përbën lëndën vepruese metandionon (metandrostenolon). Ai ka veti anabolizuese, tē cilat janë më tē theksuara se efektet e tij androgjenike. Kjo përgatesë shton sintezën protidike, pengon largimin e kalciumit dhe tē azotit nga veshkat dhe i kundërshton efektet e padëshirueshme katabolizuese penguese, tē shkaktuar nga mjekimi me hormone adrenokortikale me veprim tē zgjatur. Metandrostenolon nxit formimin e lëndës themelore tē kockave, kusht i domosdoshëm pér shtimin e rezervave tē kalciumit tē skeletit. Efekti anabolizues shfaqet me shtimin e oreksit, me shtimin në peshë dhe përmirësimin e gjendjes së përgjithshme.

**Anabofarma – tableta – 5 mg** gjen përdorim në sindromat dhe sëmundjet ku nevojiten efekte anabolizuese e katabolizuese dhe një veprim rindertues i përgjithshëm, si: konvaleshencë pas infeksioneve tē rënda, pas operacioneve dhe lindjes; rënje e gjendjes së përgjithshme pas sëmundjeve infektive kronike; gjendje dobësie tē këputjeje; peshë e pamjaftueshme; dobësi patologjike; kaheksi; hipertroidizëm; osteoporozë; proces i dëmtimit tē kockave; vonesë e konsolidimit tē fraktrave; midistrofi; humbie proteinore nga veshkat, zorrët dhe lëkura (nefroza, sindroma tē humbjes proteinore intestinale, djegje etj.); mjet ndihmës i disa masave terapeutike, si: kortikoterapija, mjekimi citotoksik, radioterapi. Është përdorur edhe në çregullimet e rritjes në foshnjet, fëmijët dhe tē rinjtë.

## 2. PËRPARA SE TĒ MERRNI ANABOFARMA

### Mos merrni Anabofarma në qoftë se:

- jeni i mbindjeshëm (alergjik) ndaj metandienonit ose ndaj ndonjëjrit prej përbërërsve tē tjerë tē Anabofarma;
- vuni nga kanceri i prostatës;
- vuani nga kanceri i gjirit;
- keni hiperkalcemi (nivel i lartë i sasisë së kalciumit në gjak);
- keni hiperkalciuri (nivel i lartë i sasisë së kalciumit në urinë);
- keni probleme tē rënda me mëlçinë ose me veshkat; jeni në periudhën e shtatzënës;
- jeni në periudhën e ushqyerjes së fëmijës me gji. Anabofarma konsiderohet e pasigurtë në moshat pediatrike.

Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i merrni tabletat, shkonit dhe flisni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna.

### Tregoni kujdes tē veçantë me Anabofarma

Njoftoni mjekun tuaj para se tē përdorni Anabofarma nëse:

- jeni alergjik ndaj barnave tē tjerë, veçanërisht në qoftë se janë në tē njëjtën klasë barnash me Anabofarma.
- Anabofarma duhet përdorur me kujdes në tē sëmurët:
  - me çregullime kardiovaskulare;
  - me dëmtim tē funksionit tē veshkave ose tē mëlçisë;
  - me epilepsi;
  - me migrenë;
  - me diabet ose gjendje tē tjerë tē cilat mund tē rëndohen nga mbajtja e mundshme e lëngjeve.

### Marrja e barnave tē tjerë

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna tē tjerë, edhe ato pa recetë. Informoni mjekun tuaj në qoftë se jeni duke marrë ndonjë prej këtyre barnave:

- antikoagulues kumarinikë dhi indandionikë;
- oksifenzibazon, sepse metandiononi mund tē rrissë përqëndrimet plazmatike tē tij;
- insulinë, sepse metandionioni mund tē rrissë efektet e saj në uljen e nivelit tē glukozës në gjak.

Këto barna mund tē ndikohen nga Anabofarma, ose mund tē ndikojnë në mënyrën se si ajo vepron. Mund tē keni nevojë tē përdorni sasi tē ndryshme tē këtij bari ose tē merrni barna tē tjerë. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshilloj.

### Marrja e Anabofarma me ushqim dhe pije

Nuk ka tē dhëna që ky bar mund tē ndërverpojë me ushqimin dhe pijet.

### Shtatzënë

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni tē ngeleni shtatzënë. Si shumica e barnave tē këtij lloji, Anabofarma nuk rekomandohet tē përdoret gjatë shtatzënës. Mjeku ose farmacisti do tē diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së saj gjatë shtatzënës.

## Ushqimi me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësh gjiri. Ky bar kalon në qumëshin e gjirit. Mjeku ose farmacisti do tē diskutojnë mbi rreziqet dhe përfitimet e marrjes së tij në qoftë se jeni duke ushqyer foshnjën me gji apo keni në plan ta bëni këtë.

## Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Tregohuni tē kujdesshëm gjatë drejimit tē automjetit ose përdorimit tē makinerive derisa tē shihni se si Anabofarma ndikon tek ju. Gjithsesi, nuk ka tē dhëna që tē tregojnë se Anabofarma pengon aftësitë pér tē drejtuar automjetin.

## Informacione tē rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Anabofarma

Ky bar përbën laktozë. Nëse ju është thënë nga mjeku juaj që keni intolerancë nga disa sheqerna, kontaktoni mjekun tuaj përpara se tē merrni këtë bar.

## 3. SI TA MERRNI ANABOFARMA

Gjithmonë merrini tabletat Anabofarma vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se ndjeni që efektet e saj janë shumë tē forte ose shumë tē dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Këshillohet që tabletat t'i merrni në tē njëjtën orë çdo ditë.

Doza mesatare fillestare në tē rritur është 10 mg në ditë (5 mg, 2 herë në ditë). Doza mbajtëse zakonisht është 5 mg në ditë. Në sëmundjet e rënda mund tē përdoren doza diotë më t'arta, p.sh. 20 – 30 mg në ditë, në doza tē ndara.

Megjithatë, mjeku juaj mund t'ju këshillojë tē merrni një dozë tjetër në varësi tē gjendjes tuaj dhe reagimit ndaj barit.

Mjeku juaj mund t'ju kërkojë tē merrni Anabofarma pér një kohë më tē gjatë. Pyesni mjekun tuaj pér këshillë në qoftë se nuk jeni i sigurt pér sa kohë duhet tē merrni.

Tabletat Anabofarma duhet tē gjelliten tē plota me një gotë ujë.

## Në qoftë se keni marrë më shumë Anabofarma

Në qoftë se keni marrë më shumë Anabofarma se sasia që duhet tē merrnit, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni mjekun tuaj, spitalin, ose tē telefononi urgjencë pér tē marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerrin.

## Në qoftë se harroni tē merrni Anabofarma

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha pér marrjen e zakonshme tē saj.

Mos merrni një dozë tē dyfishtë pér tē plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund tē shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve tē mundshme anësore. Mund tē mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore tē mëposhtme ju shqetëson:

- efekte tē padëshirueshme në veprimtarinë e tij metabolizuese si: shtrit i mbajtjes së azotit, shtrit i mbajtjes së natriumit dhe ujit, edema;
- shtrit i vaskularizimit tē lëkurës;
- hiperkalçemi;
- dëmtimi tē tolerancës ndaj glukozës;
- shtrit i rritjes së kockave dhe peshës skeletore;
- iktër dhe hepatit kolestatik;
- tumore hepaticë;
- tek meshkuit, atrofi testikulare, oligo dhe azospermë, hipertrofi e prostata, gjinekomasti, priapizëm; tek femrat, virilizim si: hirsutizëm, trashje e zërit, alopeci, çregullime menstruale; në tē dy seksët, modifikime tē libidos, akne në moshën prepuberalë, kockëzim i kërcit tē rritjes, poliglobuli, hepatotoksicitet, çregullime gastrointestinale.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë tē përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 5. SI TA RUANI ANABOFARMA

Mbajeni larg fëmijëve.

Mos e përdoni Anabofarma pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C.

## 6. INFORMACION I MËTEJSHËM

### Cfarë përbën Anabofarma

Lënda vepruese është metandionon (metandrostenolon).

Cdo tabletë përbën 5 mg metandionon.

**Përbërësit e tjerë** janë: amidon, laktozë monohidrat, xhelinatinë, stearat magnezit.

### Përbajtja e paketit

Kuti me 30 tableta

### Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:

According to medical prescription.

Bari nuk mund tē merret gjatë shtatzanisë.

Përbajtja. Kujdes.

Forma e tabletës.

### Mbajtësi i autorizimit tē tregtimit dhe prodhuesi:



**PROFARMA Sh.a.**  
Rruja "Myslym Keta"  
Tel.: 00 355 4 23 89 602  
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikuva pér herë tē fundit në Korrik 2015.

CROPING AREA 12 x 19 cm

**PAY ATENTION**, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.

SPECIFICATION