

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

ATROPISE

Tretësirë me pika për sy 1% - 10 ml
(Atropinë sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se tè filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund tè keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është pëershkuar për ju. Mos e jepni tek persona të tjera. Mund t'i démtojë ata edhe pse mund tè keni të njëjtat simptoma me ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tè njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Atropine dhe përsë përdoret
- Përparrë se tè përdorni Atropine
- Si ta përdorni Atropine
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Atropine
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË ATROPISE DHE PËRSE PËRDORET

Atropina është një alkaloid i beladonës, prototip i antimuskarinikëve, antagonist kompetitiv selektiv i receptorëve M kolinerigjikë. Ajo është një antagonist kompetitiv i acetilkolinës në fundet e nervave postganglionikë, kështu që ndikon në receptorët e gjindrave endokrine, në muskujt e lëmuar, në muskujt kardiakë dhe ato të sistemit nervor qëndror.

Blllokimi i receptorëve M të muskujve cirkularë të irisit shkakton midriazë, ndërsa blllokimi i receptorëve M të muskujve cilialë shkakton cikloplegji.

Ajo përthitet nga membranat mukoze, lëkura dhe sytë. Atropina eleminohet shumë shpejt nga qarkullimi i gjakut si dhe gjysmëjata e eleminimit të saj është rreth 4 orë. Atropina metabolizohet në mëlci dhe jashtëqit me urinë si bar i pandryshuar dhe si metaboli.

Atropina përdoret për të prodhuar midriazë dhe cikloplegji për ekzaminimet oftalmike.

Atropine gjithashtu përdoret në trajtimin e iritit dhe uveitit.

2. PËRPARA SE TÈ PËRDORNI ATROPISE

Mos përdorni Atropine në qoftë se:

- jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj atropinës ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjera të barit, pasi mund tè shfaqen reaksione alergjike, përfshire anafilaksinë;
- vuani nga glaukoma me kënd të ngushtë ose forma të tjera të glaukomës;
- mbani lente kontakti, sepse duke tharë sekrecionet e syrit vështirëson mbajten e tyre;
- vuani nga miastenia gravis;

- drejtoni automjetin ose përdorni makineri, shiko paragrafin "Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive".

Duhet tè shmangni përdorimin e Atropine tek fëmijët, veçanërisht në fëmijët që kanë dëmtim të trurit, paralizë spastike ose vuajnë nga sindroma Down.

Tregoni kujdes tè veçantë me Atropine në qoftëse:

- jeni duke u trajtuar me antimuskarinikë të tjera;
- trajtoheni njëkohësisht me barna kolinomimetike dhe frenues të kolinesterazës, pasi këto antagonizojnë efektet e atropinës;
- jeni shtatzënë ose po planifikoni një shtatzëni. Tregojini menjëherë mjekut tuaj në qoftë se mbeteni shtatzënë në kohën e mjekimit me atropinë;
- ushqeni fëmijën me gjë.

Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë së fundmi ose mund tè merrni barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Ndërveprimet klinikishë të rëndësishme me barnat e tjera, vërehen pas përthithjes sistemik të atropinës. Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju deni duke u trajtuar me:

- antimuskarinikë të tjera (si p.sh. bromfeniraminë, klorfeniraminë, klemastinë, dimenhidrinat, prometazinë, tiroidazinë, amitriptilinë, kloripraminë, amoksapinë, klozapinë, dizopiramid), të cilët risin veprimet M-kolinolitike të atropinës;
- barna kolinomimetike dhe frenues të kolinesterazës, të cilat antagonizojnë efektet e atropinës.

Shtatzënia dhe ushqimi me gjë

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përparrë se tè merrni këtë bar.

Shtatzënia

Atropina e kalon placentën, por nuk dihet që tè jetë e dëmshme. Megjithatë rekamandohet tè shmanget përdorimi i saj në shtatzëni. (Kategoria C)

Ushqimi me gjë

Edhe pse atropina kalon në sasi të vogla në qumëshinë e gjirit, rekamandohet tè shmanget përdorimi i saj gjatë ushqimit me gjë.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Atropine – tretësirë me pika për sy 1% (tretësirë oftalmike) mund tè shkaktojë efekte anësore të tillë si: turbullimi i shikimit, marrje mendsh dhe efekte të tjera që ndikojnë në aftësinë tuaj për të drejtuar automjetin ose përdorur makineri. Prandaj gjatë trajtimit me Atropine duhet tè evitonit përdorimin e automjeteve dhe makinerive.

Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Atropine

Atropine – tretësirë me pika për sy 1% përbën klorur benzalkoni i cili mund tè shkaktojë irritim në sy. Shmangni kontaktin me lentin e buta të kontaktit. Hiqni lentin e kontaktit përparrë aplikimit dhe prisni të paktën 15 minuta përparrë se i rivendosni. Kloruri i benzalkonit njihet për çngjyrosjen e lenteve të buta të kontaktit.

3. SI TA PËRDORNI ATROPISE

Gjithmonë përdoren Atropine ekzaktësisht si juaj përshkruan mjekun juaj. Konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni i sigurt.

Në irit dhe uveit

Tek të rriturit: 1-2 pika tretësirë 1% në sy, 2 – 3 herë në ditë.

Për prodhimin e midriazës dhe cikloplegjisë

Tek të rriturit: 1 pikë tretësirë 1% në sy, 1 orë para procedurës.

Duhet tè shmangni përdorimin e Atropine tek fëmijët, veçanërisht në fëmijët që kanë dëmtim të trurit, paralizë spastike ose vuajnë nga sindroma Down.

Mënyra e administrimit të Atropine – tretësirë me pika për sy 1%, është:

- Lajini mirë duart.
- Mos e prekni vendin e daljes së pikave.
- Shikoni lart.
- Ulni kapakun e poshtëm të syrit për të krijuar një ulluk.
- Vendosi pjesën e sipërme të shishes plastike sa më afër ullukut, por pa e prekur atë.
- Hidhi sasinë e duhur të pikave në ulluk.
- Mbyllni syrin për rrëth 2 minuta.
- Tretësira e tepërt që del mund të hiqet me një garzë sterile.

Pikat në sy mund tè shkaktojnë ndonjë ndjesi djejjeje, por kjo ndonjë nuk zgjat më shumë së disa minuta. Në tò kundërt konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Në qoftë se keni përdorur më shumë Atropine:

Në qoftë se keni përdorur më shumë Atropine se sasia që duhet tè përdornit, ose në qoftë se fëmijët e kanë përdorur gabimisht këtë bar, ju lutemi tè kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rezikun dhe këshilla për veprimet që duhet tè ndërrerën. Rrallë ndodhin efekte anësore nga mbidozimi i Atropine – tretësirë me pika për sy 1%. Megjithatë, efektit anësore që mund tè ndodhin si pasojë e mbidozimit me Atropine përfshijnë: efekte antikolinergjike, çregullime kardiovaskulare, (takikardi, arritmia atriale, çregullime atrio –ventrikulare) dhe çregullime në sistemin nervor qëndror (konfuzion, shqetësimi, nervozizëm, halucinacione dhe konvulsioni).

Në qoftë se keni harruar tè përdorni Atropine:

Në qoftë se harroni një dozë Atropine, përdoren atë sa më shpejt. Në qoftë se është pothuajse koha për dozinë tjetër, përdoren atë dhe kaloheni dozën e humbur. Mos përdorni dozë ekstra Atropine për të plotësuar dozën e humbur.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË ATROPISE

Si të gjithë barnat e tjera, Atropine mund tè shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Efektit anësore tè shkaktuar nga atropina janë

kriesisht tè lidhur me veprimin e saj farmakologjik tek receptorët muskarinikë, dhe në doza të larta, tek ata nikotinikë. Këto efekte varen nga doza dhe zakonisht janë të rikthyeshëm kur trajtimi ndërpritet.

Efektit anësore më të zakonshme të Atropine – tretësirë me pika për sy, janë:

- zgjerim i pupilës së syrit (midriazë), çregullim i pamjes, paralizë e akomodimit d.m.th. cikloplegji dhe rritje e tensionit intrakular;
- dermatit kontaktive dëshirat e dermatit ekzematoid;
- gjithashtu temperaturë e lartë, skruje e lëkurës, urtikarie, të vjella, konfuzion, lodhje, drobitje, përgjumje, halucinacione, takikardi, tharje e gojës, etj.

Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore ose çdo efekt tjeter anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.

5. SI TA RUANI ATROPISE

Mbajeni larg fëmijëve.

Mos e përdorni Atropine pas datës së skadimit e cilështë e shënuar në paketim.

Ruajeni në një vend tè thatë e të freskët, në temperaturë nën 25°C.

Mos e ruani në ngrirje.

Ruajeni në paketimin originalin për ta mbrojtur nga drifa dhe nga lagështia.

Afat i përdorimit pas hapjes është 2 javë.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Atropine

Lënda vepruese është atropinë sulfat.


1 ml tretësirë përmban 10 mg atropinë sulfat.

Përbërës të tjera: klorur benzalkoni, ujë për injekzion.

Përbajtja e paketimit

Kuti kartoni me shishe plastike sterile 10 ml.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:



Sipas recetës së mjekut.



Përbajtja.



Kujdes.



Pika për sy.

Mbjatësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPÉRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Korrik 2013.

