

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

GENTAKOL

Tretësirë me pika pér sy - 0.3 %
(Gentamicinë sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues pérpara se të fillojn pérdomin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshtkuar pér ju. Mos e jepni tek persona tē tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund tē kenë tē njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Gentakol dhe përse përdoret
- Përparrë se tē përdorni Gentakol
- Si ta përdorni Gentakol
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Gentakol
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË GENTAKOL DHE PËRSE PËRDORET

Gentakol është një produkt farmaceutik që ka si lëndë aktive gentamicinën sulfat. Gentamicina është një antibiotic aminoglikozidik, veçanërisht aktiv kundër bacileve aerobë gram-negativë, sidomos Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, Enterobacter dhe Citrobacter. Gentamicina nuk vepron kundër baktereve anaerobë.

Gentakol – tretësirë me pika pér sy përdoret pér mjekimin e infeksioneve bakteriale tē syrit tē shkaktuar nga mikroorganizma gram-positivë dhe gram-negativë si: konjunktivitë infektiv, keratiti, blefaritit. Përdoret edhe pér profilaksë para dhe pas kirurgjisë.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI GENTAKOL

Mos përdorni Gentakol:

- në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj aminoglikozidave ku bën pjesë gentamicina ose ndaj ndonjërit prej përbërësve tē tjerë tē barit pasti mund tē shfaqen reaksione alergjike, përfshirë dhe anafilaksinë. Reaksionet alergjike nga aminoglikozidët nuk janë tē zakonshme, por, kur ndodhin, shpesh janë tē kryqëzuara brenda grupit kimik;

Tregoni kujdes tē veçantë me Gentakol

- Pyesni mjekun tuaj pérpara se tē përdorni Gentakol.
- Në qoftë se gjatë trajtimit mi Gentakol nuk keni lehtësim tē simptomave, bëni një ekzaminim baktereologjik dhe një test tē rezistencës ndaj gentamicinës. Në këto raste, si dhe në rast se shfaqet irritim apo mbindjeshmëri ndaj ndonjërit

prej përbërësve tē preparatit, duhet ndaluar trajtimi me Gentakol dhe tē merren masa tē tjera tē përshtatshme.

- Hiqni lënetet e kontaktit dhe zëvendësosjin ato me syze gjatë trajtimit tē infeksioneve tē syrit.
- Si tē gjithë antibiotikët e tjerë, shmangji trajtimin pér një kohë tē gjatë, sepse mund tē shkaktojë shumë e baktëreve rezistente.
- Mos vazhdoni përdorimin e Gentakol në rast tē shfaqjes tē një infekzioni tjetër, por zëvendësosjeni atë me një trajtim tjetër tē përshtatshëm.
- Shmangji përdorimin e Gentakol, në mënyrë që tē mos shfaqet fenomeni i rezistencës.

Marrja e barnave tē tjera:

Ju lutemi tē kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna tē tjerë, përfshirë ato tē marra pa recetë. Mos harroni tē informoni mjekun tuaj pér trajtimin me Gentakol në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.

Ndërveprimet medikamentozë klinikisht tē rëndësishme vërehen pas përthithjës sistemike tē Gentakol.

Përdorimi i barnave tē tjerë si: kanamicinë, neomicinë, streptomisinë, ciklosporinë, aciklovir, polimiksinë B, kolistinë, vankomicinë, cisplatinë dhe fludarabinë shton rezikun e nefrotoksicitetit. Duhet mënjanuar përdorimi i njëkohshëm i gentamicinës me barna tē tjerë ototoksikë siç janë acidi etakrinik dhe ndoshta furosemidi sepse mund tē rrisin toksicitetin e aminoglikozidëve.

Shtatzënia dhe Ushqimi me gji

Kërkoni këshillën e farmacistit ose tē mjekut pérpara se tē përdorni këtë bar.

Siguria e përdorimit tē këtij bari në shtatzëni dhe laktacion nuk është vërtetuar ende. Megjithatë duhet tē evitohet përdorimi si gjatë shtatzënisë dhe gjatë ushqyerjes me gji.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Në raste tē rralla pacienti mund tē ankohet pér ndjesi djegjeje ose shpimi në sy, si dhe tē ketë çregullime tē shkimit. Në këto raste nuk lejohet drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e Gentakol

Gentakol përmban klorur benzalkoni i cili mund tē shkaktojë irritim në sy. Shmangji kontaktin me lënet e buta tē kontaktit. Hiqni lënetet e kontaktit pérpara aplikimit dhe prisni tē paktën 15 minuta përparrë se t'i rivendosni. Kloruri i benzalkonit njihet pér çngjyrjen e lenteve tē buta tē kontaktit.

3. SI TA PËRDORNI GENTAKOL

Gjithmonë përdoren Gentakol sipas këshillës së mjekut tuaj. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktin me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Gentakol janë shumë tē fortë ose shumë tē dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Gentakol përdoret lokalish tē sy në tē rritur dhe fëmijë.

Në infeksionet e lehta dhe tē mesme pikohen 1-2 pika në syrin e sémurë çdo 4 orë (deri në 6 herë në ditë). Në infeksionet e rënda duhet tē pikohen 2 pika çdo orë.

Mënyra e administrimit

- Lajini mëri duart
- Mos e prekni vendin e daljes së pikave
- Shikoni lart
- Ulin kapakun e poshtëm tē syrit pér tē krijuar një ulluk
- Vendosni pikatoren sa më afër ullukut, por pa e prekut atë
- Hidhni sasinë e duhur tē pikave në ulluk
- Mbyllni syrin pér rreth 2 minuta
- Tretësira e tepert që del mund tē hiqet me një garzë sterile

Pikat nësy mund tē shkaktojnë ndonjë ndjesi djegjeje, por që ndjenjë nuk zgjat më shumë se disa minuta. Në tē kundërt konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Në qoftë se keni përdorur më shumë Gentakol:

Në qoftë se keni përdorur më shumë Gentakol, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose tē telefononi urgencën pér tē marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerren.

Në qoftë se keni harruar tē përdorni Gentakol:

Në qoftë se harroni tē përdorni një dozë, përdorni dozën pasardhëse kur tē jetë koha pér përdorimin e zakonshëm tē saj. Mos përdorni një dozë tē dyfishët pér tē plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË GENTAKOL

Si tē gjithë bartat e tjerë, Gentakol mund tē shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë tē lidhura me dozën dhe zhduken kur doza reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund tē ndodhin në fillim tē trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit. Efektet anësore më tē zakonshme tē Gentakol janë ato tē mbindjeshmërisë, tē cilat shfaqen me tē kruara, skuguje, edemë lokale. Në raste tē rralla pacienti mund tē ankohet pér ndjesi djegjeje ose shpimi në sy, si dhe tē ketë çregullime tē shkimit. Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkëqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI GENTAKOL

Ruajeni në një vend tē thatë dhe tē freskët në një temperaturë jo më shumë se 25°C. Duhet tē ruhet nga drita dhe lagështira.

Mos e ruani në ngrijje. Mos e përdorni Gentakol pas datës së skadencës. Mbajeni barin në një vend tē sigurt ku fëmijët nuk mund ta marrin sepsë ai mund t'i dëmtojë ata.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Gentakol– pika pér sy

Lënda vepruese është gentamicinë sulfat. 1 ml tretësirë pika pér sy përmban gentamicinë sulfat ekuivalent me 3 mg gentamicinë bazë (0.3%). Përbërës tē tjerë janë: klorur benzalkoni, klorur natriumi, hidrogjen fosfat dinatriumi, dihidrogjen fosfat natriumi, ujë i pastruar dhe i sterilizuar.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 1 shishe plastike sterile 10 ml.

Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:



Sipas recetës së mjekut.



Përbajtja.



Kujdes.



Pika pér sy.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Kata"
Tel.Fax.: 00355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua pér herë tē fundit në Tetor 2013.

