

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér patientin

MONOPAN

TABLETA 40 mg (Izosorbid 5 - Mononitrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është pëershruar pér ju. Mos jepni tek persona të tjera. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Monopan dhe përsë përdoret
- Përpara se të merrni Monopan
- Si ta merrni Monopan
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Monopan
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË MONOPAN DHE PËRSË PËRDORET

Izosorbid 5-mononitrat i përkert grupit të nitrateve me veprim vazodilatator.

Nitratet përdoren pér trajtimin dhe parandalimin e simptomave të angina pektoris (dhimbja e gjoksit) dhe gjendje të tjera të zemrës duke përfshirë insufisjencën kardiak. Angina është një dhimbje ose një shtrëngim i gjoksit i shkaktuar nga mungesa e oksigjenit që shkon në muskulaturën e zemrës. Nitratet veprojnë në dy rregj. Ato zgjerojnë arteriet të cilat çojnë gjak në muskulin e zemrës dhe relaksojnë venat të cilat kthejnë gjakun nga trupi në zemër. Të dy këto vepprime lejojnë të shkojë më shumë oksigjen në muskulin e zemrës dhe pakësojnë punën e zemrës. Në këtë mënyrë parandalohet një atak akut i anginës dhe lehtësitet dhimbja e gjoksit e shkaktuar nga angina.

2. PËRPARA SE TË MERRNI MONOPAN

- në rastet me mbindjeshmëri ndaj nitrateve
- në insufisjencë akute qarkulluese, të shqëruar me hipotension të theksuar (shok, gjendje kolapsi)
- në gjendje të shqëruar me presion intrakranial të lartë
- në insufisjencë të miokardit pér shkak të ngushtimit (p.sh. në kushte të stenozezës mitrale ose aortale, perikardite ngushtuese)
- nëkohësisht me sildenafil citrat (Viagra) sepse sildenafil mund të potenciojë efektin vazodilatator të izosorbidit duke shkaktuar hipotension të rëndë.

Tregoni kujdes të veçantë me Monopan

Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Monopan dhe sigurohuni që mjeku juaj e di që ju:

- jeni shtatzënë, ose ushqeni fëmijë me gjë
- jeni alegjik ndaj barit ose barnave të gjashëm me të (klasës së nitrateve)
- vuani nga zemra, ose keni probleme me mëlçinë ose veshkat
- vuani nga hipotensioni
- kohët e fundit keni pësuar ndonjë traumë në kokë ose hemorrhagi cerebrale
- vuani nga anemija
- vuani nga tiroïdot
- vuani nga glaukoma
- merrni barna të tjera pér të trajtuar disfunzionin erektil.

Marrja e barnave të tjera

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Monopan. Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj pér trajtimin me izosorbid mononitrat në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera vazodilatatore, bllokues të kanaleve të kalçiumit, frenues të ACE-s, beta-bllokues, antihipertensivë, antidepresivë triçiklikë, qëtësues madhorë, mund të fuqizojë efektin hipotensiv të Monopan.

Marrja e njëkohshme me dihidroergotaminë mund të rrissë biodisponibilitetin e dihidroergotaminës.

Kujdes të veçantë duhet të tregojnë patientët me artero - koronaropati sepse dihidroergotamina kundërshton efektin e nitrateve dhe mund të

çojë në ngushtim të enëve koronare.

Nuk mund të përjashtohet fakti se acidi acetilsalicilik dhe antiinflamatore të tjera josteroidë mund të zgogëlojnë përgjigjen terapeutike të Monopan.

Marrja e Monopan me ushqim dhe pije

Konsumimi i alkoolit mund të fuqizojë efektin hipotensiv të këtij bari.

Shtatzënia

Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.

Si një rregull i përgjithshëm, në tremujorin e parë të shtatzënës nuk duhet të merrni barna. Gjatë gjithë shtatzënës duhet të merrret parasysh rishku dhe përfitimi i përdorimit të tyre.

Përdorimi i këtij bari duhet të jetë i kufizuar, megjithëse nuk janë raportuar efekte në fetus. Bari duhet të përdoret në shtatzënë vetëm kur është i domosdoshëm.

Ushqimi me gjë

Nuk dihet nëse bari kalon në qumështin e gjirit. Kundrejt përmirësimi të nënës duhet të kihet parasysh rishku ndaj fëmijës.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Edhe kur bari mund të merret sipas porosisë së mjekut ai mund të ndikojë në aftësinë e pacientit pér të drejtuar automjetin ose përdorur makineri. Ky ndikim mund të ndodhë përgjithësisht në fazat e para të mjekimit, kur ndërrohet bari, ose kur është konsumuar alkool.

3. SI TA MERRNI MONOPAN

Gjithmonë merrni këtë bar sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontakti me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Monopan janë shumë të forta ose shumë të dobëta, fësni me mjekun ose farmacistin tuaj. Tabletat duhet të gjellitën me të përfitë.

Rregullat e përgjithshme:

Monopan nuk mund të përdoret pér mjekimin e krizave akute të angina pektoris, në qoftë se ato ndodhin gjatë mjekimit nitrate të tjera me veprim të shpejtë duhen përdorur. Mjekimi nuk duhet të ndërpritet menjëherë sepse ekziston rishku i një ataku.

Tabletat janë të ndashme, gjë që lejon përshtatjen e dozave sipas kërkësës.

Gjatë trajtimit pér kohë të gjatë me nitrate me veprim të ngadalët (izosorbid), tek disa pacientë mund të zhvillohet edhe tolerancë.

Angina pektoris

Trajtimi fillohet me $\frac{1}{2}$ tablete dy herë në ditë dhe doza mund të rritet me $\frac{1}{2}$ e 40 mg sipas gjendjes së pacientit.

Doza maksimale mund të arrijë deri në 80 mg në ditë.

Insufisjencë kardiak kronike

Në rastet e mjekimit të insufisjencës kardiak kronike, ai duhet të fillohet në spital, ku pacientit t'i kontrollohet gjendja hemodinamike dhe duhet të vazhdojë mjekimin në spital edhe pasi t'i jetë përcaktuar doza mbajtëse.

Fëmijët

Nuk ka të dhëna pér përdorimin e barit tek fëmijët.

Në qoftë se keni marrë më shumë Monopan

Pacienti duhet të jetë nën kujdesin e mjekut. Simptomat e mbidozimit me Monopan përfshijnë: dhimbje të forta koke, vështirësi në frysëmarje dhe gjellitje, krampe muskulore, të vjella, të përziera, diarre, ethe, zverdhje, çrrëgullim të rrahurat e zemrës, çrrëgullim në shikim dhe të dridhura.

Në qoftë se keni harruar të merrni Monopan

Në qoftë se keni harruar të merrni një dozë, merrni dozën e harruar sa më shpejt të jetë e mundur. Në qoftë se doza juaj pasardhëse është pas 2 orësh, mos e merrni dozën e humbur, por prisni orarin tjetër të marrjes së barit.

Mos merrni dyfishin e dozës.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Monopan mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Shumë të zakonshme:

Në Sistemin Nervor Qendror

Si të gjitha nitratet e tjera, Monopan mund të japë dhimbje koke, e cila vjen si pasojë e zgjerimit të enëve të gjakut dhe është në varësi të

dozës. Dhimbja e kokës dobësohet pas disa ditë terapie. Në qoftë se nuk zhduket, ajo mund të trajtohet me analgjezikë. Në rast se trajtimi me analgjezikë nuk është i efektshëm, doza e Monopan duhet të reduktohet ose të ndërpritet trajtimi me këtë bar.

Të zakonshme:

Në sistemin kardiovaskular

Skuqe në fytyrë, dobësi, hipotension postural, i cili mund të provokojë takikardi reflektore. Kjo mund të shmanget nga kombinimi me një beta-bllokues.

Të ralla:

Trakti gastrointestinal

Të përziera, të vjella.

5. SI TA RUANI MONOPAN

Mbajeni larg fëmijëve.

Mos e përdorni pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C .

Ruajeni në paketimin original pér ta mbrojtur nga drita.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Monopan
Lënda vepruese është Izosorbid - 5 - mononitrat.
Çdo tabletë përbën 40 mg izosorbid - 5 - mononitrat.

Përbërësit e tjeri janë: celulozë mikrokristalore, laktozë monohidrat, amidon misri, amidon i prexheletinzuar, stearat magnezi, dioksid silici koloidal, oksid hekuri i kuq (E 172).

Përbmajtja e paketimit
Kuti me 30 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:



Tableta të ndashme, çka lehtëson përshtatjen e dozës.

Përbmajtja. ! Kujdes. ○ Forma e tabletës.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAH) dhe prodhuesi:



Ky fletëudhëzues u formuluva në Nëntor 2013.