

FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

TRIAM H

Tableta – (50 mg + 25 mg)

(Triamteren, Hidrokortiazid)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përrapa se të filloni përdorimin e barat.

- Ruanjeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përskruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjeter. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të keni të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqesohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt ljetër anësore që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Triam H dhe përsë përdoret?
- Përrapa se të mermi Triam H
- Si ta mermi Triam H?
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Triam H?
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË TRIAM H DHE PËRSË PËRDORET?

Triam H është një bar që nxit eliminimin e ujit dhe që përdoret për vetitë antihipertensive.

Lëndet vepruese të Triam H janë triamterenit dhe hidrokortiazidit.

Ky bar përdoret:

- në presionin të lartë të gjakut (hipertension arterial)
- në rast se ka grumbullime ionormale të ujit (edema) për shkak të sëmundjeve të zemrës, mëlcisë ose veshkave
- në insufisencë kardiakë kronike.

2. PËRPARA SE TË MERRNI TRIAM H

Mos e merrni këtë bar:

- në qoftë se jeni i ndjeshtëm (alergjik) ndaj hidrokortiazidit, triamterenit, tiazideve të tjerë si dhe sulfonamideve, ose ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Triam H
- nëse keni çregullimë të renda të funksionit të veshkave (klirensi i kreatininës nën 30 ml / min.)
- nëse vuani nga një çregullim i rëndë i funksionit të mëlcisë (prekomë / koma hepatike)
- nëse mjeku ka konstatuar se në gjak keni përbmajtje të lartë ose të ulët të kaliumit, përbmajtje të ulët të natriumit ose përbmajtje të lartë të kalciumit
- nëse vëllimi i gjakut është i reduktuar (hipovolemia)
- në rast se nuk prodhohet urinë ose prodhimi i saj është shumë i reduktuar (anuri)
- nëse keni inflamacione të veshkave (glomerulonefrit)
- në shtatzënë
- gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijës me gji.

Tregoni kujdes të veçantë gjatë marrjes së Triam H:

- nëse keni çregullimë të shkallës së ulët të funksionit të veshkave (klirensi i kreatininës 30 – 60 ml / min.)
- nëse keni presion shumë të ulët të gjakut
- nëse keni çregullimë të qarkullimit të gjakut në enët e trurit (sklerozë cerebrale) ose në enët e gjakut të zemrës (sëmundje e arterieve koronare)
- nëse vuani nga sëmundja e sheqerit (diabet mellitus)
- nëse vuani nga guta ose keni nivele të larta të acidit urik në gjak
- nëse vuani nga çregullimë të mëlcisë
- nëse dyshoni për mungesë të acidit folik (p.sh. në sëmundje të rënda të mëlcisë ose në abuzimin kronik me alkoolin).

Njoftoni mjekun tuaj nëse mendoni se jeni shtatzënë (ose mund të mbeteni shtatzënë).

Pacientët me funksion të dëmtuar të veshkave

Të pacientët me funksion të dëmtuar të veshkave dozimi duhet të përshtatet sipas udhëzimeve përkështëse (shih piken 3 "Si ta mermi Triam H?"). Në çregullimë të rënda të funksionit të veshkave (klirensi i kreatininës nën 30 ml / min.), Triam H nuk duhet të përdoret sepse efekti i tij është më i pakët dhe madje mund të jetë i dëmshëm.

Të tjerë gjëra që duhet të keni parasysh

Sëmundja e sheqerit e fshehtë ose ekzistuese, ose guta, mund të përkësosohen nëse trajtimi zgjat.

Rekomandohet që në përdorimin afatgjatë të kontrollohen rregullisht nga mjeku vlerat e: sheqerit dhe acidit urik në gjak, elektroliteti në serum (mbi të gjitha janë kalium, natrium dhe kalcium), kreatinina, urea dhe yndyrmat (kolesteroli dhe trigliceridi) në serum.

Gjatë terapijisë me Triam H duhet të kujdeseni që të mermi sasi të mjaftueshme lëngjesh.

Fëmijët

Nuk të dhëna përfiksatinet dhe sigurinë e këtë bar tek fëmijët, kështu që nuk mund të jepen rekomandime përkështëse.

Të moshuarit

Nuk nevojiten të merren masa të veçanta.

Efektet nga keqpërdorimi për qëllime dopingu

Përdorimi i Triam H mund të cojë në rezultate pozitive gjatë kontrolleve për doping. Pasojat që mund të ketë në shëndet përdorimi i Triam H si agjent dopingu nuk mund të parashikohen. Pasojat e rënda për shëndetin nuk mund të përfashohen.

Marrja e barnave të tjera

Informoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se mermi / përdorni ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë edhe ato të marra pa recetë.

Veprimi i Triam H ndikon si më poshtë:

Theksim i efektit dhe theksim i mundshëm i efekteve anësore

Efekti antihipertensiv i Triam H mund të theksohet nga: diuretikët ose antihipertensivat e tjerë, barnat që përdoren në sëmundjen e arterieve koronare (nitrate), barnat antihipertensive dhe antiartirite (betablokuesit), vazodilatorët (zgorjesit e enëve të gjakut), disa barna gjumësjejëllese (barbiturate), barna për trajtimin e sëmundjeve mendore (fenotiazina, antidepresive triciklike) dhe nga alkooli.

Gjatë trajtimit të njëkohshëm me Triam H dëshira që ACE - inhibitor (bar që përdoret në hipertension dhe insufisencë kardiakë, p.sh. kaptopril, enalapril), në fillim t'i tij, mund të ndodhë rënje e theksuar e presionit të gjakut si dhe përkësësim i funksionit të veshkave.

Kështu që trajtimi me Triam H duhet të ndërpitet 2 – 3 ditë përpëra fillimi të një terapije me ACE - inhibitorë, ACE - inhibitor duhet të dozohet me kujdes. Marrja e njëkohshme e kripëravë të kaliumit ose barnave të tjera që kursejnë kalumin, si ACE - inhibitorët, rrit rishkon pë nivele shumë të larta të kalumit në serum.

Nga marrja gjithashtu e barnave që cojnë në reduktim të natriumit, rritet rishkon pë nivele shumë të larta të kalumit, përmes gjakut.

Dobësim i efektit

Kombinimi i Triam H me disa barna që përdoren kundër dhimbjes dhe inflamacionit (salicilate ose antireumatikë josteroïd, p.sh. indometacinë, diklofenak), mund të ulejë veprimin antihipertensiv dhe diuretik të Triam H. Tek pacientët tek të cilat sasia e gjakut qarkullues është e ulët për shkak të diurezës së fuqishme nga Triam H, dhënia e njëkohshme e antiinflamatorëve josteroïd mund të shkaktojë insufisencë renale akute. Kolestipoli dhe kolesterolina (barna për uljen e nivelit të kolesterolit) redukojnë përhershjen e Triam H.

Triam H ndikon si efektin e barnave të mëposhtëm:

Theksim i efektit dhe theksim i mundshëm i efekteve anësore

Nëse kombinohet Triam H me barna që shkaktojnë humbje të kalumit dhe magnezit, p.sh.: diuretikë që ekskretojnë kalumin, kortikosteroidë, ACTH (hormon), laksativë (përdorim kronik), amfotericinë B (bar kundër mykut), karbenoksolon (bar kundër inflamacionit të mukozës së gjosës), penicilinë G (antibiotik) dhe salicilate (analgezikë), veprimet dhe efektet anësore të glikozideve kardiakë mund të theksohen.

Gjatë marrjes së njëkohshme të Triam H dhe citostatikëve (p.sh.: ciklofosfamid, fluorouracil, metotrexat), efektet e tyre mielosupresive mund të theksohen.

Salicilatet në dozë të larta, të kombinuara me Triam H, mund të shkaktojnë dëmtim të të theksuar të sistemit nervor qëndror.

Marrja e njëkohshme e Triam H e barnave që relaksojnë muskujt (morelaksantët e tipit të kurarave), thikson dhe zgjat veprimin e tyre. Në rastin kur Triam H nuk mund të ndërpitet për fillimit të këtyre barnave, mjeku anestezist duhet të njoftohet për trajtimin me Triam H.

Eziston një rishkëndështim rritur për shfaqjen e niveleve të ritritura të sheqerit në gjak nëse merrni njëkohshëm Triam H dhe betablokues.

Dobësim i efektit

Efekti i insulinës, antidiabetikëve orale, barnave që ulin nivelet e acidit urik si dhe efekti i simpatomimetikëve (adrenalinë, noradrenalinë), mund të dobësohet nga Triam H.

Ndërveprime të tjera të mundshme

Nga marrja e njëkohshme e metildopës (antihipertensiv), janë përskruar raste të veçanta me hemolizë (dëmtimi i qelizave të kuqe të gjakut) për shkak të formimit të kundërturave ndaj hidrokortiazidit.

Përdorimi i njëkohshëm i Triam H dëshira që kundërshtim i eliminimin e kinidinës.

Marrja e Triam H me ushqime dhe piqe

Gjatë trajtimit me Triam H, mundësishëm nuk duhet të pini alkool, sepse alkooli redukon aftësinë tuaj për të reaguar.

Shqatzenja dhe Ushqimi me gjë

Kërkoni këshillen e mjekut ose të farmacistit përrapa se të mermi / përdorni çdo bar.

Shqatzenja

Njoftoni mjekun tuaj nëse mendoni se jeni shtatzënë (ose mund të mbeteni shtatzënë). Mjeku do t'ju rekomandojë të ndërpisni Triam H përrapa shqatzenës ose sa më parë pasi mësoni se jeni shtatzënë dhe mund t'ju japoj një bar tjetër, sepse marrja e Triam H mund të dëmtojë rëndë fetusin.

Ushqimi me gjë

Gjatë periudhës së ushqyerjes me gjë, nuk duhet të mermi Triam H.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Trajtimi me këtë bar kërkon kontroll të rregullit mjekësorë.

Reaksionet që shfaqen janë individuale, por mund të shkojnë deri në ndikim në aftësinë për të reaguar, për të drejtuar automjetin, për të punuar me makineri apo pa një pikëmbëshetje të sigurt. Kjo vlen më shumë në fillim të trajmit, kur rritet doza dhe ndërrohet preparati si dhe në ndërvëprimin me alkolin.

Informacione të rëndësishme për disa nga përbërësit e Triam H

Ky bar përbën laktozë. Ju lutemi të mermi Triam H vëtmen pasi t'esi folur me mjekun tuaj nëse jeni në dijeni se vuani nga intoleranca ndaj disa sheqernave.

3. SI TA MERRNI TRIAM H?

Merrni Triam H gjithmonë sipas udhëzimit të mjekut. Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj nëse nuk jeni i sigurt.

Nëse nuk përskrhuhet ndryshe nga mjeku, doza e zakonshme është:

Hipertension

Në fillim të trajtimit merrni 1 tabletë në mëngjes dhe 1 tabletë në drekë.

Në trajtimin afatgjatë mjafton 1 osë ½ tabletë në mëngjes.

Edema

Në fillim të trajtimit merrni 1 ose 2 tabletë në mëngjes dhe në drekë. Më pas, doza vendoset në përpunje me gjendjen e pacientit. Si dozë mbajtëse mjafton ½ tabletë në ditë ose 1 tabletë në çdo dy ditë (në mëngjes).

Në përpunje me nevojat e pacientit doza mund të rritet deri në 2 tabletë në ditë (1 tabletë në mëngjes dhe një në drekë).

Insufisencë kardiakë

Dozë përcaktokohet në përpunje me gjendjen fizike të pacientit. Rol të rëndësishëm i lunë kontrolli i regjullit i peshës dhe përcaktimi i një peshe të dëshiruar.

Merret 1 tabletë në ditë në mëngjes ose 2 tabletë në ditë (në mëngjes dhe në drekë).

Dozimi për pacientët me shkallë të ulët dëmtimi të funksionit të veshkave:

| Kilogramë i kreatininës [ml/min] | Kreatinina në serum [mg/100 ml] | Tableta / ditë (maksimumi) |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 100 – 75 | deri në 1.3 | 2 x 1 |
| 75 – 50 | 1.3 – 1.5 | 1 x 1 |
| 50 – 30 | 1.5 – 1.8 | 1 x ½ |

Pacientët me vlera të kreatininës në serum 1.5 – 1.8 mg/100 ml që i korrispondonjë një klirensi të kreatininës prej 50 – 30 ml/min. nuk duhet të marrin më shumë se ½ tabletë në ditë.

Mënya e përdorimit

Merrni tabletat pëtë plota, me sasi të mjaftueshme lëngu (preferohet me një gotë ujë), pas ushqimit. Mos i merrni tabletat duke qëndruar në pozicionin shtrirë.

Kohëgjata e përdorimit

Trajtimi me Triam H është zakonisht afatgjatë. Mjeku do t'ë përcaktojë se përsa kohë do t'ë mermi Triam H. Teknologjia e përdorimit është rritja e shumës së larta të këtij bar.

Në qoftë se keni marrë më shumë Triam H sesa duhet

Kontaktoni menjëherë mjekun. Ai do t'ë marrë masat e nevojshme.

Në qoftë se keni haruar të merrni Triam H

Mos merrni një dozë të dyshëm së poshtë përrapështëse më shumë së lora përdorimin e këtij bar.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si t'ë gjitha barnat e tjera, edhe ky bar mund t'ë shkaktuar rënieve të skeletit si poshtë:

| Shumë të zakonshme | Ndodhin në më shumë se 1 në 10 përdorues |
|--------------------|--|
| Të zakonshme | Ndodhin në 1 deri 10 përdorues nga 100 |
| Të ralla | Ndodhin në 1 deri 10 përdorues nga 1,000 |
| Shumë të ralla | Ndodhin në 1 deri 10 përdorues nga 10,000 |
| Të panjohura | Shpeshësia nuk mund t'ë vlerësohet nga t'ë dhë |