

 FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

TUSIPEKTOL

SHURUP

**100 g (Kodeinë Fosfat Hemihidrat,
Benzaldehid, Ekstrakt Fluid Balsam
Toluje, Ekstrakt i Lëngshëm Timusi)**

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpëra se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkëqeshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Tusipektol dhe përsë përdoret
- Përpëra se të merrni Tusipektol
- Si ta merrni Tusipektol
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Tusipektol
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË TUSIPEKTOL DHE PËRSE PËRDORET

Tusipektol përbën aktive kodeinë fosfat, benzaldehid, ekstrakt balsam Toluje dhe ekstrakt timusi. Kodeina frenon gendrën e kollës duke qetësuar kollën me origjinë të ndryshme. Kodeina dha kripérat e saj, kryesisht fosfati, përdoren nga goja në trajtën e shurupave për qëtesimin e kollës. Ekstrakt i timusit dhe balsami i Tolusë janë përbërës bimorë me veti mukolitike, të cilët ndihmojnë në lehtësimin e kollës.

Tusipektol - shurup indikohet:

- si mjet ndihmës në sëmundjet akute dhe kronike të frysëmarrjes si: kollë me origjinë të ndryshme (nga gripi, ose ftohje), bronkit, laringit.

2. PËRPARA SE TË MERRNI TUSIPEKTOL

Mos merrni Tusipektol në qoftë se:

- keni mbindjeshmëri ndaj kodeinës, lëndëve të tjera aktive ose ndonjë prej përbërësve të tjerë të këtij produkti mjekësor;
- jeni nën 18 vjeç;
- jeni metabolizues shumë të shpejtë të kodeinës;
- vuanı nga astma;
- keni insufisjencë të frysëmarrjes;
- keni kollë me sekrecione viskoze.

Të evitohet përdorimi i zgjatur dhe me doza të larta në rastet e konstipacionit kronik. Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos merrni Tusipektol, por konsultohuni fillimi i mjetit tuaj dha ndiqni këshillat e dhëna prej tij.

Tregoni kujdes të veçantë me Tusipektol

Njoftoni mjekun tuaj në rast se:

- vuanı nga çregullimet e funksionit të mëlçisë ose të veshkave;
- jeni një person me të dhëna për përdorim abuziv të lëndëve narkotike;
- keni rritje të presionit intrakranial, hipovolemi dhe konvulsione me origjinë qëndrore;
- jeni duke u trajtuar me një preparat tjetër për kollën ose ftohjen, sepse preparate të ndryshme mund të përbajnë të njëjtat lëndë aktive duke shkaktuar mbiidozim;
- keni intolerancë nga disa sheqerna. Tusipektol përbën alkool etlik (etanol 96%), prandaj duhet treguar kujdes i veçantë në gratë shtatzëna, laktacion (në këto raste nuk rekomandohet) dë pacientët me rezikshmëri të lartë si p.sh. ato me insufisjencë hepatike dhe epilepsi. Alkool etlik (etanol 96%) është i dëmshëm për personat që vuajnë nga alkoolizmi.

Marrja e barnave të tjera

Kodeina mund të fuqizojë efektin e agonistëve të tjerë opioidë, analgezikëve të përgjithshëm, qetësuesve, hipnotikëve, antidepresivëve triciklikë, frenuesve të MAO-s,

alkoolit dhe depresantëve të tjerë të SNQ-së.

Shtatzënia dhe ushqimi me gjji

Nuk rekomandohet përdorimi i Tusipektol gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gjji.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Duhet të tregohet kujdes në përdorimin e Tusipektol duke qenë se kodeina ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetin ose përdorur makinerive.

Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Tusipektol

Tusipektol - shurup përbën metilhidroksibenzoat, i cili mund të shkaktojë reaksiione alergjike (ndoshta të vonuara).

Ky produkt përbën alkool etlik (etanol 96%). Alkooli etlik është i dëmshëm për personat që vuajnë nga alkoolizmi. Gjithashtu duhet treguar kujdes i vegantë tek pacientët me rezikshmëri të lartë si p.sh. ata me insufisjencë hepatike dhe epilepsi.

Ky bar përbën sukozë (sheqer). Nëse ju është thënë nga mjeku juaj që keni intolerancë nga disa sheqerna, kontaktoni mjekun tuaj përpëra se të mermi këtë bar.

3. SI TA MERRNI TUSIPEKTOL

Ndiqni gjithmonë këshillat e mjekut ose farmacistit tuaj në lidhje me dozat e Tusipektol që duhet të mermi dhe shikoni gjithnjë udhëzimet e përshkruara në këtë fletëudhëzues.

Dozimi është:

Kategoria	Dozimi	Koha e marrjes
Të ritrit	15 ml	3 herë në ditë; 1 - 2 orë pas ushqimit dhe para gjumit

Në qoftë se keni marrë më shumë Tusipektol:

Mos mermi më shumë Tusipektol sesa duhet. Nëse keni marrë më shumë Tusipektol se sasia e duhur, ju lutemi konsultohuni me mjekun ose shkoni në spital për të marrë ndihmën e nevojshme.

Në qoftë se keni harruar të mermi Tusipektol:

Në qoftë se harroni të mermi Tusipektol, mermi dozën tuaj sa më shpejt që të kujtoheni përvje rastit kur ka ardhur koha që të mermi dozën pasardhëse. Përdorni dozat në kohën e duhur.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Tusipektol mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Efektet anësore të mundshme janë:

- konstipacion, kur përdorimi është i zgjatur dhe me doza të larta;
 - nauze dhe të vjella;
 - frysëmarrje e vështirësuar;
 - eritemë dhe prurit në rastet e mbindjeshmërisë ndaj barit.
- Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI TUSIPEKTOL

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos e përdorni Tusipektol pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.

Ruajeni në temperaturë më të ulët se 25°C!

Ruajeni Tusipektol nga dielli dhe nga lageshtia!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Tusipektol:

Lëndët vepruese janë:
kodeinë fosfat hemihidrat, benzaldehid, ekstrakt fluid balsam Toluje dhe ekstrakt i lëngshëm Timusi.

1 gram shurup përbën: 0.6 mg kodeinë fosfat hemihidrat, 0.08 mg benzaldehid, 40 mg ekstrakt fluid balsam Toluje dhe 90 mg ekstrakt i lëngshëm Timusi.

Përbërësit e tjerë janë:

glicerinë, sukozë, etanol 96%, metilhidroksibenzoat (nipaginë) dhe ujë i pastruar.

Përbajtja e paketimit

Kuti kartoni që përbën një shishe qelqi të errët me 100 g shurup.

Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:

 Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

 Moshë e përdorimit mbi 18 vjeç.

 Kujdes me dozinën. Mos mermi më shumë se doza e treguar në tabelë ose doza që ju ka përshkuar mjeku.

 Përbajtja.  Kujdes.  Shurup.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:

 PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel/Fax: 00355 4 23 62 800
Tiranë - Albania

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Maj 2014.