

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

ACID FOLIK

Tableta - 5 mg
(Acid folik)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se tē filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë tē lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona pér t'jetë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund tē kenë tē njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Acid folik dhe përsë përdoret
- Përparrë se tē merrni Acid folik
- Si ta merrni Acid folik
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Acid folik
- Informacion i mëtejshëm.

1. ÇFARË ËSHTË ACID FOLIK DHE PËRSE PËRDORET

Acidi folik ndodhet në ushqime (p.sh. në mëlçi, fasule tē thata, bizele, thjerrëza, portokalle, shparguj, panxhar, spinaq etj.), kryesisht si poliglutamat folati i reduktuar. Ai mund t'i nënshtronet hidrolizës, reduktimit dhe metilimit në aparatin tretës përparrë se tē përthithet. Acidi folik sintetik që merret nga goja është një monoglutamat dha ai përthithet plotësisht pas përdorimit, madje edhe në prani tē sindromit të keqpërthithjes. Acidi folik shfaqet në plazmë rrëth 15 deri në 30 minuta pas marrjes nga goja; përgëndrimi maksimal në përgjithësi arritet pas 1 ore. Acidi folik metabolohet në mëlçi. Nivelet normale në serum tē acidit folik tē përgjithshëm luhaten nga 5 deri në 15 ng/mL. Në përgjithësi nivelet në serum < 5 ng/mL tregojnë përmjaftueshmërinë e acidit folik, kurse nivelet < 2 ng/mL zakonisht shpien në anëmi megaloblastike. Pjesa më e madhe e metabolitëve të acidit folik shfaqen në urinë pas 6 orësh; në përgjithësi jashtëqitja përfundon brenda 24 orësh. Acid folik përdoret në mjekimin e anësorisë megaloblastike pér shkak tē pamjaftueshmërisë së acidit folik (që mund tē shfaqet prej ushqimit të pamjaftueshëm, shtatzëni, barnave antiepileptike etj.)

Acidi folik përdoret pér parandalimin e gjendjeve me pamjaftueshëm rati folateve. Mjeku juaj mund ta ketë dhënë acidin folik pér një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni tē dini pse ju është dhënë Acid folik.

2. PËRPARA SE TĒ MERRNI ACID FOLIK

Mos merrni Acid folik në qoftë se:

- jeni alergjik ndaj acidit folik
- jeni alergjik ndaj ndonjërit prej përbërësve joaktivë

- të përmendor në fund tē këtij fletëudhëzuesi
- keni anemi megaloblastike tē shkaktuar nga mungesa e vitaminës B12 ose tē padiagnostikuar
- keni sëmundje malinje.

Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i merrni tabletat, shkonit dhe flisni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna.

Tregoni kujdes tē veçantë me Acid folik

Acidi folik nuk duhet përdorur kurrë i vetëm pér mjekimin e anësorisë pernicioze dhe patologjive tē tjerë që rrjedhin nga pamjaftueshmëria e vitaminës B12, sepse ai mund tē shkaktojë shfaqjen e degjenerimit subakut, tē kombinuar, tē palcës së kockave.

Marrja e barnave tē tjerë

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna tē tjerë, edhe ato pa recetë. Informoni mjekun tuaj në qoftë se jeni duke marrë ndonjë prej tē mëposhtmëve:

- acid aminosalicilik
- kontrakeptive që merren nga goja
- metotreksat, trimetoprim (frenues tē dihidrofolatreduktazës)
- sulfasalazinë, antiinflamator në sëmundjet e zorrëve dha artritin reumatoid
- hidantoina, antiepileptikë
- antituberkularë
- alkool
- antagonistë tē acidit folik.

Këto barna mund tē ndikohen nga Acid folik, ose mund tē ndikojnë në mënyrën se si ai vepron. Mund tē keni nevojë tē përdorni sasi tē ndryshme tē këtij bari ose tē merrni barna tē tjerë. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshillojë.

Shtatzënia

Në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni një shtatzëni, pyesni mjekun tuaj para përdorimit.

Ushqimi me gjji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësht gjiri. Megjithëse ekskretohet me qumështin e gjirit, është e pranueshme ushqyerja me qumësht gjiri e foshnjeve gjatë kohës së marrjes së acidit folik.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Tregohuni tē kujdeshëm gjatë drejtimit tē automjetit ose përdorimit tē makinerive derisa tē shihni se si Acid folik ndikon tek ju.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e tabletave Acid folik

Bari përmban laktozë. Në qoftë se keni intolerancë ndaj disa sheqernave, flisni me mjekun tuaj përparrë se tē merrni këtë bar.

3. SI TA MERRNI ACID FOLIK

Gjithmonë merrni tabletat Acid folik vetëm sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se ndjeni që efektet e acidit folik janë shumë tē forta ose shumë tē dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj. Këshillojmë që tabletat t'i merrni në tē njëjtën orë qdo ditë.

Tabletat Acid folik duhet tē gëlltiten tē plota me një gotë ujë.

Për mjekimin e anemisë megaloblastike:

Tek tē rriturit përdoret me dozë 5 mg / ditë (maksimumi 15 mg / ditë), pér 4 muaj. Mjekimi më pas vazhdohet me 5 mg / ditë qdo 1-7 ditë (mesatarisht 1 mg / ditë në varësi tē sëmundjes shkaktuese).

Tek fémijët deri në 1 vjeç përdoret 0.5 mg / kg / ditë, ndërsa mbi 1 vjeç marrin dozat e tē rriturive.

Profilaksia tek tē sëmurët me hemolizë kronike ose me dializë përdoret 5 mg / ditë.

Profilaksia tek gratë shtatzëna dhe me fémijët në gjji përdoret 0.2 - 0.5 mg / ditë.

Megjithatë, mjeku juaj mund t'ju këshillojë tē merrni një dozë tjetër në varësi tē gjendjes tuaj dhe reagimit ndaj barit.

Mjeku juaj mund t'ju kërkojë tē merrni Acid folik pér një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj pér këshillë në qoftë se nuk jeni tē sigurt pér sa kohë duhet ta merrni.

Në qoftë se keni marrë më shumë Acid folik

Në qoftë se keni marrë më shumë Acid folik se sasia që duhet tē merrnit, ose në qoftë se fémijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose tē telefononi urgjencën pér tē marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerrnen.

Në qoftë se keni harruar tē merrni Acid folik

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha pér marrjen e zakonshme tē saj.

Mos merrni një dozë tē dyfishtë pér tē plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TĒ MUNDSHME

Të gjitha barnat mund tē shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo.

Mos e alarmoni nga kjo listë e efekteve tē mundshme anësore. Mund tē mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore tē mëposhtme ju shqetëson:

- reaksione alergjike – ekzantema, eritema
- nauze, fryrje barku
- efekte në sistemin nervor qendror, çrrëgullime tē gjumit, irritim, depresion nervor, konfuzion dhe dëmtime tē gjykimit (përfshirë dhimbje e gjoksit dhe aritmji).

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë tē përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI ACID FOLIK

Mbajeni larg fémijëve.

Mos e përdorni Acid folik pas datës së skadimit e cila

është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Acid folik – tableta 5 mg

Lënda vepruese është acid folik.

Cdo tabletë përmban 5 mg acid folik.

Perbërësit e tjerë janë: amidon, laktozë, celulozë mikrokristalone, xelatinë, talk, glikolat natriumi i amidonit.

Përbajtja e paketimit

Kuti me 60 tableta.


Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:



Sipas recetës së mjekut.



Përbajtja.



Kujdes.

Mbajtësi i Autorizimit pér Tregtim (MAT) dhe Prodhesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Kata"
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPERI

Ky fletëudhëzues u rishikua pér herë tē fundit në Qershori 2015.

PAY ATENTION, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.