

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér pacientin

KLORUR KALIUMI

Tretësirë pér injekzion – 750 mg / 10 ml, 375 mg / 5 ml
(Klorur kaliumi)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues pérpara se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyjetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky është përshkuar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Klorur kaliumi dhe përsë përdoret
- Përpresa se të merrni Klorur kaliumi
- Si ta merrni Klorur kaliumi
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Klorur kaliumi
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË KLORUR KALIUMI DHE PËRSË PËRDORET

Kaliumi merr pjesë në një numër procesesh fiziologjike thellësore, siç janë mbajtja e tonicitetit brendaqelizor dhe një raport i përshtatshëm me natriumin në membranën qelizore, metabolismi qelizor, përcimi i impulseve nervore, tkurrja e muskuve të zemrës, të skeletit dhe muskuve të lëmuar; barazpesha acido – bazike dhe mbajtja e funksionit normal të veshkave. Nivelet normale të kaliumit në serum luhaten nga 3.5 deri në 5 milibarazylërs / L.

Klorur kaliumi indikohet në korrigimin e hipokalemisë së rëndë dhe kur nuk mund të merren nga goja sasi të mjaftueshme kalumi.

2. PËRPARA SE TË MERRNI KLORUR KALIUMI

Mos merrni Klorur kaliumi nëse:

- vuani nga dëmtim i rëndë i funksionit të veshkave me oliguri ose azotemi;
- vuani nga sëmundje e pamjekuar e Adisonit;
- vuani nga hiperkalcemi, pavarësisht nga shkaku;
- vuani nga adynamia episodica hereditaria; dehidrim akut;
- merrni diuretikë mbajtës të kaliumit ose lëndë që e frenojnë aldosteronin.

Tregoni kujdes të veçantë me Klorur kaliumi

Pyesni mjekun tuaj përpresa se të merrni Klorur kaliumi:

- në qoftë se jeni të moshuar ose të sëmurë me dëmtim të funksionit të veshkave;
- në qoftë se jeni të sëmurë me sëmundje zemre.

Matjet e vazhdueshme të përbajtjes së kaliumit në plazmë janë të nevojshtme pér të përcaktuar nese duhen bërë perfuzionime të mëtejshme, me qëllim që të mënjanohet zhvillimi i hiperkalemisë.

3. SI TA MERRNI KLORUR KALIUMI

Gjithmonë merreni Klorur kaliumi sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Klorur kaliumi janë shumë të fortë ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Klorur kaliumi mund të përdoret si më poshtë:
Me perfuzionim në venë: Në varësi nga deficiiti ose kërkesa ditore pér kalium. Tretësira 7.50 duhet holuar me jo më pak se 25 herë vëllimin e saj me tretësirë pér injekzion klorur natriumi 0.9% ose ndonjë tretësirë tjetër të përshtatshme dhe pastaj të përzihet mirë.

Në qoftë se keni marrë më shumë Klorur kaliumi
Në qoftë se keni marrë më shumë Klorur kaliumi se sasia që duhet të merrit, ose në qoftë se fëmjët e kanë marrë gabimish këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin, ose të telefononi urgjencën pér të marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet të ndërmerren.

Në qoftë se harroni të merrni Klorur kaliumi
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha pér marrjen e zakonshme të saj. Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) pér të plotësuar dozën (dozat) e haruar(a). Në qoftë se keni pyjetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Klorur kaliumi mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhdukun kur doza reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të trajtimit dhe zhdukun në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.

Ndonjëherë, sidomos kur injektohen sasi të theksuara tretësire, mund të shfaqet:

- hiperkalemia që shqerohet me parestezi të ekstremiteteve,
- konfuzion,
- hipotension,
- aritmia,
- bllok kardiak,
- ndërprerje e punës së zemrës,
- interval QT i zgjatur,
- të përziera, të vjella,
- oliguri, anuri,
- ekzantema.

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkësoshet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI KLORUR KALIUMI

Mbajeni larg fémijëve!
Mos e përdorni Klorur kaliumi pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C!
Ruajeni në paketimin original pér ta mbrojtur nga drita!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Klorur kaliumi – Tretësirë pér injekzion

Lënda vepruese është Klorur kaliumi.
Çdo ampulë 5 ml përmban 375 mg klorur kaliumi.
Çdo ampulë 10 ml përmban 750 mg klorur kaliumi.
Përberës të tjerë: ujë pér injekzion.

Përbajtja e paketimit

Ampula 5 ml ose 10 ml:
Kuti me 10 ampula;
Kuti me 100 ampula (përdorim spitalor).

Shpjegues i ikonave ilustruese pér paketim:

! Sipas recetës së mjekut.

! Përbajtja. ! Kujdes.

Tretësirë pér injekzion.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

 PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00 355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua pér herë të fundit në Dhjetor 2011.

