

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér përdoruesin

ALKOOL BORIK

Tretësirë me pika pér vesh - 2.5 % - 10 ml
(Acid borik)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona të tjera. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Alkool borik dhe përsë përdoret
- Përpresa se të përdorni Alkool borik
- Si ta përdorni Alkool borik
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Alkool borik
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË ALKOOL BORIK DHE PËRSË PËRDORET

Acidi borik ka veti bakteriostatike dhe fungistatike të dobëta. Tretësira e tij alkoolike (në alkool të holluar) ka efekt analgjezik në otalgjitet. Acidi borik depërton me vështirësi në lëkurën e padëmtuar.

Alkool Borik – tretësirë me pika pér vesh përdoret si më poshtë:

Analgjezik dhe antiseptik në otalgjitet.

Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Alkool borik pér një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni të dini pse ju është dhënë Alkool borik.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI ALKOOL BORIK

Mos përdorni Alkool borik në qoftë se:

- keni mbindjeshmëri ndaj acidit borik dhe përbërësve të tjera të përgatesës;
- keni perforacion të timpanit, otit të mesëm kronik, otit të mesëm purulent.

Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i përdorni pikat, shkoni dhe konsultohuni fillimi me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna.

Tregoni kujdes të veçantë me Alkool borik

Për të mënjanuar acarimin e labirintit vestibular, i cili shkakton ndjesinë e marramendjes, këshillohet që tretësira para përdorimit të ngrohet pak, me qëllim që të marrë temperaturën e trupit.

Përdorimi i Alkool borik me ushqim dhe pijë
Nuk ka të dhëna pér ndikimin e ushqimit dhe pijeve në farmakokineticën e Alkool borik.

Shtatzënia dhe Ushqyerja me gji.
Nuk ka të dhëna pér shfaqjen e efekteve anësore nga përdorimi i Alkool borik gjatë shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna pér shfaqjen e efekteve anësore nga përdorimi i Alkool borik gjatë drejtimit të automjetit dhe përdorimit të makinerive.

Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna të tjera, edhe ato pa recetë.
Këto barna mund të ndikohen nga Alkool borik ose mund të ndikojnë në mënyrën se si ai vepron. Ndaj në përdorimin e njëkoqshëm të tyre kemi nevojë të zvogëlojmë ose të shtojmë sasinë e Alkool borik. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshillojë.

3. SI TA PËRDORNI ALKOOL BORIK
Gjithmonë përdoren Alkool borik sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Alkool borik janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj. Rekomandohet që pikat e Alkool borik të merren në pozicionin shtrirë në një anë. Në veshin e sëmurë pikohen disa pika tretësirë (2 – 5 pika) dhe në vesh vihet një tampon pambuku. Pas 1 – 2 orësh pikimi i tretësirës mund t'ë përsëritet dhe vazhdohet kështu derisa dhimbja të pushojë. Mjeku juaj mund t'ju kërkojë të merrni Alkool borik pér një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj pér këshillë në qoftë se nuk jeni të sigurt pér kohëzgjatjen e trajtimit.

Në qoftë se keni përdorur më shumë Alkool borik:

Në qoftë se keni përdorur më shumë Alkool borik se sasia që duhet t'ë përdornit, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimishë këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën pér t'ë marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet t'ë ndërmerrin.

Në qoftë se keni harruar të përdorni Alkool borik:

Në qoftë se harroni të përdorni një dozë, përdorni dozën pasardhëse kur të jetë koha pér përdorimin e zakonshëm të saj.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë pér t'ë plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË ALKOOL BORIK

Nuk janë konstatuar efekte të padëshirueshme. Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI ALKOOL BORIK

Mbajeni larg fëmijëve!
Ruajeni në temperaturë më të ulët se 25°C!
Shikoni afatin e përdorimit në paketim përparrë përdorimit!
Mbrojeni barin nga drita dhe nga lagështia!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përmban Alkool borik
1 ml tretësirë me pika përmban 25 mg acid borik.
Lënda vepruese është Acid borik.
Përbërësit e tjerë janë ujë i pastruar dhe alkool etilik.

Përbajtja e paketimit

Forma e paketimit: Kuti kartoni me 1 flakon pikatore 10 ml.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:

 Mund të merret pa recetën e mjekut.

 Përbajtja. ! Kujdes.

 Pika pér vesh.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

 PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPÉRI

Ky fletëudhëzues u rishikua pér herë të fundit në Shtator 2013.

