

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për patientin

METOPROLOL

Tableta – 100 mg (Metoprolol tartrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se t'u filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund t'u keni nevoje ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshtuar për ju. Mos e jepni tek persona t'u tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund t'u keni të njëjtat simptoma me ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'u njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Metoprolol dhe përsë përdoret
- Përparrë se t'u merrni Metoprolol
- Si ta merrni Metoprolol
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Metoprolol
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË METOPROLOL DHE PËRSË PËRDORET

Metoprololi është antagonist kompetitiv, selektiv i receptorëve beta-1 adrenergjikë. Alikot zoteron as veti membrano-stabilizuese, as veti simpatomimetike intrinsike. Blokada e beta -1 receptorëve zgjedh fuqinë kontraktuese të zemrës, pakson rruen sinusale. Metoprololi absorbohet shpejt nga trakti gastro-intestinal por i nënshtrrohet metabolizmit të kalimit të parë. Përqëndrimet plazmatike maksimale variojnë nga 1.5-2 orë pas një doze të vëtme orale. Metoprololi shpërndahet gjérësisht, kalon barrierën hematonecefalike si dhe placentën, gjithashtu kalon në qumështin e gjirit. Lidhet rreth 12% me proteinat plazmatike. Metabolizohet në mëlcë. Metabolitët së bashku me një pjesë të vogël të barit të pandryshuar janë qëndriten me urinë.

Metoprolol – tabletë – 100 mg përdoret në:

- trajtimin e hipertensionit arterial,
- angina pektoris,
- aritmia kardiakë,
- infarkt të miokardit,
- trajtimin ndihmës në hipertiroidizëm;
- profilaksi të migrenës.

2. PËRPARA SE T'E MERRNI METOPROLOL

Mos merrni Metoprolol:

- në qoftë se jeni i ndjeshëm (alerjik) ndaj metoprololit tartrat ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit.

Metoprololi është i kundërendikuar në pacientët me bradikardi sinusale të theksuar, blok AV, shok

kardiogjen, insuficiencë kardiakë kongjesteive, sëmundje vaskulare periferike, feokromocitomë, sindromin e sinusit të sëmurrë; Bari kundërendikohet në trajtimin e infarktit akut të miokardit të shqoqëruar me hipotension (presioni sistolik < 100 mm Hg).

Tregoni kujdes të veçantë me Metoprolol

Pyesni mjekun tuaj përparrë se t'u merrni Metoprolol.

- Metoprololi duhet përdorur me kujdes në të sëmurët me funksion të pamjaftueshmë të miokardit pasi insuficiencia kongjesteive kardiakë mund t'u precipitohet nga blokada β-adrennergjike.
- Metoprololi duhet përdorur me kujdes në të sëmurët me disfunksion të nyjes sinusale, meqë bari mund t'u deprimojë nyjen SA automatikisht.
- Duhet t'u evitohet ndërprerja e menjëherëshe e metoprololit në të sëmurët me sëmundje kardiakë, pasi mund t'u shkaktojë një rritje të simptomave të anginës, ishemi të miokardit, infarkt të miokardit.

Marrja e barnave të tjera:

Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund t'u ndikohet ose t'u ndikohet nga Metoprolol. Ju lutemi t'u kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato t'u marra pa receletë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Metoprolol në qoftë se ju jepet ndonjë bar jetët gjatë trajtimit.

Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj t'u jetë në dijeni të faktit që jeni duke u trajtuar me:

- anestezikë: rititin efektet hipotensive të beta blokuesve;
- antiacidë: biodisponibiliteti i metoprololit rritet nga marja e njëkohshme me antiacidë që përbajnë kripëra alumini ose magnezi;
- antiaritmikë: kombinimi i beta blokuesve me antiaritmikë mund t'u shkaktojë bradikardi dhe insuficiencë kardiakë;
- antihipertensivë: kombinimi i metoprololit me antihipertensivë të tjerë jep efekte additive (shtesë);
- blokues të kanaleve të Ca: kombinimi i beta blokuesve me blokues të kanaleve të Ca rezulton në hipotension, bradikardi dhe insuficiencë kardiakë;
- antiinflamatorë josteroidë: mund t'u pakësojnë efekte antihipertensivë të metoprololit;
- analgezikë opioidë: biodisponibiliteti i metoprololit rritet nga marja e njëkohshme e analgezikëve opioidë.

Shtatzënia

Kërkoni këshillën e farmacistit ose t'u mjkut përparrë se t'u merrni këtë bar.

Këshillohet mënjanimi i përdorimit të Metoprolol gjatë shtatzënisë. Metoprololi nuk duhet t'u përdoret gjatë periudhës së shtatzënisë, përvèç rastit kur mjeku e shëh të nevojshme dhe matet faktori risk / benefit. Prandaj, gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përparrë se t'u përdorni Metoprolol gjatë shtatzënisë.

Ushqimi me gji

Metoprololi kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet t'u përdoret gjatë ushqimit të foshnjës me gji. Megjithatë, në qoftë se është shumë i nevojshëm

përdorimi i Metoprolol, duhet që foshnja të monitorohet për efektin që mund t'u shkaktojë ky bar.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Bari ka ndikim në aftësitë për të drejtuar automjetin dhe përdorur makineri. Ai mund t'u shkaktojë marramendje.

3. SI TA MERRNI METOPROLOL

Gjithmonë merrni tabletat Metoprolol sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontakti me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Metoprololi janë shumë të forte ose shumë të dobëta, flini me mjekun ose farmacistin tuaj. Tabletat duhet t'u gëlltiten me t'u paktën gjysëm gotë ujë.

- Trajtimi i hipertensionit: Doza filastëse 100 mg në ditë, e cila rritet qdo javë sipas përgjigjes deri në 400 mg në ditë; mund t'u merret si një dozë e vetme ose e ndarë dy herë në ditë. Doza mbajtëse është 100 - 200 mg në ditë.
- Angina pektoris: 50 - 100 mg dy ose tre herë në ditë.
- Aritmi kardiakë: 50 mg dy ose tre herë në ditë, dozë që ritet në rast nevoje deri në 300 mg në ditë në doza të ndara.
- Si ndihmës në trajtimin e infarktit akut të miokardit: 5 mg metoprolol tartrat IV në intervalle 2 minuta deri në një total prej 15 mg. Kjo duhet ndekur nga trajtim oral me 50 mg qdo 6 orë për 2 ditë.
- Si ndihmës në trajtimin e hipertiroidizmit: 50 mg 4 herë në ditë.
- Për profilaksinë e migrenës: 100 - 200 mg në ditë në doza të ndara.

Në qoftë se keni marrë më shumë Metoprolol:

Në qoftë se keni marrë më shumë Metoprolol se sasia që duhet t'u merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi t'u kontaktoni me mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet t'u ndërmerr.

Shenjat që shfaqen zakonisht nga marja e një sasi të madhe të metoprololit janë: bradikardi, hipotension, bronkospazma, insuficiencë akute kardiakë, shok, arrest kardiak. Shenja të tjera: nauze, të vjella, cianozë.

Masat që merren janë lavazhi gastrik si dhe trajtime të tjera që ndërmerrin nga mjeku në raste të ndryshme.

Në qoftë se keni harruar të merrni Metoprolol:

Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur t'u jetë koha për marrjen e zakonshme të saj.

Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozinë (dozat) e harruar(a).

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË METOPROLOL

Si t'u gjithë bartat e tjera, Metoprololi mund t'u shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Ndonjëherë ato janë serioze ndonjëherë jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund t'u mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Shumica e efekteve anësore në pacientët që trajtohen me Metoprolol janë pasojë e ekzagjjerimit të efekteve terapeutike.

- Ato vërehen kriesht në sistemin kardiovaskular dhe shprehen me: bradikardi sinusale, blok AV, precipitum ose rëndim të insuficiencës kardiakë, hipotension, sinkop.
- Efektet anësore kriesht në sistemin kardiovaskular dëshiron me: bradikardi sinusale, blok AV, precipitum ose rëndim të insuficiencës kardiakë, hipotension, sinkop.
- Efektet anësore kriesht me: bradikardi sinusale, pagjumi, etj.
- Efektet anësore të traktit gastrointestinal vërehen në 2 - 4% të rasteve dhe shfaqen kriesht me diarre, nauze ose të vjella.
- Efektet anësore dermatologjike janë të rralla (alopeci, rash psoriaziform, purpurea, eritemë, hipopigmentim).

5. SI TA RUANI METOPROLOL

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos i përdorni tabletat pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos i ruani mbi 25°C!

Ruajini tabletat në paketimin original për t'i mbrojtur nga drita.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Metoprolol – tabletë – 100 mg

Lënda vepruese është Metoprolol tartrat.

Cdo tabletë Metoprololi përbën 100 mg metoprololi tartrat.

Përbërësit e tjerë janë: laktozë monohidrat, celulozë mikrokristalore, stearat magnezi, glikolat natrumi i amidonit, dioksid silici koloidal, kroskarmelozë natrumi, talk.

Përbajtja e paketimit

Forma e paketimit: kuti me 30 tableta.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:

! Sipas recetës së mjekut.

Përbajtja. ! Kujdes.

Forma e tabletës.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rrugë "Myslym Keta"
Tel/Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Shtator 2013.