

**FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:**  
Informacion pér pacientin

# VALSARTAN

Tableta tē veshura me film – 80 mg  
(Valsartan)

## Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se tē filloni

### përdorimin e barë.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund tē keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje tē mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky barë shëtë përshkruar pér ju. Mos e jepni tek persona tē tjerë. Mund t'i dëmtotja atë edhe pse mund tē keni tē njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësoshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi tē njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

### Në këtë fletëudhëzues:

- Cfarë është Valsartan dhe përsë përdoret
- Përparrë se tē merrni Valsartan
- Si ta merrni Valsartan
- Efekte anësore tē mundshme
- Si ta ruani Valsartan
- Informacion i mëtejshëm

## 1. ÇFARË ËSHTË VALSARTAN DHE PËRSË PËRDORET

Valsartan është një antagonist i receptorëve të angiotenzinës II. Angiotenzina II, e cila prodhohet nga organizmi, është një lëndë kimike që ngushton enët e gjakut. Valsartan parandalon ngushtimin e enëve të gjakut duke bllokuar efektin e angiotenzinës II.

Valsartan – tablete e veshur me film 80 mg përdoret pér:

- trajtimin e hipertensionit.* Presioni i lartë i gjakut rrit ngarkesën e zemrës dhe t'arieve. Nëse nuk trajtohet mund tē dëmtohet enët e gjakut tē trurit, zemrës dhe veshkave dhë mund tē çojo deri në insult, insuficiencë kardiak ose insuficiencë renale. Presioni i lartë i gjakut rrit rishenat e atakeve kardiak;
- trajtimin e pacientëve që kanë kaluar një atak kardiak (infarkt i miokardit) kohët e fundit* (që nënkupton nga 12 orë deri në 10 ditë);
- trajtimin e pacientëve me insuficiencë kardiak (insuficiencë kardiakë simptomatikë), kur trajimi me barna tē tjetra specifike (të njohur si ACE-inhibitorë) nuk është i përshtatshëm. Megjithatë, Valsartan mund tē merret së bashku me ACE-inhibitorët, nëse nuk mund tē përdoren beta-blokuesit. Simptomat e insuficiencës kardiakë përfshijnë marje fryme dhe enjte tē këmbëve pér shkak tē grumbullimit të lëngjeve në këto gjymtë. Kjo shkaktohet kur muskulit kardiak nuk mund tē pompojë sasinë e nevojshme tē gjakut pér tē gjithë organizmin.*

Mjeku juaj mund tā ketë dhënen Valsartan pér një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni tē dini pse ju është dhënen Valsartan.

## 2. PËRPARA SE TĒ MERRNI VALSARTAN

Mos merrni Valsartan në qoftë se:

- jeni alergik (hipersensitiv) ndaj valsartanit ose ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Valsartan;
- keni një dëmtim tē rëndë tē funksionit hepatik ose nëse vuani nga sëmundje hepatike;
- jeni më shumë se 3 muajshë shtatzënë (gjithashtu është mirë tē shëmangni trajimin me Valsartan në shtatzënë e hershme, shiko pikën "Shtatzënia dhe ushqimi me gjji").

### Tregoni kujdes tē veçantë me Valsartan

Pyesni mjekun tuaj përparrë se tē merrni Valsartan:

- nëse keni çregullim tē funksionit tē veshkave ose nëse i nënshtroneni diaлизë;
- nëse keni çregullim tē funksionit tē mëlciçës;
- nëse jeni në dijeni se keni një ngushtim ose obstruktion tē enëve tē gjakut tē veshkave;
- nëse kohët e fundit keni kryer një transplant tē veshkës;
- nëse vuani nga hiperaldosteronizmi, një çregullim në tē cilin gjendrat adrenale prodhonjë një sasi tē madhe tē hormonit tē njohur si aldosteron. Nëse kjo vlen pér rastin tuaj, nuk rekondohet përdorimi i Valsartan;
- nëse keni tē vjella ose diarre tē rëndë, sepse kjo mund tē çojo në humbje tē konsiderueshmë tē lëngjeve ose kripërave nga organizmi;
- nëse po trajtoheni me diuretikë (të përdorur pér tē rritur ekskretimin e lëngjeve nëpërmjet veshkave);
- në qoftë se po merrni diuretikë kursyes tē kaliumit ose preparate me kalium, nëse përdorni kripëra zëvendësuese që përbajnjë kalium ose nëse po përdorni barna tē tjetra (p.sh. heparin), tē cilat risin sasinë e kaliumit në gjak. Mund tē jetë e nevojshme tē kontrolloni sasinë e kaliumit në gjak në intervalë tē caktuar;
- nëse keni probleme me valvulat ose muskulin e zemrës, ose nëse keni çregullime tē tjetra kardiak tē rënda;
- nëse po trajtoheni pér insuficiencë kardiakë ose pas një ataku kardiak, sepse funksionimi i veshkës mund tē përkësoshet gjatë trajimit.

Konsultohuni me mjekun tuaj nëse jeni ose mund tē mbeteni shtatzënë. Valsartan nuk rekondohet në fillim tē shtatzënës (gjatë muajve tē parë tē saj) dhe mund tē shkaktojë dëmtimë serioze tē fetusit në tremujorin e dytë dhe tē tretë tē shtatzënës.

### Marrja e barnave tē tjetra

Trajtimi i njëkohshëm me barna tē tjetra mund tē ndikojë ose tē ndikohet nga Valsartan. Megjithatë, ju lutemi tē kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna tē tjetra, përfshirë ato tē marrë pa recetë. Mund tē jetë e nevojshme tē ndryshoni dozën, ose në disa raste tē ndalonj marjen e njërit prej barnave. Kjo vlen si pér barnat që merren me recetë, edhe pér ato që merren pa recetë.

Përkujdesje e vegantë rekondohet nëse merrni ndonjë nga barnat e mëposhtme gjatë trajtimit me Valsartan:

- barna tē tjetra pér uljen e presionit tē gjakut, vegancërisht diuretikë meqenështë këtë e fundit mund tē ulin akoma më shumë presionin e gjakut;
- barna që risin sasinë e kaliumit në gjak, si preparatet me kalium, kripëra zëvendësuese që përbajnjë kalium ose barnat kurysë tē kaliumit sigjanë diuretikë kursyes tē kaliumit ose disa barna tē tjetra që risin sasinë e kaliumit në gjak (si p.sh. heparina);
- disa tipa analjezikësh tē qajtur antiinflamatorë (antiinflamatorët josteroidë). Këtë barna mund tē bëjnë që Valsartan tē jetë më pak efektiv në uljen e presionit tē gjakut. Nëse keni një dëmtim tē funksionit tē veshkave, marja e këtyre barnave në tē njëjtën kohë me Valsartan mund tē shkaktojë përkëqësim tē funksionit tē veshkave;
- barnat që përbajnjë litium (bar që përdoret pér trajtimin e disa tipave tē sëmundjeve psikotike). Nuk duhet tē përdorimi Valsartan dhe litium në tē njëjtën kohë, përvèc rastevë kur jeni në një monitorim strikt nga mjeku juaj. Në këtë rast mjeku duhet tē përkujdeset pér ekzaminimet që duhen kryer (p.sh. analizat e gjakut). Nëse po trajtoheni pas një ataku zemrë, nuk rekondohet kombinimi me një ACE inhibitor (i përdorur pér trajtimin e ataku tē zemrës).
- Nëse po trajtoheni pér insuficiencë kardiakë dhe në tē njëjtën kohë po trajtoheni me ACE inhibitorë dhe beta-blokuesit (të përdorur pér trajtimin e insuficiencës kardiakë), nuk rekondohet kombinimi i treshiftësme Valsartan.

### Shtatzënia dhe ushqimi me gjji

Duhet tē konsultoheni me mjekun nëse jeni ose nëse mendoni se jeni shtatzënë. Mjeku juaj do t'ju këshillojë tē ndërprisni trajtimin me Valsartan përparrë se tē mbeteni shtatzënë ose sapo tē jetë në dijeni se jeni shtatzënë dëne do t'ju këshillojë tē merrni një bar tjetër në vend tē Valsartan.

Valsartan nuk rekondohet në muajt e parë tē shtatzënë, dhe nuk duhet marrë në tremujorin e dytë dhe tē tretë tē shtatzënë se pëse mund tē shkaktojë dëmtimë serioze tek fetusi.

Konsultohuni me mjekun tuaj nëse ushqeni me gjji ose do tē filloni tē ushqjeni me gjji fëmijën tuaj. Valsartan nuk rekondohet pér njerit që ushqejnë fëmijën me gjji që dëmejku juaj do tē zëvendësojë këtë bar me një tjetër, vegancërisht nëse fëmija juaj ka lindur prematur (më pak se 9 muaj).

Kërkoni këshillën e farmacistit ose tē mijekut përparrë se tē merrni ndonjë bar tjetër.

### Marrja e Valsartan me ushqim dhe piqe

Valsartan mund tē merrret me ose pa ushqim.

### Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Si shumë barna tē tjetra që përdoren pér trajtimin e presionit tē lartë tē gjakut, Valsartan në raste tē rralla mund tē shkaktojë marrje mendsh dhe mund tē ndikojë aftësinë tē gjakut pér trajtimin. Përparrë drejtimit tē automjetit, përdorimit tē makinerive apo kryerjes së aktivitetive tē tjetra që kërkijnë përqëndrim, sigurohuni pér efektit që shfaq tek ju Valsartan.

### 3. SI TA MERRNI VALSARTAN

Gjithmonë merrni Valsartan ekzaktësisht siç ju thotë mjeku juaj. Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktioni me mjekun ose farmacistin. Personat me presion tē lartë tē gjakut shpeshherë nuk vërejnë shenjat e këtij problemi. Shumë prej tyre mund tē ndihen pothuajse në gjendje normale. Kjo e bën akoma më tē rëndësishme nevojën e vizitave tek mjeku edhe kur ndihenë mirë.

Merrni Valsartan gjithmonë me një gotë ujë (200 – 250 ml ujë). Mund tā merrni Valsartan me ose pa ushqim.

### Pacientët me presion tē lartë tē gjakut

Doza e zakonshme e Valsartan është 80 mg, një herë në ditë. Në disa raste mjeku juaj mund tē vendosë tē rrisë dozën deri në 160 mg ose 320 mg Valsartan, një herë në ditë ose t'ju përshkruajë një bar tjetër (p.sh. një diuretik).

### Pacientët që kanë kaluar kohët e fundit një atak kardiak

Trajtimi i kohës së fundit 12 orës pas atakut kardiak. Në këtë rast doza fillohet 80 mg, dy herë në ditë, e cila rritet gradualisht pér disa javë deri në një dozë maksimale prej 160 mg, dy herë në ditë. Në disa raste, mjeku mund t'ju përshkruajë barna tē tjetra pér tē mijekuar ataku kardiak. Doza përfundimtare e mijekimit mund tē varet nga toleranca ndërindividuale e pacientit. Mjeku juaj do tē vendosë trajtimin e përshtatshëm pér ju.

### Pacientët me insuficiencë kardiakë

Doza fillohet e zakonshme është 40 mg, dy herë në ditë, e cila rritet gradualisht pér disa javë, deri në një dozë maksimale prej 160 mg, dy herë në ditë. Mjeku juaj do tē vendosë trajtimin e përshtatshëm pér ju. Në disa raste, mjeku mund t'ju përshkruajë barna tē tjetra pér tē mijekuar insuficiencë kardiakë. Doza përfundimtare e mijekimit tuaj mund tē varet nga toleranca ndërindividuale e pacientit.

### Fëmijët dhe adoleshentët (nën moshën 18 vjeç)

Përdorimi i Valsartan nuk rekondohet tek fëmijët dhe adoleshentët nën moshën 18 vjeç.

### Pacientët e moshuar (mbi 65 vjeç)

Pacientët e moshuar (mbi 65 vjeç) mund tē marrin Valsartan.

### Në qoftë se keni marrë më shumë Valsartan

Në qoftë se keni marrë gabimisht më shumë Valsartan se sasia që duhet tē merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi tē kontaktoni me mjekun tuaj, spitalin ose tē telefononi urgjencë pér tē marrë një mendim pér rrezikun dhe këshillë pér veprimet që duhet tē ndërmerren. Simptomat nga mbidozimi përfshijnë marje mendsh, përgjumi me dozën (dozat) e harrojnë.

### Në qoftë se keni haruar tē merrni Valsartan

Në qoftë se haroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur tē jetë koha pér marrjen e zakonshme tē saj. Mos merrni një dozë tē dyfishtë (ose më tē lartë) pér tē plotësuar dozën (dozat) e harrojnë.

### Në qoftë se ndërprisni marrjen e Valsartan

Mos e ndërprisi trajtimin me tabletat pa u këshilluar me mjekun. Nëse ndërprisni trajtimin me Valsartan, sëmundja juaj mund tē përkësoshet.

### 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si tē gjithë barnat e tjetra, Valsartan mund tē shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Frekuencia e efekteve anësore tē mundshme shfaqet në tabelën e mëposhtme:

Shumë tē zakonshme	ndodhin në më shumë se 1 në 10 përdorues
Të zakonshme	ndodhin në më pak se 1 në 10, por më shumë se 1 në 100 përdorues
Të pazakonta	ndodhin në më pak se 1 në 100, por më shumë se 1 në 1,000 përdorues
Të rralla	ndodhin në më pak se 1 në 1,000, por më shumë se 1 në 10,000 përdorues
Shumë tē rralla	ndodhin në më pak se 1 në 10,000 përdorues, duke përfshirë rastet e izoluara

### Efekte anësore tē rëndësishme

Disa efekte anësore mund tē jetë tē rënda. Duhet tē ndërprisni trajtimin me Valsartan dhe duhet tē konsultoheni menjëherë me mjekun tuaj nëse ju shfaqet ndonjë prej simptomave tē mëposhtme:

- enjte e fytyrës, gjuhës ose fyti;
- vështirësi në gjellitje;
- utikarie dhe vështirësi në frysma marrjeve.

### Efekte tē tjetra anësore tē mundshme

#### Të zakonshme:

- marrje mendsh;
- presion i ulët i gjakut me tē njëjtat simptoma si marrje mendsh; përkëqësim i funksionit tē veshkave (me shenjat e dëmtimit tē veshkave).

#### Të pazakonta:

- reaksion alergjik me simptomat e rash, kruarje, marrje mendsh, enjte e fytyrës, buzëve, gjuhës ose fyti, vështirësi në frysma marrjeve;
- përkëqësim i rëndë i funksionit renal (shenja tē insuficiencës akute renale);
- spazma tē muskujve, ritëm kardiak jonormal (shenja tē hiperkalemisë);
- marrje frysme, vështirësi në frysma marrjeve në pozicion shtrirë, edema tē këmbëve (shenja tē insuficiencës kardiakë);
- dhimbje koke;
- kollë;
- dhimbje abdominale;
- të përzjera;
- diarre;
- Iodhje;
- debulesë.

#### Të panjohura:

- rash, kruarje, së bashku me shenjat ose simptomat e mëposhtme: temperaturë, dhimbje e kyçeve, dhimbje e muskujve, enjte tē limfonodouje dhe/ose simptoma tē ngashme me gripin (shenja tē sëmundjes së serumit);
- njolla tē kuge, temperaturë, kruarje (shenja tē inflamacionit tē enëve tē gjakut, i quajtur vaskulit);
- hemorragji e pazakontë ose mavjosje (shenja tē trombocitopenisë);
- dhimbje muskulare (mialgji);

- temperaturë, dhimbje fytë ose ulcera tē gojës pér shkak tē infeksioneve (simptoma tē nivelit tē ulët tē rrugave tē bardha tē gjakut, e quajtur neutropeni);
- ulje e nivelit tē hemoglobinës dhe ulje e përqindjes së rrugave tē këshillave tē gjakut (të cilat në raste tē rronda mund tē cojnë në anemi);
- rrite e nivelit tē kalumnit në gjak (që në raste tē rronda mund tē cojnë në spaçma muskulare dhe ritëm jonormal kardiak);
- rrite e bilirubinisë në gjak (e cila në raste tē rronda shfaqet me zverdhje tē lëkurës);
- rrite e nivelit tē azotit me prejardhje nga urea dhe rrite e nivelit tē kreatinines në serum (shenja që tregon pér funksion jonormal tē veshkave).

Frekuencia e disa prej efekteve anësore mund tē ndryshojë në varësi tē kushteve tuaja.