

I FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për pacientin

AFEBRIL

Tretësirë për përdorim rektal – 5 mg / 2.5 ml
(Diazepam)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpala se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshtuar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmotojë atë edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësotet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Qfarë është Afebril dhe përsë përdoret
- Përpala se të merrni Afebril
- Si ta merrni Afebril
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Afebril
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË AFEBRIL DHE PËRSE PËRDORET

Afebril përbën si lëndë aktive diazepam. Diazepami bën pjesë në grupin e benzodiazepinave me veprim të gjatë. Ai ushqimi përmirësohet me antikonvulsivë (gjumësjellës e qetësues), miorelaksues dhe antikonvulsivë nëpërmjet receptorëve specifikë benzodiazepinikë duke fuqizuar transmetimin e GABA-s dhe përrnjohjo sistemi nervor qendor frenohet.

Afebril përdoret në:

- status epilepticus, në konvulsione nga temperatura e lartë, në konvulsione nga helmimet;
- gjendje ankthi dhe axhitimi akut.

Afebril është veçanërisht i përdorur në kontrollin e konvulsioneve tek fémijet.

Mjeku tuaj mund ta ketë dhënë Afebril për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në qoftë se doni të dini pse ju është dhënë Afebril.

2. PËRPARA SE TË MERRNI AFEBRIL

Mos përdorni Afebril në qoftë se:

- jeni alergjik ndaj diazepamit dhe benzodiazepinave në përgjithësi;
- jeni alergjik ndaj ndonjërit prej përbërësve joaktivë të përmendur në fund të këtij fletëudhëzuesi (shiko pikën 6);
- vuani nga miastenia gravis e paqëndrueshme apo dobësi respiratore neuromuskulare, insuficiencë akute pulmonare, apne gjatë gjumit, dëmtimi të rëndë të funksionit të mëlçisë.

Tregoni kujdes të veçantë me Afebril.

Pyesni mjekun tuaj para se të merrni Afebril.

Duhet të përdoret me kujdes në pacientë:

- të cilët vuajnë nga porfiria;
- të moshuar, me dobësi muskulare, me dëmtimi të funksionit të mëlçisë apo veshkave, pasi ata janë më të rezikuar nga efektet anësore dhe mund të nevojitet marrja e dozave të reduktuar;
- me çregullime të personalitetit dhe ndryshime organike të trurit (veçanërisht në pacientët me arteriosklerozë);
- të cilët vuajnë nga psikoza kronike, gjendje fobie apo obsesiioni;
- të cilët mund të kenë qënë abuzues droge apo alkooli pasi mund të shkaktojë varësi (diazepamit mund të shkaktojë varësi pas përdorimit të rregullt, madje edhe pas dozave terapeutike të vogla; në këto raste ai duhet të ndëpritet duke bërë një ulje graduale të dozës).

Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë / përdorur, keni marrë / përdorur së fundmi ose mund të merrni / përdorni barna të tjera përfshirë edhe ato pa recetë.

Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u trajtuar me:

- deprimues të tjera të sistemit nervor qendor, si: antidepresivë (fluoksaminë), antihistaminikë, antipsikotikë, anestezikë të përgjithshëm dhe lokalë, gjumësjellës, qetësues, anksiolitikë dhe analgezistikë të cilët mund të fuqizojnë efektin qetësues të diazepamit;
- ACE inhibitorë, blokues adrenergjik, α-blokues, antagonistë të receptorëve të angiotenzinës-II, β-blokues, blokues të kanaleve të kalçiumit dhe antihipertensivë (moksonidinë, metildopa) të cilët shtojnë efektin hipotensiv;
- antiepileptikë: fenitoina mund të ulë nivelin e diazepamit në serum, ndërsa valproati i natriumit mund të rrisë nivelin e diazepamit në serum;
- antibakterialë: rifampicina rrith kllirensin e diazepamit, ndërsa isoniazidi ul kllirensin e diazepamit;
- antiviralë: ritonaviri mund të rrisë efektin qetësues dhe të shkaktojë uljen e aktivitetit respirator;
- disulfiram, i cili frenon metabolizmin e diazepamit;
- kontraceptivë oralë: mund të ngadalësojnë ekskretimin e diazepamit nga organizmi dhe të rrisin efektin e tij;
- teofilinë: mund të dobësojë efektin e diazepamit;
- cimetidinë, omeprazol, esomeprazol: pengojnë metabolizmin e diazepamit;
- flukonazol, vorikonazol: mund të ngadalësojnë ekskretimin e diazepamit nga organizmi dhe të rrisin efektin e tij.

Marrja e Afebril me ushqim dhe pije

Ushqimi nuk ndikon në përthithjen e Afebril. Të sëmurët që përdorin Afebril duhet të jenë gjithashtu të ndërgjegjshëm rreth konsumimit të njëkohshëm të pijeve alkoolike, sepse një kombinim i tillë mund t'i fuqizojë efektet e padëshirueshme si të diazepamit, ashtu edhe të alkoolit.

Shtatzënia

Mund të përdoret vetëm në indikim të quartë sic është kontrolli i konvulsioneve. Mjeku do të diskutojë mbi rreziqet dhe përfitimet e marjes së barit gjatë shtatzënisë. Doza të larta të diazepamit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë çregullime te të porsalindurit si: hipotermi, hipotonji, rënie të funksionit respirator. Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se dyshoni se jeni shtatzënen ose po planifikoni të ngeleni shtatzënen.

Ushqimi me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësht gjiri. Diazepamit kalon në qumështin e gjirit, kështu që duhet evituar përdorimi i tij gjatë laktacionit.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Të sëmurët që përdorin Afebril nuk duhet të angazhohen në punë që kërkojnë vigjilencë të plotë mendore, si: përdorimi i makinerive të rrezikshme, apo drejtimi i automjetit.

Informacione të rëndësishme për disa nga përbërësit e Afebril

Ky bar përbën 6 mg acid benzoik dhe 30 mg benzoat natriumi në çdo flakon 2.5 ml, që janë ekuivalent me 2.4 mg/ml acid benzoik dhe 12 mg / ml benzoat natriumi. Acidi benzoik dhe benzoati i natriumit mund të shkaktojnë reaksione alergjike dhe irritim të lehtë lokal.

Ky bar përbën 50 mg alkool benzilik në çdo flakon 2.5 ml, i cili është ekvivalent me 20 mg / ml alkool benzilik. Alkooli benzilik mund të shkaktojë reaksione alergjike dhe irritim të lehtë lokal. Ky bar përbën 1000 mg propilen glikol në çdo flakon 2.5 ml, i cili është ekvivalent me 400 mg / ml propilen glikol.

3. SI TA MERRNI AFEBRIL

Gjithmonë merreni Afebril sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Tretësira Afebril administrohet në rektum. Pacienti duhet të qëndrojë shtrirë në pozicion anësor.

Ushtroni presion me gishtin e madh dhe dy gishtat e tjera për të zbrazur tretësirën. Gjatë nxjerrjes së saj vazhdoni ta mbani të shtypur për të penguar ripërthithjen. Mbani bashkuar të ndenjurat për pak kohë deri sa tretësira të përthithet plotësisht nga rektumi.

Afebril - tretësirë për përdorim rektal nuk duhet përdorur te fémijët nën 1 vjec.

Dozimi është si më poshtë:

- Në status epilepticus, në konvulsione nga temperatura e lartë ose konvulsione nga helmimet: 500 mikrogramë/kg peshë trupore për të rritur dhe përfëmijët mbi 10 kg në peshë, e përsëritur qdo 12 orë në qoftë se është e nevojshme.
- Gjendje ankthi dhe axhitim akut: 500 mikrogramë/kg peshë trupore e përsëritur pas 12 orësh në qoftë se është e nevojshme. Nuk rekombandohet përdorimi në fémijë për këtë indikacion.

Të moshuarve dhe pacientëve të dobët dhe të pafuqishëm duhet tu jetep jo më shumë se gjysma e dozës së zakonshme të rritur. Reduktim i dozës nevojitet gjithashtu edhe të pacientit me dëmtime të funksionit të mëlçisë dëshvashave.

Në qoftë se keni marrë më shumë Afebril

Në qoftë se keni marrë më shumë Afebril se sasia që duhet të merrni, ose në qoftë se fémijët e kanë marrë gabimish këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dëshvashave.

Symptomat

Dëmtimi i vetëdijes është mjaft i shpejtë në rastin e helmimit nga benzodiazepinat. Të ralla janë simptoma të tillë si komë e thellë apo shfaqe të tjera të rënies së theksuar të funksioneve jetësore të trurit, simptomë e zakonshme është gjendje e përgjumjës. Duke qenë se toleranca ndaj benzodiazepinave është e shpejtë, vetëdija rifitohet ndërkohë që përqëndrimet e barit në gjak janë më të larta se sa ato që shkaktuan komën. Gjatë shërimit nga mbidozimi akut pacienti mund të ketë pagjumësi dhe gjendje ankthi, ndërsa të pacientit të cilët kanë qenë përdorues kronik të këtij bari shfaqen shenja të varësisë si konvulsione të fuqishme.

Trajtimi

Trajtimi i mbidozimit të benzodiazepinave në përgjithësi është simptomati dhe mbëshëtetës. Antagonisti specifik i benzodiazepinave, flumazenili, përdoret rralë dhe mund të jetë shumë i rrezikshëm, sidomos në mbidozimet mikse me antidepresantë triciklikë apo në pacientët e varur nga benzodiazepinat. Flumazenili mund të përdoret vetëm nga mjekë shumë të kualifikuar.

Në qoftë se harroni të merrni Afebril

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e zakonshme të saj. Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Si të gjitha barnat e tjera, Afebril mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston. Efektet anësore më të zakonshme janë: përgjumja, lodhja, këpupja dhe dobësia muskulare.

Më të ralla janë: konfuzion, çregullime gastrointestinale, reaksione në lëkurë, depresion, dhimbje koke, hipotension, mbajtje e urinës, vështirësi në të folur, ndryshime në sekretimin e pështymës, dridhje, marrje mendsh, turbullim i shikimit, ulje e aktivitetit respirator, ndryshime në libido. Në raste të ralla janë vërejtur: shfaqe e ikterit, çregullime në formulën e gjakut, reaksione të mbindjeshmërisë. Janë konstatuar reaksione paradosksale si: eksitim i menjëherëshëm, ankth, çregullime të gjumit, agresivitet.

Varësia: simptomat e varësisë ndaj benzodiazepinave janë: ankth, depresion, ulje e përqëndrimit, pagjumesi, dhimbje koke, marrje mendsh, zhurma në vesh, humbe oreksi, dridhje, djersitje, irritim, shqetësimë të perceptimit (si, mbindjeshmëri ndaj stimulive fizikë, të dëgjimit, të shikimit), shijim jonormal, nauze, të vjella, spazma në bark, palpitacione, takardi, hipertension sistolik i lehtë dhe hipotension ortostatik. Simptoma të ralla por më serioze janë: psikoza të paranojës, konvulsione, halucinacione, gjendje e ngjashme me delirium tremens, shqetësimë me gjumin.

Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore, ose çdo efekt tjetër anësor i cili nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.

5. SI TA RUANI AFEBRIL

Mbajeni larg fémijëve.

Mos e përdorni Afebril pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.

Mos e ruani mbi 25°C.

Ruajeni në paketimin original për ta mbrojtur nga ndikimi i faktorëve të jashtëm.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Afebril – tretësirë për përdorim rektal

Lënda vepruese është diazepam.

Qdo tretësirë rektale 2.5 ml përbën 5 mg diazepam.

Përbërësit e tjerë janë: etanol 96%, propilenglikol, alkool benzilik, acid benzoik, benzoat natriumi, hidroksopiripelulozë, tretësirë hidroksid natriumi, ujë i pastruar.

Përbajtja e paketimit

Forma e paketimit është kuti me 5 tretësira rektale me nga 2.5 ml.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:



Sipas recetës së mjekut.



Përbajtja. ! Kujdes.



Tretësirë rektale.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë - SHQIPERI

Ky fletëudhëzues u rishikuva për herë të fundit në Gusht 2013.