

**i** FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:  
Informacion pér përdoruesin

# SPAZMOFARMA

Tableta - 5 mg  
(Bromur oksifenoni)

## Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpresa të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqështet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

## Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Spazmofarma dhe përsë përdoret?
- Përpresa se të merrni Spazmofarma
- Si ta merrni Spazmofarma?
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Spazmofarma?
- Informacion i mëtejshëm

## 1. ÇFARË ËSHTË SPAZMOFARMA DHE PËRSË PËRDORET?

Spazmofarma përbën si lëndë vepruese bromur oksifenoni, i cili ndikon në përcimini e impulseve nga mbarësat nervore të vagusit në muskulaturën e lëmuar; ai i prish spazmat për shkak të nxitjes vagale dhe e zgogëlon sekretimin e tepertë të lëngut gastrik.

Bromuri i oksifenonit përthithet ngadalë pas përdorimit nga goja të tableteve të kësaj lënde. Bari përthithet vetëm pjesërisht nga aparatit tretës; shpejtësia mesatare e përthithjes së një doze të marrë nga goja është 5 – 6 %. Lënda vepruese që qarkullon në gjak është e pranishme kryesisht në fraksionin plazmatik.

Spazmofarma tabletë përdoret në spazma të muskulaturës së lëmuar të aparatit tretës, gypit témthor, rrugëve urinare dhe traktit gjeneralit.

## 2. PËRPARA SE TË MERRNI SPAZMOFARMA

### Mos merrni Spazmofarma në qoftë se:

- jeni alergjik ndaj bromurit të oksifenonit ose ndaj ndonjërit prej përbërsive joaktivë të përmendur në fund të këtij fletëudhëzuesi;
- vuani nga glaukoma;
- vuani nga uropati obstruktive (p.sh., obstrukcion i qafës së fshikëzës urinare për shkak të hiperplazisë së prostatës);
- vuani nga sëmundje obstruktive të aparatit tretës;
- vuani nga takikardi ose aritmia takikardike;
- vuani nga megakolon toksik i ndërliruar me kolit ulçeroz;
- vuani nga miastenia gravis.

Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i merrni tabletat, flisni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna. Nëse shkoni te ndonjë mjek tjetër apo dentist njoftojeni që jeni duke marrë Spazmofarma.

## Tregoni kujdes të veçantë me Spazmofarma

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se:

- jeni alergjik ndaj barnave të tjera, veçanërisht në qoftë se janë në të njëjtën klasë barnash me Spazmofarma;
- jeni duke marrë barna të tjera, në veçanti antidepresiv, antihistaminikë ose antikolinergjikë, sepse këto barna mund të rrisin mundësinë e shfaqjes së efekteve të padëshirueshme;
- keni në plan të ngeleni shtatzënë gjatë kohës që jeni duke përdorur Spazmofarma ose jeni shtatzënë;
- jeni të sëmurë të dobësuar me sëmundje kronike të mushkërive, për arsyen se pakësimi i sekrecionit bronkial mund të shpërjet në dendësimin dhe formimin e tapave bronkiale;
- jeni i sëmurë mbi 40 vjeç dhe përdorni antikolinergjikë, sepse në këtë grupomoshë rritet incidenca e glaukomës.

Një nga shenjat e hershme të obstrukzionit jo të plotë intestinal, sidomos në të sëmurët me ileostomi ose kolostomi mund të jetë diarrea. Në raste të tillë mjekimi me Spazmofarma duhet konsideruar i papërshtatshëm dhe ndoshta edhe i dëmshëm. Duhet nënvizuar se barnat antikolinergjike në të sëmurët që mjekohen për ulcera gastrike, mund të shkaktojnë një vonesë në zbrazjen e stomakut, që mund ta ndërllojë këtë lloj mjekimi.

## Marrja e barnave të tjera

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së fundmi barna të tjera, edhe ato pa recetë. Informoni mjekun tuaj në qoftë se jeni duke marrë ndonjë prej këtyre barnave:

- antidepresiv, antihistaminikë ose antikolinergjikë. Këto barna duke u përdorur në të njëjtën kohë me Spazmofarma mund të rritin mundësinë e shfaqjes së efekteve të padëshiruesha, ose mund të ndikojnë në mënyrën se si vepron. Mund të keni nevojë të përdorni sasi të ndryshme të këtij bari ose të merrni barna të tjera. Mjeku ose farmacisti juaj do t'ju këshillojë.

## Marrja e Spazmofarma me ushqim dhe pije

Spazmofarma është një bar i cili rekandomohet të merret sipas porosisë së mjekut.

## Shtatzënia dhe ushqyerja me gjji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të ngeleni shtatzënë. Si shumica e barnave të këtij lloji, Spazmofarma duhet mënjanuar gjatë periudhës së shtatzënës. Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjën me qumësht gjiri. Bromuri i oksifenonit është një bar që kalon në qumështin e gjirit dhe është i dëmshëm për shëndetin e fëmijës. Prandaj, rekandomohet që ky bar të mos përdoret gjatë periudhës së ushqyerjes me gjji.

## Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Të sëmurët që përdorin Spazmofarma duhen paralajmëruar që gjatë kohës që përdorin këtë bar të mos drejtojnë automjete dhe të mos punojnë me makineri, sepse ai mund të shkaktojë përgjumje dhe turbullim të parit.

## Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Spazmofarma

Ky bar përbën laktozë. Kontaktoni mjekun tuaj para se ta merrni këtë bar nëse jeni në dijeni se keni mungesë tolerance ndaj disa sheqernave.

## 3. SI TA MERRNI SPAZMOFARMA

Ndiqui këshillat e mjekut për mënyrën e marrjes dhe dozimin e Spazmofarma.

Tabletat të merren me një gotë ujë. Këshillojmë që tabletat t'i merrni në të njëjtën orë çdo ditë.

Të rriturit: 5 - 10 mg (1 - 2 tableta) deri 4 herë në ditë, për disa ditë. Pastaj doza mund të ulet në varësi nga përgjigjja e të sëmurit.

Fëmijët e moshës shkollorë: 2.5 mg (1/2 tablete), 1 - 3 herë në ditë.

Megjithatë, mjeku juaj mund t'ju këshillojë të merrni një dozë tjetër në varësi të gjendjes tuaj dhe reagimit ndaj barit.

Mjeku juaj mund t'ju kërkojë të merrni Spazmofarma për një kohë më të gjatë. Pyesni mjekun tuaj për këshillë në qoftë se nuk jeni të sigurt për sa kohë duhet ta merrni.

## Në qoftë se keni marrë më shumë Spazmofarma

Në qoftë se keni marrë më shumë Spazmofarma se sasia që duhet të merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerrin.

## Në qoftë se harroni të merrni Spazmofarma

Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e zakonshme të saj.

Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund të shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e herëve jo.

Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore. Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre.

Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore të mëposhtme ju shqetëson:

- takikardi (sistemi kardiovaskular);
- turbullim i të parit, përgjumje, dhimbje koke (sistemi nervor qendror);
- konstipacion (aparati tretës);
- mbajtje e urinës, çregullime të urinimit (sistemi urogenital);

• tharje goje, tharje gryke, rritle e presionit intraokular (glaukomë), pakësim i djersitjes. Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

## 5. SI TA RUANI SPAZMOFARMA?

Mbajeni larg fëmijëve.

Mos e përdorin Spazmofarma pas datës së skadimit e cilës shtë e shënuar në paketim. Mos e ruani mbi 25°C.

Ruajeni në paketimin original për ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia!

## 6. INFORMACION I MËTEJSHËM

### Çfarë përbën Spazmofarma

Lënda vepruese është bromur oksifenoni.

Çdo tabletë përbën 5 mg bromur oksifenoni. Përbërësit e tjerë janë: amidon, laktozë monohidrat, xhelinatinë, talk, stearat magnezi.

### Përbajtja e paketimit

Kuti me 30 tableta.

### Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:

 Sipas recetës së mjekut.

 Përbajtja.  Kujdes.

 Forma e tabletës.

### Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

 PROFARMA Sh.a,  
Rruga "Myslym Keta"  
Tel.: 00355 4 23 89 602  
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Korrik 2015.

**PAY ATENTION**, all the layers are visible.

If you have to print this document please  
check or uncheck the specific layers.