

i FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion për patientin

Neuro B

Tretësirë për injekzion
(100 mg + 50 mg + 0.5 mg) / 2 ml
(Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përparrë se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë të lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyjetë të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është pëershkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjera. Mund t' i dëmtojë atë edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësoset ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

- Çfarë është Neuro B dhe përsë përdoret?
- Përpëra se të merrni Neuro B?
- Si ta merrni Neuro B?
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Neuro B?
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË NEURO B DHE PËRSE PËRDORET

Neuro B përban si lëndë aktive Vitamininë B1 (tiaminë klorhidrat), Vitamininë B6 (piridoksinë klorhidrat) dhe Vitamininë B12 (cianokobalamin) të cilat janë pjesë e vitaminave të grupit B.

Këto vitaminave hyjnë në përbërjen e enzimave që katallozijnë reaksionet gjatë metabolismit të shqegernave, yndyrave dhe proteinave. Kombinimi i vitaminave të grupit B përdoret për ndikimin në një sëri procesesh dhe funksionesh të rëndësishme të organizmit dhe kryesisht për ndikimin mbi sëmundjet inflamatorë dhe degenerative të nervave dhe aparativ motorik.

Neuro B, si tretësirë për injekzion, përdoret në mjekimini kompleks të sëmundjeve dhe gjendjeve të mëposhtme:

- në trajtimin e mungesës së vitaminave B, në dermatite, ekzema, psoriazë, diatezë eksudative, akne;
- procësë inflamatorë dhe degenerative të nervave periferike – neurite, polineurite (alkoolike, postinfektive dhe tokiske, në rast diabeti), neuralgji, mialgji, parestesi;
- gjatë trajtimit me disa barna si izoniazid, cikloserinë;
- në trajtimin e anemisë makrocitare;
- mund të jetë i dobishëm si ndihmës në manaxhimin e abstinençës së alkolit;
- pas gastroektomisë ose pas hejzes masive të ileumit;

- mund të ndikojë pozitivisht në regullimin e sindromës premenstruale.

2. PËRPARA SE TË MERRNI NEURO B

Mos merrni Neuro B në qoftë se:

- keni mbindjeshmëri (alerji) ndaj ndonjërit prej përbërësve aktívë apo përbërësve të tjera të Neuro B sepse mund të ndodhin reaksiione anafilaktike;
- jeni shtatzënë;
- vuanit nga policitemia vera;
- vuanit nga proçeset malinje;
- vuanit nga tromboembolia akute (bllokimi i një ene gjaku nga formimi i trombit);
- vuanit nga eritoza dhe eritremia (sëmundje të gjakut me numëri të ritrit të eritrociteve).
- keni sëmundjen Leber apo amблиopatiqë e duhanit sepse këto neuropati optike mund të përkëqësohen më tej.

3. TREGONI KUJDËS TË VEÇANTË ME NEURO B

Neuro B duhet të përdoret me kujdes nga pacientët me forma të rëndë ose akute të insuficiencës së dekompenzuar kardiakë dhe me stenokardi. Përdorimi i zgjatur i dozave të larta të piridoksinës shqërohet me zhvillimin e neuropatisë periferike të rëndë; doza në të cilën shfaqet kjo është e diskutueshme.

Cianokobalamina, nëse është e mundur, duhet të mos jepet tek pacientët e dyshuar përmungesë të vitamininës B12 pa e konfirmuar paraprakisht diagnozën. Monitorimi i rregullt i gjakut është i kësillueshëm. Përdorimi i dozave ditore më të mëdha se 10 mikrogram mund të shkaktojë përgjigje hematologjike në pacientët me mungesë të folateve; përdorimi jo i rregullt mund të maskojë diagnozën e saktë. Në anën tjetër, folatet mund të maskojnë mungesën e vitamininës B12.

4. MARRJA E BARNAVE TË TJERA

Tregojini mjekut ose farmacistit tuaj nëse jeni duke marrë, keni marrë kohët e fundit ose mund të merrni ndonjë bar tjetër, përfshirë barnat të cilat merren pa recetë.

Barnat që mund të ndërveuprojnë me Neuro B janë: bllokuesit neuromuskularë; vitamina B1 mund të rrissë efektin e bllokuesve neuromuskularë; levodopa; vitamina B6 redukton efektet e levodopës, por kjo nuk shfaqet nëse njëkohësisht jepet një frenues i dopadekarboksilazës; fenobarbitali; është reportuar që vitamina B6 ul përqëndrimin e fenobarbitalit në serum; hidralazina, izoniazidi, penicillamina dhe kontraceptive; oralë mund të rrisin nevojën për vitaminë B6; kloramfenikoli; kloramfenikoli nërugë parenterale mund të pakësojë efektin e vitamininës B12 në anemi.

5. MARRJA E NEURO B ME USHQIM DHE PIJE

Nuk ka të dhëna për nevojën e një diete të veçantë ushqimore ose të kufizimit të illojeve të caktuarë ushqimesh dhe pijesh në kohën e mjekimit me këtë produkt.

Shtatzënë dhe Ushqimi me gji

Shtatzënë

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë, dyshoni se jeni shtatzënë ose po planifikoni të mbeteni shtatzënë.

Vitamina B6 dhe B12 kalojnë barrierën placentare, kështu që nuk rekandohet përdorimi i Neuro B gjatë shtatzënës.

Ushqimi me gji

Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqen foshnjën me qumësht gjiri.

Nënat me deficiencë të theksuar të tiaminës duhet të mënjanojnë ushqyerjen me gji për shkak të prezencës së metil-glioksalit toksik në qumësht. Nuk rekandohet të përdoret në këtë periudhë, përvëç rasteve të domosdoshme.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nuk janë bërë studime mbi ndikimin e këtij bari në aftësinë për të drejtuar automjete apo përdorur makineri.

3. SI TA MERRNI NEURO B

Gjithmonë merrni Neuro B sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt, kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Dozat e zakonshme përshtohen më poshtë:

Tek të ritritur, injektohen në muskul 2 ml 1-2 herë në ditë. Zgjatja e mjekimit bëhet sipas vlerësimit të mjekut.

Tek fëmijët përshtatet doza sipas moshës dhe sëmundjes.

Në qoftë se keni marrë më shumë Neuro B

Në qoftë se keni marrë më shumë Neuro B se sasia që duhet të merrni, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerrin.

Mos merrni më shumë Neuro B se sasia që ju rekondon mjeku juaj.

Në raste të ralla mund të ndodhë shok anafilaktik fatal.

Vitamina B6 zakonisht nuk është toksike, përdorimi kronik i dozave të larta është shqëruar me efekte anësore neurologjike.

Vitamina B12 zakonisht nuk është toksike edhe në doza të larta, megjithatë është raportuar diarre e lehta tranzitorë, trombozë periferike vaskulare, ekzantemë tranzitorë me kraujje, urtikarie, ndjesi enjteje e të gjithë trupit, anafilaksi, dhe vdekje tek pacientët me përdorim parenteral të vitamininës B12.

Trajtimi

Izoniazidi është një antidot i Vitamininës B6.

Në qoftë se keni harruar të merrni Neuro B

Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar.

Në qoftë se keni harruar të merrni Neuro B, merrni dozën tuaj sa më shpejt që të kujtoheni përvëç rastit

kur ka ardhur koha që të merrni dozën pasardhëse. Përdorni dozat në kohën e duhur.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUND SHME

Si të gjitha barnat e tjera, Neuro B mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.

Neuro B në dozat e rekanduara nuk jep efekte anësore.

Në raste të ralla mund të vihen re: djersitje, takikardi, kruarje, urtikarie.

Efektet anësore të tiaminës janë të ralla, por janë shfaqur reaksiione mbindjeshmërie deri në shok anafilaktik fatal.

Pas injektitimt intramuscular të Neuro B mund të vërehet ndjeshmëri e shtuar dhe ngurtësim, djegje ose shpim në vendin e injektitit.

Përdorimi i zgjatur i dozave të larta të vitamininës B6 shqërohet me zhvillimin e neuropatisë periferike të rëndë; doza në të cilën shfaqet kjo është e diskutueshme. Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore, ose çdo efekt anësor tjetër që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.

5. SI TA RUANI NEURO B

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos e përdoni Neuro B pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.

Ruajeni në vend të thatë, të freskët, në temperaturë jo më shumë se 25°C!

Mos e ruani në ngrijje.

Ruajeni Neuro B nga drita dhe nga lagështia!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Neuro B – tretësirë për injekzion

Lëndët vepruese janë: vitamininë B1 (tiaminë klorhidrat), vitamininë B6 (piridoksinë klorhidrat), vitamininë B12 (cianokobalamin).

Çdo ampulë 2 ml përbën 100 mg vitamininë B1, 50 mg vitamininë B6 dhe 0.5 mg vitamininë B12.

Përbërës të tjera: metil hidrosibenzozat, metabisulfit natriumi, klorur natriumi dhe ujë për injekzion.

Përbajtja e paketimit

Kuti kartoni me 10 ampula 2 ml.

Shpjegues i ikonave ilustruese për paketim:

 Sipas recetës së mjekut.

 Përbajtja.  Kujdes.

 Tretësirë për injekzion.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:

 PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë - SHQIPËRI

Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Shtator 2014.

PAY ATENTION, all the layers are visible.

If you have to print this document please check or uncheck the specific layers.