

FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT:
Informacion pér përdoruesin

PERTUSINE

Shurup - (120 mg + 10 mg) / g
(Ekstrakt fluid timusi, Bromur kaliumi)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpëra se të filloni përdorimin e barit.

- Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevoj ta lexoni përsëri.
- Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
- Ky bar është pëershruar pér ju. Mos ja rekamandoni personave të tjerë. Mund t'i dëmtojë ata edhe pse mund t'ë kenë të njëjtat simptoma sju.
- Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkëqeshet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues do të lexoni:

- Çfarë është Pertusine dhe përsë përdoret
- Përpëra se të merrni Pertusine
- Si ta merrni Pertusine
- Efekte anësore të mundshme
- Si ta ruani Pertusine
- Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË PERTUSINE DHE PËRSË PËRDORET

Pertusine përbën lëndët vepruese bromur kaliumi dhe ekstrakt fluid timusi.

Bromuri i kaliumit është një sedativ i lehtë dhe një hipnotik i lehtë. Ekstrakti fluid i timusit ka veprim ekspektorant dhe antiflogistik.

Ai pakëson reflekset e kollës, favorizon ekspektorimin, zbut mukozën e inflamuar dhe qelëson kollën.

Timoli, esenca e ekstraktit të timusit është një lëndë me veti ekspektorante dhe dezinfektuese në nivelin e rrugeve të frymëzuar.

Bromuri i kaliumit është një lëndë e njohur pér vetitë sedative të qendrës së kollës.

2. PËRPARA SE TË MERRNI PERTUSINE

Mos merrni Pertusine në qoftë se:

- keni mbindjeshmëri t'ë njohur ndaj përbërësive të shurupit apo binëvë t'ë tjerë të familjes Lamiaceae (Labiatae);
- vuani nga atake astme;
- keni shqetësimë ventiliimi;
- vuani nga diabeti, për shkak t'ë përbajtjës së lartë t'ë sheqerit në shurup.

Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendetjet e përmendura më sipër, mos merrni Pertusine. Konsultohuni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna prej tij.

Tregoni kujdes t'ë veçantë me Pertusine

Njoftoni mjekun tuaj në rast se vuani nga:

- insuficiencia respiratore;

astma.

Nëse shfaqet dispne, temperaturë apo sputum purulent, duhet t'ë konsultohet mjeku.

Nëse simptomat përkëqeshon gjatë përdorimit të shurupit, duhet t'ë konsultohet mjeku.

Pertusine përbën alkool etilik (etanol 96%), prandaj duhet treguar kujdes në gratë shtatzëna ose që ushqejnë fëmijën me gji, fëmijët dhe pacientët me risk t'ë lartë, si p.sh. ata me sëmundje të mëlcisë ose epilepsi. Alkooli etilik (etanol 96%) është i dëmshëm pér personat që vuajnë nga alkoolizmi.

Marrja e barnave t'ë tjerë

Nuk ka t'ë dhëna nëse Pertusine mund t'ë ndërveuprojë me barna t'ë tjerë.

Shtatzënia dhe Ushqimi me gji

Për shkak t'ë dhënavë t'ë pamjaftueshme mbi sigurinë, nuk rekamandohet përdorimi.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive

Nuk ka t'ë dhëna.

Informacion i rëndësishëm pér disa nga përbërësit e Pertusine
Pertusine përbën:

- metilhidroksibenzoat, që mund t'ë shkaktojë reaksiione alergjike (ndoshta t'ë vonuara);
- sukrozë; nësë keni intolerancë ndaj disa sheqernave, kontaktoni mjekun përpëra se t'ë mermi këtë bar. Duhet t'ë merret parasysh nga pacientët me diabet t'ë sheqerit;
- etanol (alkool); etanol është i dëmshëm pér personat që vuajnë nga alkoolizmi. Duhet t'ë merret në konsideratë në gratë shtatzëna ose që ushqejnë fëmijën me gji, fëmijët dhe pacientët me risk t'ë lartë, si ata me sëmundje të mëlcisë ose epilepsi.

3. SI TA MERRNI PERTUSINE

Ndiqni gjithmonë këshillat e mjekut tuaj në lidhje me dozat e Pertusine që duhet t'ë mermi dhe shikoni gjithnjë udhëzimet e pëershruara në etiketten e barit. Dozat e zakonshme pëershruhen më poshtë.

Indikime dozimi:

Të ritriti: 1 lugë gjelle, 3 herë në ditë.

Fëmijët: ½ - 1 lugë caj, 3 herë në ditë.

Për fëmijët nën 4 vjeç nuk rekamandohet përdorimi dhe duhet konsultuar mjeku.

Në qoftë se simptomat zgjasin më shumë se 1 javë gjatë përdorimit të shurupit, duhet t'ë konsultohet mjeku.

Në qoftë se keni marrë më shumë Pertusine

Mos mermi më shumë Pertusine sesa rekamandimi i mjekut tuaj.

Nuk ka raportime pér simptoma nga mbidozimi i Pertusine.

Në qoftë se harroni t'ë merrni Pertusine

Në qoftë se harroni t'ë merrni Pertusine, mermi dozën tuaj sa më shpejt që t'ë kujtoheni, përvèç rastit kur ka ardhur koha që t'ë merrni dozën pasardhëse. Përdorni dozat në kohën e duhur.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME

Të gjitha barnat mund t'ë shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze, shumicën e rasteve jo. Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ju shqetëson ndonjë efekt anësor. Efektet anësore t'ë Pertusine janë shumë të ralla. Janë reportuar shqetësimë gastrointestinale.

Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë t'ë përmendura në këtë fletëudhëzues, ju lutemi t'ë njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI PERTUSINE

Mbajeni larg fëmijëve!

Mos e përdori Pertusine pas datës së skadencës e cilësës së pëkatimt.

Ruajeni në temperaturë më t'ë ulët se 25°C!

Ruajeni shurupin nga dielli dhe nga lagështia!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM

Çfarë përbën Pertusine

Lëndët aktive janë ekstrakti fluid i timusit (listre) dhe bromuri i kaliumit.

1 g shurup përbën 120 mg ekstrakt fluid timusi (listre) dhe 10 mg bromuri kaliumi.

Përbërësit e tjerë janë: etanol 96%, metilhidroksibenzoat (nipagjinë), esencë citri, sukrozë, ujë i pastruar.

Përbajtja e paketimit

Kuti me një shishe qelqi 100 g.

Shpjegues i ikonave ilustruese në paketim:



Mund t'ë merret pa recetën e mjekut.



Përbajtja.



Kujdes.



Shurup.

Mbajtësi i autorizimit pér tregtim (MAH) dhe prodhuesi:



PROFARMA Sh.a.
Rruga "Myslym Keta"
Tel.: 00355 42 38 96 02
Tiranë - Shqipëri.

Ky fletëudhëzues u rishikuar pér herë t'ë fundit në Maj 2014.

PACKAGE LEAFLET:
Information for the user

PERTUSINE

Syrup - (120 mg + 10 mg) / g
(Thyme liquid extract, Potassium bromide)

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

- What Pertusine is and what it is used for
- Before you take Pertusine
- How to take Pertusine
- Possible side effects
- How to store Pertusine
- Further information

1. WHAT PERTUSINE IS AND WHAT IT IS USED FOR

Pertusine contains the active substances potassium bromide and thyme liquid extract.

Potassium bromide is a mild sedative and a mild hypnotic.

Thyme liquid extract has an expectorant and antiphlogistic action. It reduces cough reflexes, stimulates expectoration, softens the inflamed mucosa and relieves cough.

Timol, the essence of thyme extract, is a substance with expectorant and disinfectant properties at the level of the respiratory airways. Potassium bromide is a substance known for the sedative properties of the center of cough.

2. BEFORE YOU TAKE PERTUSINE

Do not take Pertusine if:

- you have known hypersensitivity to the ingredients or to other plants of Lamiaceae (Labiatae) family;
- you suffer from asthma attacks;
- you have ventilation concerns;
- you suffer from diabetes, because of the high content of sucrose in the syrup.

If you think you have any of the above mentioned conditions, do not take Pertusine. Consult first with your doctor and follow the given advices.

Take special care with Pertusine

Inform your doctor if you suffer from:

- respiratory failure;
- asthma.

If dyspnoea, fever or purulent sputum occurs, a doctor should be consulted.

If the symptoms worsen during the use of the medicinal product, a doctor should be consulted.

Pertusine contains ethyl alcohol (ethanol 96%), therefore caution should be taken in pregnant or breast-feeding women, children and high - risk patients, like for e.g. those with liver disease or epilepsy. Ethyl alcohol (ethanol 96%) is harmful for people who suffer from alcoholism.

Taking other medicines

There are no data if Pertusine may interact with other drugs.

Pregnancy and Breast - feeding

Safety during pregnancy and lactation has not been established. In the absence of sufficient data, the use during pregnancy and lactation is not recommended.

Driving and using machines

No information available.

Important information on some of the excipients of Pertusine

Pertusine contains:

- methyl hydroxybenzoate, that may cause allergic reactions (possibly delayed);
- sucrose; if you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product. This should be taken into account from patients with diabetes mellitus;
- ethanol (alcohol); ethanol is harmful for people suffering from alcoholism. To be taken into account in pregnant or breast - feeding women, children and high - risk patients, like those with liver disease or epilepsy.

3. HOW TO TAKE PERTUSINE

Always take Pertusine as your doctor has told you and always see the prescribed instructions in the drug label. The usual dosages are described as follows:

Dosage indications:

Adults: 1 tablespoon, 3 times daily.

Children: ½ - 1 teaspoon, 3 times daily.

The use in children under 4 years of age is not recommended.

A doctor should be consulted.

If the symptoms persist longer than 1 week during the use of the medicinal product, a doctor should be consulted.

If you take more Pertusine than you should

Do not take more Pertusine than your doctor recommendation. There are no reports for symptoms from Pertusine overdose.

If you forget to take Pertusine

If you forget to take Pertusine, take your dose as soon as you remember, except the case when it is time to take the next dose. Use the doses in the right time.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

All drugs may cause side effects. Sometimes they are serious, most of the time not. Inform your doctor if any side effect disturbs you. The side effects of Pertusine are very rare. Gastrointestinal disturbances have been reported.

If you notice side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE PERTUSINE

Keep out of the reach and sight of children!

Do not use Pertusine after the expiry date which is stated on the package!

Store below 25°C!

Protect the syrup from light and humidity!

6. FURTHER INFORMATION

What Pertusine contains

The active substances are: thyme liquid extract and potassium bromide.

1 g syrup contains 120 mg of thyme liquid extract and 10 mg of potassium bromide.

The other excipients are: ethanol 96 %, methyl hydroxybenzoate (nipagin), essence citri, sucrose, purified water.

Content of the pack

Carton box with one glass bottle of 100 g.

Explanatory of the illustration icons on the packaging:



Medicine should be taken without medical prescription.



Content.



Warning.



Syrup.

Marketing authorisation holder and manufacturer :

